

효과 빠른 식물성 염증치료제

노퍼스 캡슐

(배농산급탕)

일반의약품 분류번호:263

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

건감(KP)	0.165 g	검초(KP)	0.5 g
대추(KP)	0.5 g	작약(KP)	0.5 g
지실(KP)	0.5 g	길경(KP)	0.67 g
첨가제(타르색소) : 황색 5호, 황색 203호, 청색 1호, 적색 40호			

【효능 및 효과】 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 단단해지고 통증을 수반하는 화농(뒹뒹)성 질환

【용법 및 용량】 보통 성인 1회 2캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

【성 상】 갈색 분말이 든 상부 녹색, 하부 미황색(연노랑)의 불투명한 캡슐제

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 통증 등의 국소 증상 이외의 두통, 오한(췌고 떨리는 증상), 발열 등의 전신 증상을 동시에 수반하는 환자
- 2) 한성농양(고름집)(寒性膿瘍, 열이 없는 농양(고름집)), 만성종기 환자
- 3) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당 - 갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 5) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 7) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 8) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.))
- 9) 이 약은 황색5호(선셋옐로 FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

▶ 뒷면 계속

KGMP적격업체

조아제약(주)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
 - (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지(팔다리)경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
 - (3) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
 - (4) 소화기계 : 위부(상복부)불쾌감 등
- 2) 5~6일 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 3) 이 약의 복용에 의해 드물게 증상이 악화되는 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 4) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포 장 단 위】 10캡슐

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【제조회자】 조아제약(주)

본사 : 서울특별시 영등포구 당산로2길 12

공장 : 경상남도 함안군 함안면 광정로 318

인터넷홈페이지 <http://www.choa.co.kr>

【제 조 자】 (주)아이월드제약

인천광역시 남동구 학박로 316

【수신자부담고객상담실】 080-988-8888

- ※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입한 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.
- ※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 표시되지 않은 부작용이 나타나 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 전달하십시오.