

연약한 피부에도 자극 없는

모스쿨[®] 키드크림

LEMONA **경남제약**주
Kyung Nam Pharm. Co., Ltd.

일반의약품 / 분류번호 : 264

사용하시기 전에 설명서를 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

디펜히드라민(KP) 10 mg
덱스판테놀(USP) 10 mg
토코페롤아세테이트(KP) 10 mg
글리시리진산이칼륨(KP) 5 mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) 2mg

【성상】 흰색의 균질한 크림제

【효능·효과】 가려움, 피부염, 피부병, 습진, 두드러기, 땀띠, 동상, 벌레 물림, 짓무름

【용법·용량】 1일 수회(여러 차례) 환부(질환 부위)에 적당량을 바른다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 생후 1개월 미만의 유아

2. 다음과 같은 환자는 사용 전에 의사 또는 약사와 상담하여 신중히 투여할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
- 3) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 환자
- 4) 습윤이나 염증이 심한 환자
- 5) 영(젖먹이) · 유아

3. 부작용

1) 이 약의 사용으로 인해 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기) 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 2) 소아에 사용할 경우에는 보호자의 지시감독하에 사용한다.

3) 어린이나 고령자(노인)가 본 제품을 경구로 복용한 경우, 조금 앓은 정도로는 영향이 없다. 단 많이 먹으면 졸음이 오는 경우가 있음

4) 다음의 경우에는 가능한 빨리 의사에게 진찰을 받는다.

- 대량(약 10g 이상) 삼켰을 때
- 현기증, 구역질, 권태감(노곤함), 호흡 이상 등이 있을 때

5) 수회(여러 차례) 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

5. 적응상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 않는다.
- 2) 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 만일 눈에 들어간 경우는 물로 씻는다. 증상이 심한 경우(충혈이나 아픔이 계속되거나, 눈물이 멈추지 않는 경우 등)에는 안과 의사의 진료를 받는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.
- 4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 않는다. 사용기한 내의 제품일지라도 품질 유지를 위해 개봉 후는 가능한 빠르게 사용한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위(외부포장에 표기)

【제 조 자】 성광제약(주) 충남 천안시 서북구 백석공단1로 47

【제조외사】 경남제약(주) 충남 아산시 신창면 서부남로790번길 49

※ 기타주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 사용을 금하시기 바랍니다.
3. 이 약은 외용으로만 적용하시고 내복은 금하시기 바랍니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.

소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 “소비자분쟁 해결기준”에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관 「<http://drug.mfds.go.kr>」 → 「의약품 검색」을 참조하시기 바랍니다.