

고함량비타민 B군 복합제 뉴트리·비 골드 정

※ 이 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고,
첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【일반의약품】



【원료약품 및 그 분량】 1정 중

■ 유효성분 :

콜린타르타르산염(DAB).....	100mg
이노시톨(KP).....	100mg
티아민질산염(KP).....	100mg
리보플라빈(KP)	100mg
니코틴산아미드(KP)	100mg
판토텐산칼슘(KP).....	100mg
피리독신염산염(KP)	100mg
γ-오리자놀(KP).....	10mg
폴산(KP).....	0.5mg
d-비오틴(USP)	0.5mg
시아노코발라민(KP).....	0.5mg
아스코르브산과립(별규)	60mg
(아스코르브산으로서58.2mg)	

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)

■ 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산
마그네슘, 오파드라이 II 갈색(85F465001), 전분
글리콜산나트륨, 카르나우바납, 콜로이드성이
산화규소, 크로스포비돈, 히드록시프로필셀룰
로오스, 히프로멜로오스

【성상】 갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C의 보급

- 1) 육체피로
- 2) 임신·수유기
- 3) 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하

2. 이 약에 함유된 비타민의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 1) 비타민 B₁(티아민질산염)
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)

- 각기
 - 눈의피로
- 2) 비타민 B₂(리보플라빈), 비타민 B₆(피리독신염산염)
 - 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】

만 8세 이상 어린이 및 성인: 1일 1회, 1정 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육 종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 3개월 미만의 젖먹이
- 4) 심한 증상의 신부전 환자
- 5) 신장(콩팥)결석 환자
- 6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 3) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 5) 강심배당체를 투여 중인 환자
- 6) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 7) 임부
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
구역, 구토, 설사, 묽은 변, 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
 - 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 3) 피리독신을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
 - 6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
 - 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

습니다.

- 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 외부 포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

【포장단위】 60정

【소비자상담】 080-203-6000 (수신자 요금부담)

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL: 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) '의약품검색'란을 참조하세요.

제조의뢰자·판매원: 코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

제조사: 알리코제약(주) 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 21

최초 작성연월일: 20150317

최종 개정연월일: 20180412

❖ 코오롱제약