

## 셀빅스 캡슐(세레크시브)

### Celvix capsules

## 셀빅스 캡슐

(세레크시브)

## 셀빅스 캡슐

(세레크시브)

## COX-2 선택성 소염 · 진통제

- 원료약품 및 그 분량** : 1캡슐 중 유효성분 **·** 세레크시브 (USP).....200mg 첨가제(동물용래석분) : 유당수화물(소, 유유) 기타 첨가제 : 크렐록, 라우일록산나트륨, 스테이리스산그리세, 크로스카르멜로스나트륨, 포바든
- 성상** : 흰색 내지 미황색의 분말이 충전된 상하 흰색의 캡슐제
- 효능 · 효과** : 1. 골관절염(퇴행관절염)의 증상이나 장후의 완화 2. 류마티스관절염의 증상이나 장후의 완화 3. 간헐적추위의 증상 및 장후의 완화 4. 성인의 급성 통증 완화(수술후, 발치후 진통)
- 5. 완발완려증
- 용법 · 용량**
  - 이 약의 최소 권장량은 환자에 따라 조절되어야 하며, 식사와 관계없이 투여할 수 있다.
○ 성인 : 골관절염(퇴행관절염) : 세레크시브로서 200mg을 1일 1회, 또는 1회 100mg씩 1일 2회로 나누어 복용한다.
  - 류마티스관절염 : 세레크시브로서 1회 100mg 또는 200mg을 1일 2회 복용한다.
  - 간헐적추위(AS) : 세레크시브로서 200mg을 1일 1회, 또는 1회 100mg씩 1일 2회로 나누어 투여한다. 6주 후에 효과가 관찰되지 않으면, 1일 400mg 까지 투여할 수 있다. 1일 400mg 투여후까지 6주 후에 효과가 관찰되지 않으면, 다른 치료 방법을 고려해야 한다.
  - 급성 통증 및 완발완려증 : 초기 권장 투여량은 세레크시브로서 400mg이며 투여 후 1주에 첫번째 200mg을 추가로 투여한다. 두어 둘째 날부터는 필요시 권장량으로 1회 200mg씩 1일 2회 투여한다.
- 간장애 환자 : 중증도의 간장애(Child-Pugh Class II) 환자에 대해서는 용량을 1 일 권장량의 약 50%로 감소시켜야 한다

##### ■ 사용상의사항

- 경고
  - 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용하여 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상담해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.
  - 심혈관계 위험: 이 약은 중대한 심혈관계 혈전 반응, 심근경색증 및 뇌졸중의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 병적일 수 있다. 모든 비스테로이드성 소염진통제 약물에 의해 유사한 위험이 발생할 수 있다. 두어 기간, 두어 용량, 기타 심혈관계 위험 인자에 따라 이러한 위험이 증가될 수 있다. 심혈관계 질환의 병력이 있는 환자에서는 더 위험할 수도 있다. 이 약으로 치료받는 환자에서 심혈관계 이상반응에 대한 잠재적 위험을 최소화하기 위해 최저 치자 유효량으로 가능한 최단기간 동안 사용해야 한다. 의사와 환자는 이러한 심혈관계 증상의 발생에 대하여 신중히 모니터링하여야 하며, 이는 심혈관계 질환의 병력이 있는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 환자는 중대한 심혈관계 독성의 징후 및/또는 증상 및 이러한 증상 (가슴통증, 숨찬, 쇠약, 불명료한 발음)이 발생되는 경우 취할 조치에 대하여 사전에 알고 있어야 한다.
  - 위장관계 위험: 이 약으로 치료받는 환자에서 상부 및 하부 위장관계 천공, 궤양 또는 출혈이 발생할 수 있다. 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 약물은 위 또는 장관의 출혈, 궤양 및 천공을 포함한 중대한 위장관계 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있으며 이는 비특이적 수 있다. 이러한 이상반응은 두어 기간 동안에 경고 증상 없이 발생할 수 있다. 고령자는 중대한 위장관계 이상반응의 위험이 더 클 수 있다.
  - 이 약이 기간이 길어질수록 중대한 위장관계 이상반응의 발생 가능성이 증가될 수 있으며 두어 시기에 이러한 위험이 여전히 관찰되는데는 것은 아니이다. 이 약을 투여하는 동안 위장관계 궤양 또는 출혈의 증상 및 징후에 대하여 신중히 모니터링하여야 하며, 명치의 통증, 소화불량, 흑색변, 토혈을 포함한 암시적인 증상 또는 호흡기 및 위장관계 이상반응이 의심되는 경우 즉시 추가적인 평가 및 조치를 실시하여야 한다. 고위험군의 환자에게는 비스테로이드성 소염진통제와 관련 있는 다른 대체 치료제를 고려하여야 한다.

- 다음 환자에는 투여하지 말 것**
  - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대해 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
  - 설문조사에 대해 알레르기 반응을 보이는 환자
  - 아스피린에 대한 비스테로이드성 소염진통제 (COX-2 억제제 포함)에 대하여 천식, 급성 비염, 비측 골막, 혈관부종, 두드러기, 또는 알레르기 반응의 병력이 있는 환자
  - 중증 간장애환자
  - 중증 신장애환자 (크레아티닌 청소율 <30 ml/min인 환자)
  - 활동성 소화성 궤양 또는 위장관 출혈 환자
  - 크로병 또는 궤양성 대장염과 같은 염증성 장 질환 환자
  - 운동성 심부전 환자 (NYHA I – IV)
  - 혈관동맥질환 심장질환자, 말초성 동맥질환 환자 및/또는 뇌혈관 질환자
  - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
  - 수유부
  - 관상동맥 우회도술(CABG) 전후에 발생하는 통증의 치료
  - 고알콜혈증 환자
  - 이 약은 용량을 용취하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

- 다음 환자에는 신중히 투여할 것**
  - 간장애 환자 또는 그 병력이 있는 환자
  - 신장애 환자 또는 그 병력이 있는 환자(크레아티닌청소율<60ml/min인 환자)
  - 기관지 천식 환자
  - 심부전 환자 또는 그 병력이 있는 환자
  - 고혈압 환자 또는 그 병력이 있는 환자
  - 체액저류 환자 또는 부종의 병력이 있는 환자
  - 디아제나 ACE 제제제를 투여중인 환자
  - 지혈장애의 위험이 있는 환자
  - 말수환자
  - 고령자
  - 소화성 궤양이나 위장관 출혈의 병력이 있는 환자
  - 심혈관계 이상반응 (심장발작, 뇌졸중 등)에 대한 고도의 위험인자를 가진 환자 (예: 고혈압, 고지혈증, 당뇨, 흡연 등), 심혈관계질환 또는 그 병력이 있는 환자
  - CYP2C9에 의한 대사가 어려운 환자
  - 혈액응고장애에 있거나 항응고제를 투여받고 있는 환자
  - 임신을 계획하는 여성(이 약을 복용시 여성 생식능력이 손상될 수 있다.)
  - 당뇨병 환자

- 이상반응**
  - 임상시험
    - 12개의 표1은 성인에서 1일 100mg-800mg까지 용량을 최대 12주까지 투여한, 12개의 위약- 및/또는 활성약-대조군 임상시험들에서 세레크시브는 두어군에서 >0.01% 발생률을 나타내면서 위약군에 비해 더 늦게 보고된 이상반응들이다. 이상반응들은 기관계 별로 구분하였고, 발생빈도에 따라 나열하였다. 발생빈도는 세레크시브를 복용한 환자 38,102명의 임상 노출에 해당하는 89 개의 무작위, 대조 임상시험들에 대한 최신의 통합결과에 기초하여 산정된 것이다. 발생빈도의 정의: 매우 흔하게(>10%), 흔하게(>1%, <10%), 흔하지 않게(> 0.1%, <1%), 드물게(>0.01%, <0.1%), 매우 드물게(<0.01%)
    - 표1의 이상반응들은 기관계 별로 구분하였고, 발생빈도에 따라 나열하였다.
[표 1]. 성인을 대상으로 한 12개의 위약- 및/또는 활성약-대조 임상시험에서의 이상반응 및 1일 25 mg에서 800 mg의 용량으로 투여한 89개의 통증 및 염증 무작위, 대조 임상시험을 기초로 산정한 발생빈도

| 발생 빈도           | 발생 빈도                    |
|-----------------|--------------------------|
| <b>흔하게</b>      | 기관지염, 부비강염, 상기도 감염, 요로감염 |
| <b>흔하지않게</b>    | 인두염, 비염                  |
| <b>흔하지 않음</b>   |                          |
| <b>혈액 및 림프계</b> |                          |
| 흔하지 않게          | 빈혈                       |
| 드물게             | 혈소판감소증                   |
| <b>면역계</b>      |                          |
| 흔하지 않게          | 과민성                      |
| <b>정신계</b>      |                          |
| 흔하게             | 불면증                      |
| 흔하지 않게          | 불안                       |
| 드물게             | 착란 상태                    |
| <b>신경계</b>      |                          |
| 흔하게             | 머지러움                     |
| 흔하지 않게          | 근육긴장형진, 출혈               |

- (5) 혈관: 매우 드물게 - 혈관염
- (6) 호흡, 흉부 및 종격: 드물게 - 폐색전증, 간질성 폐렴
- (7) 위장관: 드물게 - 위장관 출혈
- (8) 간담도: 드물게 - 간염
  - 매우 드물게 - 간부전, 전간괴사, 간괴사, 담즙정체, 담즙정체간염, 황달
- (9) 피부 및 피하조직: 드물게 - 광민감 반응
  - 매우 드물게 - 스티븐-존슨 증후군, 다형홍반, 독성표피괴사 증후군, 호산구증가와 전신성상을 동반한 약물발진(DRESS), 급성 전신발진증후군(acute generalized exanthematous pustulosis, AGEP), 약물피부염
- (10) 신장 및 비뇨계: 드물게 - 급성 신부전, 지나들혈증
  - 매우 드물게 - 요세관간질신장염, 신중후군, 미세혈변
- (11) 생식기 및 유방: 드물게 - 월경장애
  - 빈도 불명† - 여성 불임증(여성생식능력 감소)
- (12) 전신 및 두어부위: 흔하지 않게 - 기승통증
  - † 임신을 계획하고 있는 여성은 모든 임상시험에서 배제되었으므로, 이 이상반응 의 빈도에 대해 임상시험자료를 참고하는 것은 적절하지 않다.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5. <b>일반적 주의</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1) 이 약을 투여하기 전에 이 약 및 다른 대체 치료법의 잠재적인 위험성과 유익성을 고려해야 한다. 이 약의 복용량과 노출기간이 증가할수록 심혈관계 위험도가 커지므로 가능한 최단 기간동안 최소 유효용량으로 투여한다. 특히 혈관질환(퇴행관절염) 환자의 경우에 추가적으로 재평가 해야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2) 위장관계 영향: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 경장성 질환이나 위장관 출혈의 병력이 있는 환자에서 신중히 복용한 후의 결과에 유의해야 한다. 소화성 궤양, 질환 및/또는 위장관 출혈의 병력이 있는 환자의 경우 이러한 위험인자가 없는 환자에 비해 비스테로이드성 소염진통제 투여시 위장관 출혈의 발생 위험이 10배 이상 증가하였다. 위장관계 출혈을 증가시키는 다른 위험인자로는 경구용 코르티코스테로이드 또는 항응고제 병용, 비스테로이드성 소염진통제 또는 아스피린의 병용 일괄 섭취, 심혈관계 질환, 흡연, 고령, 허약한 건강상태 등이 있다. 치장적인 위장관계 이상반응에 대한 치질적 보고의 대부분은 고령자 및 허약자에 대한 것이므로, 이러한 환자에서 이 약을 투여시 특별히 주의하여야 한다.                                  |  |
| 3) 고혈압: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압을 일으키거나, 기존의 고혈압을 악화시킬 수 있으며, 이로 인해 심혈관계 유해사태의 발생률이 증가될 수도 있다. 티아지디제 이노제 또는 루프제 이노제를 복용중인 환자가 비스테로이드 소염진통제 복용시 이들 요법에 대한 반응이 감소될 수 있다. 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압 환자에게 신중히 투여해야 한다. 이 약의 투여 초기와 두어기간 동안에 혈압을 면밀히 모니터링해야 한다                                                                                                                                                                              |  |
| 4) 울혈성심부전 및 부종: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 복용하는 일 부 환자에서 부액 저류 및 부종이 관찰되기도. 프로스타글린단 합성 저해로 신기는 약화 및 체액저류가 유발될 수 있으므로 이 약은 신부전, 좌심실 기능 장애, 또는 고혈압의 병력이 있는 환자나 부종이나 체액저류가 있는 환자에서 신중히 투여해야 한다. 또한 이노제를 투여하고 있거나 다른 사유로 혈장저하증의 위험이 있는 환자의 경우 또한 이 약 투여시 주의하여야 한다.                                                                                                                                                                                 |  |
| 5) 신장애에 대한 영향: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 신독성을 일으킬 수 있다. 임상시험에서 나타난 이 약의 신장애에 대한 영향은 대조약으로 사용된 비스테로이드성 소염진통제에서 관찰된 것과 유사하였다. 비스테로이드성 소염진통제를 장기간 복용시 신장유괴나나 기타 신장 손상이 일어날 수 있다. 또한, 신혈류를 유지하는데 프로스타글린단인 역할이 중요하므로, 신기는 장애 환자, 심부전 환자, 간기는 장애 환자, 이노제, ACE 억제제, 또는 안지오텐신 길항제를 투여 중인 환자, 고령자 등 신독성의 위험이 가장 큰 환자에서는 특별한 주의가 필요하다. 투약을 중단하면 대조류 치료 성태에 회복된다.                                                                                        |  |
| 6) 진통제 신질환: 진통제 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없다. 따라서, 진통제 신질환 환자에 대해서는 이 약의 투여가 권장되지 않는다. 이 약의 투여를 계속하여 한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 7) 간에 대한 영향: 중증의 간장애(Child-Pugh Class C) 환자에 대해서는 연구되지 않았다. 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 간기는 수치의 상승이나 나타날 수 있다. 이러한 비정상적인 검사치에는 치료가 지시됨에 따라 악화되거나 변화가 없거나 또는 일시적일 수 있다. 또한 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 투여로, 황당, 치장적 전작성 간염, 간괴사, 간부전증후군은 치명적이나나 간이상이 필요함)을 포함한 중증의 간 관련 이상반응이 드물게 보고되었다. 간기능 이상을 감지하는 증상 및/또는 징후가 있는 환자 또는 간기능 시험 결과 비정상인 환자에서는 두어기간 동안 주의깊게 간기능의 악화 여부를 관찰하고, 간질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후 (예, 호산구증가증, 발진)가 발생되는 경우에는 이 약의 투여를 중지한다. |  |
| 8) 이 약의 장기간 투여로 변혈이나 혈액 손실의 증상 또는 징후가 나타나는 경우에는 헤모글로빈 또는 헤모크리트리지 감사를 해야 한다. 이 약은 일반적으로 혈소판 수치나 프로트롬빈 시간 (PT), 부분트롬보플라스틴시간 (PTT)에는 영향을 미치지 않으며 권장용량에서 혈소판 응집을 억제하지 않는다.                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 9) 비스테로이드성 소염진통제를 장기간 투여하는 환자는 정기적으로 전혈구 검사 (CBC) 및 이화학적 감사를 실시해야 한다. 관찰한 모든 신질환과 관련된 임상증상이나 전신적인 징후(예, 호산구증가증, 발진)가 발생되거나 비정상적인 간기능 감사를 토하는 신기능 결과가 지속되거나 악화되면, 이 약의 투여를 중단해야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 10) 아니콜리시드성 소염진통제: 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 아니콜리시드성 소염진통제 복용시 위장관 출혈이 발생할 수 있다. 이러한 비정상적인 검사치에는 치료가 지시됨에 따라 악화되거나 변화가 없거나 또는 일시적일 수 있다. 또한 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 투여로, 황당, 치장적 전작성 간염, 간괴사, 간부전증후군은 치명적이나나 간이상이 필요함)을 포함한 중증의 간 관련 이상반응이 드물게 보고되었다. 간기능 이상을 감지하는 증상 및/또는 징후가 있는 환자 또는 간기능 시험 결과 비정상인 환자에서는 두어기간 동안 주의깊게 간기능의 악화 여부를 관찰하고, 간질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후 (예, 호산구증가증, 발진)가 발생되는 경우에는 이 약의 투여를 중지한다.                                 |  |
| 11) 비부반응: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제, 피부부전증후군 (스티븐스-존슨 증후군) 및 독성 표피괴사증후(리델증후군) 같은 중대한 피부 이상반응을 일으킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이를 중대한 이상반응은 경도 증상 없이 발생할 수 있으며 심하게 심하게 악화된가의 병력이 있는 환자에서도 발생할 수 있다 . 대부분의 경우 이러한 이상반응은 두어 초기 1개월 이내에 발생한다. 환자는 이러한 피부 발현 증상 및 증후에 대해 알고 있어야 하며 피부 발진, 경박편모는 즉시, 발열, 가려움과 같은 과민반응의 최초 증상 및 징후가 나타날 때 약물 투여를 중단해야 한다.                                                                                                    |  |
| 12) 심혈관 환자 중 일부는 비스테로이드성 소염진통제를 복용할 수 있다. 아스피린 민감성 천식 환자에게 아스피린을 사용하는 경우 치명적일 수 있는 중증의 기관지관련과 관련될 수 있다. 이러한 아스피린 민감성 환자들에게서 아스피린과 다른 비스테로이드성 소염진통제 간의 기관지관련증을 포함하는 교차반응이 보고되었다. 그러므로 이 약은 이러한 아스피린 민감성 환자에서는 투여하지 않도록 하며, 천식 환자에게는 주의깊게 사용해야 한다.                                                                                                                                                                                            |  |
| 13) 이 약은 코르티코이드 제제를 대체하거나 코르티코이드 결핍증을 치료하기 위한 약물로 사용될 수 있다. 코르티코스테로이드는 갑작스러운 투여 중단은 코르티코스테로이드-단양성 질환의 악화를 초래할 수 있다. 장기간 코르티코스테로이드를 복용해 온 환자들에게 이 약을 투여하고자 할 경우에는 서서히 용량을 감소시켜야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 14) 이 약의 약리학적 특성상 발열, 열증의 다른 증상과 병행해서 불면성화하여 통증성 및 위장관계 조각하에서 감점성 합병증의 전연을 지시할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 15) 심한 탈수 증상을 보이는 환자에서는 환자는 수분을 공급한 후 약을 투여를 시작하며 주의깊게 관찰해야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 16) 임산의 급성통증 완화(수술후 또는 발치후 진통)의 경우 단기간(1주일 이내)으로 사용된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 17) 관상동맥 우회도술(CABG) 직후 최초 10-14일까지의 통증 치료를 위하여 COX-2 선택성 비스테로이드성 소염진통제를 투여한 큰 규모의 통제된 임상시험 두 건의 결과 심근경색과 뇌졸중의 발생률이 증가하였다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 18) 정기적 검사 및 대변정혈검사 등을 실시해, 이상이 확인된 경우 휴약이나 투여중 지의 적절한 조치를 실시해야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 19) 이 약을 복용하고 있자리후, 출혈 등을 경험한 환자들은 운전이나 기계를 다루는 일은 피해야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 20) 이 약을 혈소판 기능에 대한 작용이 없으므로 심혈관 혈전색전질환의 예방을 위한 아세틸살리실산에 대체할 수 있다. 다른 비스테로이드성 소염진통제에 대한 이차 병역이나 병형에 근거하여 CYP 2C9의 느린 대사군(poor metabolizer)으로 의심되는 환자에서는 청소를 감소로 인해 혈장농도가 비정상적으로 상승할 수 있으므로, 이 약을 투여시 주의해야 한다. 최저 권장용량의 절반용량으로 투여를 시작하는 것을 고려한다.                                                                                                                                                                                             |  |
| 이 약과 CYP 2C9 억제제를 병용투여시 이 약의 혈장농도가 상승할 수 있다. 따라서, 이 약을 CYP 2C9 억제제와 병용투여시 이 약 투여용량 감소가 필요할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 이 약을 리튬피진, 카르바마제핀 및 바르비투르와 같은 CYP 2C9 유도제와 병용투여시 이 약의 혈장농도가 감소할 수 있다. 따라서, 이 약을 CYP 2C9 유도제와 병용투여시 이 약의 용량증가가 필요할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 21) 플루로키놀론 케토나졸은 플루로키놀 200 mg을 1회 1회 병용투여시 플루로키나졸에 의해 이 약의 CYP 2C9를 통한 대사가 억제되어 이 약의 혈중 농도가 2배 증가되었으며 이 약의 병용을 시작하는 경우 권장용량의 절반으로 투여한다. CYP 3A4 억제제인 케토나졸은 이 약의 대사에 임상적으로 의미있는 지해를 보이지 않았다.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 22) CYP 2D6: 약독력 임상연구 및 In vitro 연구에 의하면, 이 약은 CYP 2D6의 기질은 아니지만 억제제로 밝혀졌으므로, CYP 2D6에 의해 대사는 약물에 in vivo에서 상호작용을 일으킬 수도 있다. 이 약과 병용투여시 CYP 2D6의 기질의 항우울제(삼환체 및 SSRI), 신경이완제, 항암항암약물, 엑스트로메타론 등의 혈장농도가 증가할 수 있다. 이 약의 병용투여를 시작하는 경우에는 이러한 약물의 용량 감소를, 이 약의 병용투여를 중단하는 경우에는 이러한 약물의 용량 증가가 필요할 수 있다.                                                                                                                                         |  |
| 23) In vitro 연구에서 이 약이 CYP 2C19에 의해 매개되는 대사를 일부 저해하는 것으로 확인되었다. 이러한 결과의 임상학적 유의성은 알려지지 않았으나, CYP 2C19에 의해 대사는 약물에 아니콜리시드, 시트로프람 및 이미다프라민 등이 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 24) 안지오텐신 전효소소 억제제(ACEIs), 안지오텐신 수용체 길항제(안지오텐신 수용체 저해제, ARB로 알려진), 이노제 및 베타차단제를 포함한 항고혈압 약물: 프로스타글린단인 약제는 ACEIs, ARBs, 이노제 및 베타차단제를 포함한 항고혈압약물의 효과를 감소시킬 수 있으므로 이 약과 ACEIs, ARBs, 이노제 및 베타차단제를 병용투여시 이러한 상호작용을 주의해야 한다. 신기능이 저하된 환자, 고령자 또는 이노제를 투여 중인 경우를 포함하여 체액이 고갈된 환자에게 선택적 COX-2 억제제(세레크시브)를 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 ACE 억제제나 안지오텐신 II 수용체 길항제 또는 이노제와 병용투여하는 경우 급성                                                                        |  |

- 2) 위약 또는 활성 대조약과의 비교임상시험에 의하면, 이상반응으로 인한 약물 투여 중단비율은 이 약 두어군에서 7.1%, 위약군에서 6.1%이었다. 이 약 투여를 중단시킨 이상반응 중 가장 빈번한 것은 소화불량과 복통이었다. 이 약의 위약군과 활성군에 상관없이, 이 약의 투여 후 상연이제 보고된 이상반응은 다음과 같다.
  - 위장관계: 소화불량(8.8%), 설사(5.6%), 과민성대장증후군, 배변불수 증가, 때때로 복통, 상복부통증, 고장, 구역, 변비, 게실염, 삼킨과근, 지름, 식도염, 위장염, 위장관계염, 위식도 역류, 위 불쾌감, 위장장애, 담즙, 알콜성 헤르티다, 혈변, 구강건조, 구내염, 위무양, 치아질환, 구도, 위장관 염증의 악화, 구각기관, 드물게 장폐색증, 장관천공, 위장관 출혈, 출혈성 대장염, 식도천공, 책장염, 장파쇄증, 치아발치후 지조감염, 장문열 궤양, 흑색변, 설염, 이파드신 구내염, 구강궤양 수포형성, 입의 감각이 둔해짐, 구강내 통증이 나타날 수 있다.
  - 중증 및 말초 신경계: 두통 (15.8%), 때때로 어지러움, 다리 경련, 구강화진, 자각발진, 편두통, 신경통, 신경병증, 지각이상, 뇌경색, 드물게 무균성 수막염, 운동실조, 지각, 후각실조, 무미각증
  - 천식: 때때로 통통, 알레르기 악화, 알레르기 반응, 무력, 가슴통증, 체액저류/말초성 부종, 전신성 부종, 말골부종, 피로, 편대골, 위, 알골 흉조, 인플루엔자 증상 증후군, 통증, 말초성 부종, 드물게 관절염, 급사, 아니콜리시드오의 반응, 혈관부종
  - 정신신경계: 때때로 불면증, 식욕부진, 불안, 식욕증가, 우울증, 신경과민과 우울, 졸음, 치명적 두개내 출혈, 착란, 환각, 간헐적
  - 호흡기계: 상기도 감염(8.1%), 부비강염(5.0%), 때때로 인두염, 비염, 기관지염, 기관지 경련, 악성성 기관지 경련, 기침, 호흡곤란, 후두염, 폐렴, 드물게 코피, 발생성염
  - 피부 및 부속기관: 수포성 피부병, 반상출혈, 때때로 발진, 발모증, 피부병, 손발톱염, 광민감반응, 소양감, 홍반성 발진, 반상성 구진성 발진, 피부질환, 피부부전증, 발진홍조, 두드러기, 다형홍반, 발발피부병, 피부부전증후군(스티븐-존슨증후군), 독성표피괴사증후(리델증후군), 습진, 지반증, 알레르기 피부부전, 드물게 정상출혈, 발진, 호산구증가와 전신성상을 동반한 약물발진(Drug rash with eosinophilia and systemic symptom, DRESS 또는 과민반응 증후군)
  - 심혈관계: 부정맥, 심심비대, 때때로 악성성 고혈압, 고혈압, 협심증, 불안정 협심증, 관상동맥질환에, 심근경색증, 심부전, 울혈성심부전, 심낭염진, 빈맥, 뇌졸중, 대동맥판파쇄부전증, 혈중, 동성혈액, 드물게 실신, 심생성 세동, 폐색전증, 뇌혈관 말작, 말초성 괴사, 혈전성 정맥염, 혈관염, 심부정맥 혈전증, 뇌출혈
  - 감염: 상기도 감염, 단독(erysipelas), 성상감염, 치은염, 때때로 단순포진, 대장포진, 박테리아성 감염, 전신성 감염, 연조직 감염, 바이러스성 감염, 모노리리증, 생식기 모노리리증, 종양염
  - 생식기계: 유방암통, 폐경기 증상, 때때로 흉부 유선 섬유증증, 흉부선생물(여성), 가시통증(여성), 월경통, 월경장애, 질출혈, 질염, 전립선 장애, 난소낭종, 가임: 때때로 정자정숙, 개의 이상, 이동, 임신, 난정
  - 간 및 담도계: 때때로 간기능 이상, ALT상승, AST상승, γ -GTp 증가, ALP 증가, 요(尿)로빌리노겐 양성, 드물게 담석증, 간염, 황달, 간부전, 전작성 간염, 간괴사
  - 대사 및 영양: 혈당증 나트륨증 증가, 혈중 칼륨 증가, 때때로 BUN 증가, CPK 증가, 당뇨병, 과글라세미콜증, 고혈당증, 저칼륨증, 고칼륨혈증, NPN 증가, 크레아티닌 증가, 알카리조-파타제 증가, 체중증가, 식욕부진, LOH 증가, 드물게 지혈장애, 지나들혈증
  - 골격기계: 혈액학, 때때로 관절통, 관절염, 골격이상, 근육통, 경부간격증, 활막염, 간염, 근염, 다리경련, 골절, 건염염, 드물게 등의 통증, 근육경직
  - 혈액계: 헤마토크리트 감소, 헤모글로빈 증가, 때때로 반상출혈, 코피, 혈소판 혈변, 빈혈, 드물게 혈소판 감소증, 무과립구증, 재생불량성 빈혈, 병혈구감소증, 백혈구감소증
  - 두어부위: 때때로 붓음성, 접촉 피부염, 주사부위반응, 피부수과결절
  - 수두기관: 때때로 이각도작
  - 요로계: 때때로 알부민뇨, 방광염, 혈뇨, 배뇨장애, 빈뇨증, 신결석, 요실금, 요로감염
  - 눈: 때때로 시야혼탁, 백내장, 결막염, 눈의 통증, 녹내장, 드물게 안구출혈, 망막출혈 또는 점막백내장
  - 신장: 혈중 크레아티닌 증가, β2-마이크로글로불린 증가, 때때로 NAG 증가, 요석질 양성, 요단백 양성, 드물게 신기능 장애, 급성 신부전, 간질성 신우염, 요로결양

- 3) 국사 시판후 조사 결과
  - 국내에서 6년 동안 실시한 시판후 사용성적조사결과, 약과의 인과관계에 상관 없이 총5,648례 중 305례(5.40%)에서 338건의 이상반응이 보고되었다.소화불량이 155건(2.74%)으로 가장 많았으며, 알골부종 54건(0.96%), 복통 33건(0.58%), 구역 13건(0.23%), 말초성 부종, 발진 각 12건(0.21%), 설사 10건(0.18%), 불면증 7건(0.12%) 순으로 나타났다.
  - 기타 이상반응으로 두통, 현기증이 각 52건(0.09%) 보고되었으며, 변비, 위궤양, 과민성, 빈혈이 각 22건(0.04%), 구갈, 귀양성 구내염, 위염, 알레르기, 요통, 가슴통증, 고지혈증, 당뇨, 체중증가, 골절, 관절통, RA factor양성, 대장포진, 폐렴, 호흡곤란, ALT, 상승, 난창이 각 1건(0.02%) 보고되었다.

- 3) 국외 시판후 조사 결과
  - 시판후 경험에서 확인된 이상반응들은 아래와 같다. 이들 이상반응들은 시판후 조사에서 확인업었지만, 빈도와 평가에는 임상시험자료가 사용되었다. 위와 마찬가지로 발생빈도는 환자 38,102명에서의 노출을 나타내는 임상시험들의 통합결과를 기초로 한다. 빈도의 정의: 매우 흔하게(>10%), 흔하게(>1%, <10%), 흔하지 않게(>0.1%, <1%), 드물게(>0.01%, <0.1%), 매우 드물게(<0.01%) 빈도 불명(기준의 자료로 평가할 수 없음)
  - 1) 면역계: 매우 드물게 - 아니콜리시드 반응
  - 2) 정신계: 드물게 - 환각
  - 3) 신장계: 매우 드물게 - 뇌출혈, 무균수막염, 미각상실, 후각상실
  - (4) 눈: 흔하지 않게 - 결막염

- (5) 혈관: 매우 드물게 - 혈관염
- (6) 호흡, 흉부 및 종격: 드물게 - 폐색전증, 간질성 폐렴
- (7) 위장관: 드물게 - 위장관 출혈
- (8) 간담도: 드물게 - 간염
  - 매우 드물게 - 간부전, 전간괴사, 간괴사, 담즙정체, 담즙정체간염, 황달
- (9) 피부 및 피하조직: 드물게 - 광민감 반응
  - 매우 드물게 - 스티븐-존슨 증후군, 다형홍반, 독성표피괴사 증후군, 호산구증가와 전신성상을 동반한 약물발진(DRESS), 급성 전신발진증후군(acute generalized exanthematous pustulosis, AGEP), 약물피부염
- (10) 신장 및 비뇨계: 드물게 - 급성 신부전, 지나들혈증
  - 매우 드물게 - 요세관간질신장염, 신중후군, 미세혈변
- (11) 생식기 및 유방: 드물게 - 월경장애
  - 빈도 불명† - 여성 불임증(여성생식능력 감소)
- (12) 전신 및 두어부위: 흔하지 않게 - 기승통증
  - † 임신을 계획하고 있는 여성은 모든 임상시험에서 배제되었으므로, 이 이상반응 의 빈도에 대해 임상시험자료를 참고하는 것은 적절하지 않다.

5. **일반적 주의**
  - 이 약을 투여하기 전에 이 약 및 다른 대체 치료법의 잠재적인 위험성과 유익성을 고려해야 한다. 이 약의 복용량과 노출기간이 증가할수록 심혈관계 위험도가 커지므로 가능한 최단 기간동안 최소 유효용량으로 투여한다. 특히 혈관질환(퇴행관절염) 환자의 경우에 추가적으로 재평가 해야 한다.
  - 위장관계 영향: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 경장성 질환이나 위장관 출혈의 병력이 있는 환자에서 신중히 복용한 후의 결과에 유의해야 한다. 소화성 궤양, 질환 및/또는 위장관 출혈의 병력이 있는 환자의 경우 이러한 위험인자가 없는 환자에 비해 비스테로이드성 소염진통제 투여시 위장관 출혈의 발생 위험이 10배 이상 증가하였다. 위장관계 출혈을 증가시키는 다른 위험인자로는 경구용 코르티코스테로이드 또는 항응고제 병용, 비스테로이드성 소염진통제 또는 아스피린의 병용 일괄 섭취, 심혈관계 질환, 흡연, 고령, 허약한 건강상태 등이 있다. 치장적인 위장관계 이상반응에 대한 치질적 보고의 대부분은 고령자 및 허약자에 대한 것이므로, 이러한 환자에서 이 약을 투여시 특별히 주의하여야 한다.
  - 고혈압: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압을 일으키거나, 기존의 고혈압을 악화시킬 수 있으며, 이로 인해 심혈관계 유해사태의 발생률이 증가될 수도 있다. 티아지디제 이노제 또는 루프제 이노제를 복용중인 환자가 비스테로이드 소염진통제 복용시 이들 요법에 대한 반응이 감소될 수 있다. 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압 환자에게 신중히 투여해야 한다. 이 약의 투여 초기와 두어기간 동안에 혈압을 면밀히 모니터링해야 한다
  - 울혈성심부전 및 부종: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 복용하는 일 부 환자에서 부액 저류 및 부종이 관찰되기도. 프로스타글린단 합성 저해로 신기는 약화 및 체액저류가 유발될 수 있으므로 이 약은 신부전, 좌심실 기능 장애, 또는 고혈압의 병력이 있는 환자나 부종이나 체액저류가 있는 환자에서 신중히 투여해야 한다. 또한 이노제를 투여하고 있거나 다른 사유로 혈장저하증의 위험이 있는 환자의 경우 또한 이 약 투여시 주의하여야 한다.
  - 신장애에 대한 영향: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 신독성을 일으킬 수 있다. 임상시험에서 나타난 이 약의 신장애에 대한 영향은 대조약으로 사용된 비스테로이드성 소염진통제에서 관찰된 것과 유사하였다. 비스테로이드성 소염진통제를 장기간 복용시 신장유괴나나 기타 신장 손상이 일어날 수 있다. 또한, 신혈류를 유지하는데 프로스타글린단인 역할이 중요하므로, 신기는 장애 환자, 심부전 환자, 간기는 장애 환자, 이노제, ACE 억제제, 또는 안지오텐신 길항제를 투여 중인 환자, 고령자 등 신독성의 위험이 가장 큰 환자에서는 특별한 주의가 필요하다. 투약을 중단하면 대조류 치료 성태에 회복된다.
  - 진통제 신질환: 진통제 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없다. 따라서, 진통제 신질환 환자에 대해서는 이 약의 투여가 권장되지 않는다. 이 약의 투여를 계속하여 한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 한다.
  - 간에 대한 영향: 중증의 간장애(Child-Pugh Class C) 환자에 대해서는 연구되지 않았다. 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 간기는 수치의 상승이나 나타날 수 있다. 이러한 비정상적인 검사치에는 치료가 지시됨에 따라 악화되거나 변화가 없거나 또는 일시적일 수 있다. 또한 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 투여로, 황당, 치장적 전작성 간염, 간괴사, 간부전증후군은 치명적이나나 간이상이 필요함)을 포함한 중증의 간 관련 이상반응이 드물게 보고되었다. 간기능 이상을 감지하는 증상 및/또는 징후가 있는 환자 또는 간기능 시험 결과 비정상인 환자에서는 두어기간 동안 주의깊게 간기능의 악화 여부를 관찰하고, 간질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후 (예, 호산구증가증, 발진)가 발생되는 경우에는 이 약의 투여를 중지한다.
  - 이 약의 장기간 투여로 변혈이나 혈액 손실의 증상 또는 징후가 나타나는 경우에는 헤모글로빈 또는 헤모크리트리지 감사를 해야 한다. 이 약은 일반적으로 혈소판 수치나 프로트롬빈 시간 (PT), 부분트롬보플라스틴시간 (PTT)에는 영향을 미치지 않으며 권장용량에서 혈소판 응집을 억제하지 않는다.
  - 비스테로이드성 소염진통제를 장기간 투여하는 환자는 정기적으로 전혈구 검사 (CBC) 및 이화학적 감사를 실시해야 한다. 관찰한 모든 신질환과 관련된 임상증상이나 전신적인 징후(예, 호산구증가증, 발진)가 발생되거나 비정상적인 간기능 감사를 토하는 신기능 결과가 지속되거나 악화되면, 이 약의 투여를 중단해야 한다.
  - 10) 아니콜리시드성 소염진통제: 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 아니콜리시드성 소염진통제 복용시 위장관 출혈이 발생할 수 있다. 이러한 비정상적인 검사치에는 치료가 지시됨에 따라 악화되거나 변화가 없거나 또는 일시적일 수 있다. 또한 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 투여로, 황당, 치장적 전작성 간염, 간괴사, 간부전증후군은 치명적이나나 간이상이 필요함)을 포함한 중증의 간 관련 이상반응이 드물게 보고되었다. 간기능 이상을 감지하는 증상 및/또는 징후가 있는 환자 또는 간기능 시험 결과 비정상인 환자에서는 두어기간 동안 주의깊게 간기능의 악화 여부를 관찰하고, 간질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후 (예, 호산구증가증, 발진)가 발생되는 경우에는 이 약의 투여를 중지한다.
  - 11) 비부반응: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제, 피부부전증후군 (스티븐스-존슨 증후군) 및 독성 표피괴사증후(리델증후군) 같은 중대한 피부 이상반응을 일으킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이를 중대한 이상반응은 경도 증상 없이 발생할 수 있으며 심하게 심하게 악화된가의 병력이 있는 환자에서도 발생할 수 있다 . 대부분의 경우 이러한 이상반응은 두어 초기 1개월 이내에 발생한다. 환자는 이러한 피부 발현 증상 및 증후에 대해 알고 있어야 하며 피부 발진, 경박편모는 즉시, 발열, 가려움과 같은 과민반응의 최초 증상 및 징후가 나타날 때 약물 투여를 중단해야 한다.
  - 12) 심혈관 환자 중 일부는 비스테로이드성 소염진통제를 복용할 수 있다. 아스피린 민감성 천식 환자에게 아스피린을 사용하는 경우 치명적일 수 있는 중증의 기관지관련과 관련될 수 있다. 이러한 아스피린 민감성 환자들에게서 아스피린과 다른 비스테로이드성 소염진통제 간의 기관지관련증을 포함하는 교차반응이 보고되었다. 그러므로 이 약은 이러한 아스피린 민감성 환자에서는 투여하지 않도록 하며, 천식 환자에게는 주의깊게 사용해야 한다.
  - 13) 이 약은 코르티코이드 제제를 대체하거나 코르티코이드 결핍증을 치료하기 위한 약물로 사용될 수 있다. 코르티코스테로이드는 갑작스러운 투여 중단은 코르티코스테로이드-단양성 질환의 악화를 초래할 수 있다. 장기간 코르티코스테로이드를 복용해 온 환자들에게 이 약을 투여하고자 할 경우에는 서서히 용량을 감소시켜야 한다.
  - 14) 이 약의 약리학적 특성상 발열, 열증의 다른 증상과 병행해서 불면성화하여 통증성 및 위장관계 조각하에서 감점성 합병증의 전연을 지시할 수 있다.
  - 15) 심한 탈수 증상을 보이는 환자에서는 환자는 수분을 공급한 후 약을 투여를 시작하며 주의깊게 관찰해야 한다.
  - 16) 임산의 급성통증 완화(수술후 또는 발치후 진통)의 경우 단기간(1주일 이내)으로 사용된다.
  - 17) 관상동맥 우회도술(C