

땀 · 타박상 · 외상(상처)성 염증 · 국소형 류마티스질환

디페낙겔 1%

디클로페낙디에틸암모늄

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

디클로페낙디에틸암모늄(KP)	11.6mg
(디클로페낙나트륨으로서 10.0mg)	
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	1mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필(KP)	1mg

【성상】 흰색의 균질한 겔제

【효능 · 효과】

- 다음 질환 및 증상의 진통 · 소염(항염)
1. 건(힘줄), 인대, 근육 및 관절의 외상(상처)성 염증(땀, 타박상 등)
 2. 연조직 류마티스의 국소형(건초염(힘줄윤활막염), 어깨손증후군, 점액낭염, 관절주위염 등)
 3. 류마티스 질환의 국소형(말초관절 및 척추의 골(뼈)관절증 등)

【용법 · 용량】

12세 이상의 성인 및 청소년 : 통증 부위의 면적에 따라 2~4g을 1일 3~4회 환부(질환 부위)에 바르고 가볍게 문지른다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이약을 사용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
 - 2) 아스피린 또는 기타의 비스테로이드성 소염(항염)진통제에 천식발작, 두드러기 또는 급성비염(급성 코염)과 같은 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
 - 3) 12세 이하의 소아
 - 4) 임부 및 수유부
2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
 - 1) 병변(병에 의한 몸의 변화)이 있는 피부(출혈성 피부질환, 습진, 감염된 병변(병에 의한 몸의 변화), 화상, 상처), 눈 및 점막부위에는 사용하지 않는다.
 - 2) 밀봉봉대법으로 사용하지 않는다.
 - 3) 피부에 손상이 있을 경우 사용하면 일시적인 자극 및 저린감을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의한다.
3. 다음과 같은 사람은 이약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

기관지 천식 환자(중증(심한 증상) 천식발작을 일으킬 수 있다)
4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 면역계 : 과민반응, 혈관신경성 부종(부기)이 매우 드물게 나타날 수 있다.
 - 2) 호흡기계 : 천식이 매우 드물게 나타날 수 있다.
 - 3) 피부 및 피하조직 : 때때로, 발진, 습진, 홍반(붉은 반점) 및 피부염(접촉성피부염 포함)이 나타날 수 있으며, 드물게 수포성 피부염이 나타날 수 있고, 매우 드물게 광과민반응, 농포(고름물집)성 발진이 나타날 수 있다.
 - 4) 이 약을 넣은 부위에 장기간 사용할 경우 전신(온몸)이상반응이 나타날 수 있다.

- 5) 갑자기 과용량을 사용하여 저혈압, 신부전, 경련, 위장관(위창자) 불쾌감 및 호흡기능억제등의 전신(온몸) 이상반응이 나타날 수 있다.
5. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
- 1) 소염(항염)진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)임에 유의한다.
 - 2) 피부의 감염증을 불현성(증상이 드러나지 않는)화할 우려가 있으므로 감염을 수반하는 염증에 대해 이 약을 사용하는 경우에는 적당한 항균제 또는 항진균(곰팡이)제를 병용(함께 복용)하고 충분히 관찰하여 신중히 투여한다.
 - 3) 만성질환(퇴행성관절염(골(뼈)관절염) 등)에 이 약을 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법에 고려한다. 또 환자 상태를 충분히 관찰하고 이상반응 발현(드러냄)에 유의한다.
 - 4) 이 약 투여 2주 후에는 이 약에 대한 재검토가 이루어져야 한다.
 - 5) 사용후에는 손을 깨끗이 씻는다.(손가락 관절에 사용하는 경우 제외)

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 50그램 / 튜브

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ☎ 소비자상담전화 : 080-300-8282

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 02. 08