

- ※ 이 약을 복용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- ※ 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- ※ 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

Double Effect
손톱발육부진
+ 확산성 탈모완화

먹는 손톱 영양제

KERANAIL

케라네일

■ 사용설명서 ■

분류번호 325

일반의약품 KGMP



본 제품은 대한민국 식품의약품안전처
가 허가한 의약품입니다.

케라네일캡슐은 손톱을 구성하는 주요성분인 케라틴을 포함하여 L-시스틴, 약용효모 등 6가지 성분이 이상적으로 배합되어 손톱에 필수적인 영양소를 공급함으로써 손톱의 발육부진으로 인한 갈라짐 등을 막아 건강한 손톱을 만들어드립니다. 또한, 모발생장에 필요한 영양소 공급으로 탈모의 진행을 막고 건강한 모발을 만들어드립니다.

두부이외의 신체부위에서 발모현상이 나타날 수 있습니다.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

약용효모(별규)	100mg
케라틴(별규)	20mg
(총 아미노산으로서 L-트레오닌 2.97mg, L-페닐알라닌 2.41mg, L-이소로이신 2.70mg)	
티아민질산염(KP)	60mg
판토텐산칼슘(KP)	60mg
L-시스틴(KP)	20mg
p-아미노벤조산(USP)	20mg

첨가제(타르색소) : 적색3호, 청색1호

동물유래성분 : 스테아르산마그네슘(소의 우지)

[성상] 연회색 가루의 내용물이 든 상·하부 홍색불투명의 경질캡슐제

[효능·효과] 1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진 2. 확산성 탈모의 완화

[용법·용량] 성인 : 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 복용 / 소아 : 1일 1~2회, 1회 1캡슐 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 부작용

드물게 위통, 구토 등 위장관 불편감과 발한(땀이 남), 빈맥(빠른맥), 소양증(가려움증), 두드러기 등이 보고 되었으며, 두부이외의 신체부위에서 발모현상이 나타날 수 있다.

2. 일반적 주의

1) 설폰아미드제제와 동시 복용시 주의하여야 한다. 2) 홍터로 인한 탈모나 안드로겐 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 않는다. 3) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우 의사와 상의한다.

3. 임부, 수유부에 대한 투여

임부, 수유부에 투여할 경우는 의사와 상의한다.

4. 적응상의 주의

1) 평균 치료 기간은 3~6개월이고 보통 약 3~4개월 후부터 효과를 나타내며 필요한 경우 투여를 계속하거나 반복투여할 수 있다. 2) 본 제제는 당뇨병 환자에 투여할 수도 있다.

5. 저장상의 주의사항

1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 않는다. 2) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.

[포장단위] 63캡슐, 126캡슐

☎ 제품문의처 : 1666-9979

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

사용설명서 개정년월 : 2016.01

※ 이 약은 물과 함께 복용하십시오.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

※ 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(홍혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

※ 오용(잘못 사용)을 막고 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.

※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.

※ 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(drug.mfds.go.kr)의 의약품검색란을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 이 사용설명서 개정년월(2016년 01월) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인하실 수 있습니다.



판매자 : 현대약품주식회사 / 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55
제조사 : 콜마파마주식회사 / 충청북도 제천시 바이오밸리2로 93