


활성비타민 함유

맥스타민 프리미엄정

간편한 복용. 하루 한알!



항산화제 + 고단위 비타민B군 100mg
고함량 기능성 비타민

【원료약품 및 그 분량】 1정(1,200 mg) 중

시아노코발라민1000배산(시아노코발라민으로서 100.0 μg)(KP)	100.00 mg
리보플라빈(KP)	100.00 mg
젤산(KP)	100.00 μg
제피아스코르브산(아스코르브산으로서 100 mg)(별규)	103.10 mg
산화아연(아연으로서 15.0 mg)(KP)	18.68 mg
피리독신염산염(KP)	100.00 mg
니코틴산아미드(KP)	100.00 mg
판토텐산칼슘(KP)	100.00 mg
벤포타아민(티아민염산염으로서 36.15 mg)(KP)	50.00 mg
비오틴(USP)	100.00 μg
콜린타르타르산염(USP)	100.00 mg
이노시톨(KP)	100.00 mg
우르소데옥시콜산(KP)	5.00 mg
토코페롤아세이트2배산(비타민 E로서 10.0 IU)(KP)	20.00 mg
γ-오리자놀(KP)	10.00 mg
콜레칼시페롤과립(비타민 D로서 500 IU)(별규)	5.00 mg

【성 상】 적갈색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

○ 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, D, E의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

• 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절염(요하리통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 살염(혀염), 습진, 피부염

• 각기·눈의 피로·뼈, 이의 발육불량·구루병의 예방

○ 아연의 보급

【용법·용량】 12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회 1정을 식후 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 신장(콩팥)결석 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 3) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요 중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)
- 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

- ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장(콩팥)장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 9) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 위장관(창자)장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 저혈압, 폐부종(부기)
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간 손상을 일으킬 수 있습니다.
 - 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 우울심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용)) 투여 시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 10) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜하십시오.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
 - 3) 각종 요검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - 4) 요를 황색으로 변화시켜 하여 임상감사치에 영향을 줄 수 있습니다.
 - 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

◆ 소비자상담실 : 02-834-2607

【사용(유통)기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 60정/병, 120정(60정/병 x 2)

※ 자세한 사항은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조 하십시오.

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

개장연월일 : 2017년 04월 13일
0296 1 170402

【제조자】 (유)한중제약 / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로301 1층(창고), 3층, 5층, 봉동로 705

【제조(유통)지】 (주)일화 / 강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

<http://www.ilhwa.co.kr>

【판매원】 (주)유한메디카 / 서울 영등포구 신길로 215