

피 나 정
(피나스테리드)

【성분·함량】 1정 중
피나스테리드(USP) 5.0mg

첨가제(타르색소) : 청색2호 알루미늄레이크

【성상】 청색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 양성전립샘비대증 :

- 양성전립샘비대증 증상의 개선
- 비후된 전립샘의 퇴행 및 유류 개선
- 급성 요폐의 발생빈도 감소
- 전립샘 경요도 절제술(Transurethral Resection of the Prostate) 및 전립샘 절제술 등을 포함한 수술의 필요성 감소

【용법·용량】 피나스테리드로서 1일 1회 5 mg을 식사와 관계없이 경구투여한다.
- 복용 시 주사가 개선되더라도 최소 6개월간의 투여가 필요하다

- 신부전 환자: 약물동력학적으로 볼 때 이 약의 투여 시 어떤 변화도 없었으므로 여러 종류의 신부전 환자(크레아티닌청소율: 9.0 mL/min)에게 용량 조절할 필요가 없다

- 고려자 : 70세 이상 고려자에게 있어 이 약의 배설이 약간 감소되기는 하나 용량을 조절할 필요는 없다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 1) 이 약은 소아 또는 여성에게 투여하지 않는다.
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성은 피나스테리드의 흡수 및 그 이후 흡수 태아에 대한 잠재적 위험의 가능성이 있으므로 이 약의 부 서지거나 깨진 조각을 만져서는 안 된다. 이 약은 코팅되어 있기 때문에, 깨지거나 부서지지 않았다면 정상적인 취급 시에는 활성 성분과의 접촉을 방지할 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응을 환자
2) 여성 또는 소아
3) 입부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
4) 이 약을 유용할 것임으로 갈락토오스, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 안 된다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

간기능에 이상이 있는 환자

4. 이상반응

- 1) 이 약은 내약성이 우수하고 이상반응은 일반적으로 경미하고 일시적이었다.
- 2) 외국의 임상

4년3의 위약대금 감시시스템(PLPSS, Proscar Long Term Efficacy and Safety) 시스템에서 이 약으로 치료받은 1,524명의 환자과 위약 치료를 받은 1,516명의 환자에서 4년에 걸친 안전성 평가를 실시하였다. 이 약으로 치료한 3.7 % (57명)의 환자, 위약으로 치료한 2.1 % (32명)의 환자 가 심각한 문제인 이상반응으로 치료를 중단하였을 때, 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 발진과 관련되어 발생하였으나, 4년간의 임상시험에서 위약보다 이 약은 빈도로 발진에 있어 이 약에서의 발현율이 1 % 이상이었으며 임상시험현장에서 의해 약물과 관련되어 있을 가능성이 있지만, 파도과 관련되어 있다. 병용허 관련되어 있다 간주된 이상반응은 다음 표에 개관되어 있다. 임상시험 2~4에서는 투여기간 발기부전, 성욕감퇴, 사정장애 발현율에 유의적인 차이가 없었다.

표1. 약물관련 이상반응

	1년 (%)		2~4년 (%)	
	이 약(n=1524)	이 약(n=1516)	이 약(n=1524)	이 약(n=1516)
발기부전	8.1	3.7	5.1	5.1
성욕감퇴	6.4	3.4	2.6	2.6
시정맥각소	3.7	0.8	1.5	0.5
시정장대	0.8	0.1	0.2	0.1
유방비대	0.5	0.1	1.8	1.1
유방임통	0.4	0.1	0.7	0.3
발진	0.5	0.2	0.5	0.1

3) 장기사용에 관한 자료

3.047명의 환자를 대상으로 4~6년간 수행한 위암 발생대조 임상시험에서 이 약 5 mg를 투여받은 투여군에서는 위암의 유병률이 감소하였다. 위암은 위양성 대조군 및 양성대조군에서는 발생하지 않았다. 별도의 3,040명의 환자에서 대조군으로 4년간 수행한 임상시험에서 위양성군에서 위암은 18,827명의 남성이 참여한 7년간의 위양성대조임상시험(Prostate Cancer Prevention Trial, PCPT)에서 이 약 투여군 및 위양성군에서 각각 7년의 유병률이 발생하였다. 남성 유병률에 대한 현재 후고 있다. 이 약의 장기간 투여와 남성의 신장질환과의 관련성은 시험 알려져 있다.

PCTP 임상시험은 PSA 수치가 5.30 ng/mL 이하 성씨 및 전립선 특이항원(Prostate Specific Antigen, PSA) 수치가 ≤ 3.0 ng/mL 인 55세 이하 성씨 18,882명의 남성이 참여한 7년간의 무작위, 이중맹검, 위약대조 임상시험이었다. 남성은 1일 약 5 mg 용의 위약을 1일 1회 투여받았다. 실험군은 매해 전립선 지검 및 PSA를 평가받았으며, 생체조직검사는 PSA가 상승되거나 직장 수지검사에서 비정상적으로 나온 경우와 임상시험 기간에 사망을 시켰다. 위 약을 투여한 남성은 남성(1.1%) 이하의 위약을 투여한 남성은 남성(1.8%) 이하의 Gleason 등급 8~10인 전립선암의 발병률에도 더 높았다. 다른 50-원판 초록 요제제 두타스테리드에 대한 4년간의 위약대조 임상시험에서도 Gleason 등급 8-10의 전립선암에 대한 유사한 결과가 관찰되었으며 두타스테리드 vs. 위약 (0.5%), 약 5% 용을 투여한 전립선암 환자에 서의 임상적 위약은 중증되지 않았다.

4) 외국의 시판 후 조사

이 약 그리고/또는 이 약 저용량에서 다음과 같은 이상반응이 추가로 보고되었다. 이 이상반응은 불특정 인구집단에서 자발적으로 보고된 것이기 때문에, 발생빈도를 신뢰성 있게 예측하거나 약물노출과의 인과관계를 확립하는 것은 일반적으로 가능하지 않다.

- (1) 면역계 : 가려움, 두드러기 및 혈관부종(집중, 혀, 목구멍 및 얼굴의 중정을 포함)과 같은 과민반응
- (2) 청진계 : 우물증, 투여 중단 후 지속되는 성음감쇠
- (3) 생리기 및 유발 : 고혈압 : 투여 중단 후 지속되는 생리기 장애(발기부전, 사정장애) : 남성 불임 그리고/또는 정액의 질 저하, 피나스테리드 투여 중단 후 정액의 질 정상화 또는 개선이 보고되었다. : 남성 유발성
- (4) 원장장애(속맥), 어지럼, 두통

5) 국내의 시판 후 조사

6년동안 3,675명을 대상으로 실시한 시간 후 조사 결과 이상반응의 발현 빈도들은 인과관계와 상관없이 107명에서 124건(3.37 %)이 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계가 있을 수 있는 것으로 평가된 것은 위장장애(속 쓰림), 발기부전, 성욕감퇴, 사정장애(정액량 감소), 발진, 가려움, 과민반응, 두통, 어지러웠던

- (1) 소화기계 : 소화불량, 변비, 위장장애(속쓰림), 목마름 등 7건(0.19 %)
(2) 비호생식기계 : 발기부전, 성욕감퇴, 사정장애(정액량감소) 등 102건
(2.78 %)
(3) 피부 : 발진, 가려움증 등 2건(0.05 %)
(4) 전신 : 암손저림, 과민반응, 두통, 권태감 등 6건(0.16 %)
가 : 어지럼, 중이염, 간기는 이상 등 7건(0.19 %)

일반적 주의

- 1) 이 약에 의한 약효는 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 잔류노물 가지는 환자나 심각하게 요속이 감소한 환자는 장애편인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 한다.
- 2) 의사는 이 약으로 치료를 시작하기에 앞서 가역 전립선염 환자 진찰 저

장성 병광 또는 양성전립샘비대증(BPH)과 유사한 다른 신경질환을 확인하기 위한 적절한 평가를 실시해야 하며, 환자에게 제증상평가를 물어보도록 지도하고 처방을 강신할 때마다 한두 더 물어보도록 하여 환자들이 이 약과 관련된 최신 정보를 인식하도록 한다.

- 3) 의사는 이 약으로 치료하는 동안 일부 환자에서 사정액이 감소할 수 있다는 것을 환자에게 알려야 한다. 이런 사정액 감소가 정상적인 성기능을 방해하는 것으로 보지되는 않지만 이 약으로 치료를 받는 환자에서 발기부전과 성욕감퇴가 발생할 수도 있다.

- 4) 처방수치감사에서 정성이고 PSA 수치가 <3.0 ng/mL 인 55세 이상의 남성을 대상으로 7년간 이 약 1일 5 mg를 복용한 PCPT 임상시험에서 Gleason 등급 8~10의 전립샘암 위험성이 증가되었다(파나스타드 1.8 % vs. 위약 1.1 %). 다른 5α-환원효소 억제제(두타스테리드) 1 % 두타스테리드 vs. 0.5 % 위약에 대한 4년간의 위약대조 임상시험에서도 비슷한 결과가 관찰되었다. 5α-환원효소 억제제는 그동안 전립샘암 발전의 위험성을 증가시킬 수 있으나, 전립샘 부피를 감소시키기 위한 5α-환원효소 억제제 효과 때문인지, 이러한 연구들의 결과에 영향을 미치는 다른 요인들 때문인지는 확립되지 않았다.

6. 상호작용

- 1) 이 약과 관련된 약물상호작용은 알려진 바 없다.
- 2) 이 약은 CYP-450 관련 약물대사시스템에는 영향을 끼치지 않으므로 이러한 기전으로 대사되는 약물인 프로피라페론, 디곡신, 글리브리드, 외르파린, 테오필린, 안티피린 등과의 상호작용은 나타나지 않는다.
- 3) ACE억제제, 알파 차단제, 베타 차단제, 칼슘제단말단제, 심장성질환성제, 이뇨제, H2결핍제, HMG CoA환원효소억제제, 비스테로이드성소염진통제(NSAIDs), 쿨론제, 벤조다이아제핀 등과의 병용투여시 임상적으로 유의한 이상반응은 나타나지 않는다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 이 약은 임부나 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여를 금한다. 이 약을 임부가 복용 시 남성대비의 외부생식기의 비정상성을 초래할 수 있다(11월 5α-환원효소 억제제가 테스토스테론이 디하이드로테스토스테론으로 전환되는 것을 저해한다). 만일 이 약을 임신 중에 복용했거나 또는 이 약을 복용하는 중에 임신이 되면 임신여성에 남성대비의 대한 잠재적 위험성을 알려주어야 한다. 양친 캣츠를 대상으로 한 동물실험에서 임신 중에 자궁항의 이 약을 투여하였을 때 수컷새끼의 외음부기형을 초래하였다.
- 2) 이 약의 부수진 조각이 흡수되어 임부의 남성대비 외부생식기에 비정상성을 초래할 수 있으므로 이 약의 부수진 조각은 임부나 임신했을 가능성이 있는 여성이 취급해서는 안 된다. 그러나, 이 약은 깨어지거나 능가하지 않았다면 코팅이 되어 있어 정상적인 취급상에는 중독반응에 노출되지 않는다.
- 3) 임상시험에서 이 약 5 mg/day를 6~24주 동안 복용한 피험자의 정액에서 소량의 파나스타드리드가 회수되었다. 임신한 여성에게 이 약으로 치료를 받은 환자의 정액으로 노출되게 되는 파나스타드리드 농도는 rhesus 원숭이 동물실험에서 보고된 태아의 발육 기형에 대한 no-effect level에 해당하는 파나스타드리드의 농도보다 50~100배 낮은 용량이다.
- 4) 이 약의 모유로의 이행여부는 확실하지 않으며 수유부에는 투여하지 않는다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 소아에게는 투여할 수 없다.

9. 고령자에 대한 투여

외국에서 위약대조 임상시험(PLESS)에 참가한 피험자 중 65세 이상은 1,480명이고 75세 이상은 105명이었다. 고령자와 젊은 피험자간의 안전성과 유효성에 유의한 차이가 관찰되지 않았으며, 다른 임상적 경험에서도 고령자와 젊은 환자간의 반응에 차이가 없었다. 고령자에 대한 용량조절이 필요하지 않다.

10. 임상검사의 영향

- 1) 이 약으로 치료를 받은 전립샘암 환자에서 임상적 효능은 입증되지 않고 있다. 대조 임상시험에서 연속적인 전립샘특이항원(PSA) 수치와 전립샘 생검으로 PSA가 증가된 양성전립샘비대증 환자를 모니터링하였다. 이러한 BPH임상시험에서, 이 약은 전립샘암 진단 비율을 변화시키지 않는 것으로 나타났다. 또한, 전립샘암의 전제적인 발병률은 이 약으로 치료를 받은 환자 또는 위약 치료를 받은 환자에서 유의한 차이가 없었다. 이 약은 전립샘암 존재 하에서도 양성전립샘비대증 환자의 혈청 PSA 농도를 대략 50 %정도 감소시킨다. 이런 감소는 개별 환자에 따라 편차가 있긴 하지만, 전체 PSA수치 범위에서 예측가능하다. PLESS 임상시험의

3,000명 이상 환자로부터 얻은 PSA 자료 분석결과, 6개월 이상 이 약으로 치료를 받은 전정적인 환자의 PSA수치는 치료를 받지 않은 남성의 정상 범위와 비교시 2배로 조정해야 하는 사실이 확인되었다. 이런 조정으로 PSA 분석의 민감도와 특이도가 보존되고, 전립샘암 진단능력을 유지할 수 있다.

이 약으로 치료를 받는 환자의 지속적인 PSA 수치 증가는 이 약의 치료에 대한 비효율 문제를 고려하는 것을 비롯하여 추가적인 평가해야 한다. 유리 PSA수치 백분율(총 PSA에 대한 유리 PSA의 비율)은 이 약으로 인해 유의하게 감소하지 않는다. 총 PSA에 대한 유리 PSA의 비율은 이 약의 영향 하에서도 그대로 유지된다. 전립샘암 진단에 유리 PSA수치 백분율을 보조 수단으로 활용하는 경우, 이 수치에 대한 조정이 불필요하다.

- 2) 양성전립샘비대증 환자에서, 이 약은 코티솔, 에스트라디올, 프로락틴, 갑상선 자극 호르몬 또는 티록신의 순환 정도에 영향을 주지 않았다. 혈청 성질 프로파일(즉 총 콜레스테롤, 자일도지탄, 고밀도지단백, 트리글리세리드) 또는 골밀도에 대한 임상적으로 중요한 약효 효과는 관찰되지 않았다. 이 약을 복용하는 환자에서 황체형성호르몬(LH)과 난포자극호르몬(FSH)이 약 10 % 증가하는 것이 관찰되었지만, 수준은 정상범위 이내였다. 건강한 10년 자에서 이 약의 치료는 성선자극호르몬 방출 인자에 대한 LH와 FSH의 반응을 변화시키지 않는다. 이는 시상하부 뇌하수체 고환 축이 영향받지 않음을 시사한다.

건강한 남성 지원자에서 정액 파라미터를 평가하기 위한 24주간의 이 약 치료는 정액 농도, 운동성, 형태, pH에 임상적으로 유의한 영향을 주지 않았다. 사정시 전체 정액량이 감소되었고 0.6 mL(22.1 %)의 평균 사정량 감소가 관찰되었다. 이들 파라미터는 정상 수준 범위 안에 있었으며 치료를 중단하자 소멸되었다가 시작하여 평균 84주후 기저 상태로 회복되었다.

11. 과량투여시의 처리

- 1) 이 약의 과다 복용시에 관전되는 특별한 치료법은 없다.
- 2) 이 약을 400 mg까지 천회투여하거나 3개월간 1일 80 mg까지 반복 투여한 환자에서 이상반응이 나타나지 않았다.

12. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

【포장단위】 30정

【저장방법】 실온(30℃)보관, 차광기밀용기

- * 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 사용을 통하여 교환하여 드립니다.
 - * 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
 - * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- (이 첨부서지 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com이나 (080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.)

작성일자 : 2015. 04. 01
PM.102364(00)

【제조처】 제이더우메종외제약(주) / 충청남도 당진시 송곡읍 한진길 56

【제조지점】 제이더우메종 / 경기도 시흥시 경제로 59



마음까지 건강하게
(주) 서울제약