

투석 환자의 혈청 인 조절제

인벨라 정

세벨라머탄산염



전문 의약품
분류번호 : 219

【원료약품 및 그 분량】 1정 중
세벨라머탄산염(염기)..... 800mg

※【성 상】 흰색 내지 미백색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】 투석을 받고 있는 만성 신장질환 환자의 혈청 인 조절

【용법·용량】

이 약은 1일 3회 식사와 함께 복용하여야 한다.

1) 인산결합제를 복용하고 있지 않는 환자에 투여하는 경우
이 약의 권장투여용량은 0.8g 내지 1.6g 이며, 이 약 1~2정을 다음과 같
이 혈청 인 수치에 따라 대 식사와 함께 복용한다. 아래 표는 인산결합
제를 복용하고 있지 않은 환자에게 권장되는 이 약의 초기 용량을 보여
주고 있다.

표1. 인산결합제를 복용하고 있지 않은 투석 환자에서 초기 용량

혈청인	이 약 투여용량
5.5~7.5mg/dL	1회 1정, 1일 3회 식사와 함께 복용
7.5mg/dL 이상	1회 2정, 1일 3회 식사와 함께 복용

2) 세벨라머탄산염 정제를 복용하고 있는 환자에 이 약을 대제 투여하는 경우
세벨라머탄산염 정제를 복용하고 있는 환자에게 이 약을 대제 투여할
경우에는 동일 용량을 투여한다. 목표 혈청 인 수치에 도달하기 위해 적
절한 용량 조절이 필요할 수 있다. 투석을 받는 만성신장질환 환자에서
연구된 세벨라머탄산염의 최대 1일 용량은 14g이었다.

3) 세벨라머탄산염의 정제에서 산제로 또는 산제에서 정제로 대체하여 하는 경우
세벨라머탄산염 정제와 산제간의 대제 투여시 동일 용량을 투여한다. 목
표 혈청 인 수치에 도달하기 위해 적절한 용량 조절이 필요할 수 있다.

4) 초산칼슘제제를 복용하고 있는 환자에게 이 약을 대제 투여하는 경우
혈액 투석을 받는 만성신장질환 환자 84명을 대상으로 한 연구에서, 세
벨라머탄산염과 초산칼슘제제는 동일한 용량(mg당 대략히 mg)에서 유
사한 혈청 인의 감소를 나타냈다. 표2는 현재 초산칼슘 복용량을 기준으
로 하여 권장되는 이 약의 초기 용량을 보여주고 있다.

표2. 초산칼슘제제에서 이 약으로 대제 투여할 때 투석 환자의 초기 용량

초산칼슘제제 (1정당 초산칼슘 667mg 함유)	이 약 투여용량
1회 1정, 1일 3회	1회 1정, 1일 3회
1회 2정, 1일 3회	1회 2정, 1일 3회
1회 3정, 1일 3회	1회 3정, 1일 3회

5) 이 약을 복용하고 있는 모든 환자에서의 용량 조절
목표한 혈청 인 수치로 조절될 때까지 필요한 경우 2주간의 간격을 두
고 1일 3회 식사와 함께 이 약의 용량을 0.8g씩 증량 또는 감량한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 사용하지 말 것.

- 1) 이 약의 주성분 및 부형제에 과민한 환자
- 2) 저인산혈증 환자
- 3) 장폐색 환자가 이 약은 장관내에서 팽윤하여 장관전공을 일으킬 우려가 있다.)

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변태·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.
- 이 청문서 작성(개정일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skchemicals.com)나 제품상단 전용전화로 통하여 확인할 수 있습니다.
- 본 의약품을 사용하기 전에 청문서를 주의 깊게 읽고, 청문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '온라인의약품도서관(http://drug.mds.go.kr)'을 참조하십시오.



자세한 문의는 제품상담 전용전화를 이용하시기 바랍니다.

제품상담 전용전화(무료)080-021-3131

제조사

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A

19, Polpiska Str., 83-200 Starogard Gdanski, Poland

2015. 3. 31 작성
※2016. 11. 25 개정
(Ver. 003)

심해진 환자는 증증의 합병증을 피하기 위해 적절한 의료처치가 필요하
다.

3) 국내 시판 후 조사 결과

국내에서 세벨라머탄산염의 시판 후 조사기간 동안 1233명을 대상으로
실시한 안전성 평가 결과 이상반응의 발현율은 인과관계와 상관없이 20
명에서 242인(1.62%)으로 보고되었으며 다음과 같다.

가. 대사 및 영양이상 : 고칼슘혈증 0.08%(1명/1,233명), 고칼륨혈증
0.08% (1명/1,233명), 산중 0.08%(1명/1,233명)

나. 중추 및 말초신경계 이상 : 현기증 0.16%(2명/1,233명), 두통
0.08%(1명/1,233명)

다. 심혈관계 이상 : 고혈압 0.08%(1명/1,233명), 저혈압 0.08%(1명/1,233명)

라. 위장관계 이상 : 소화불량증 0.41%(5명/1,233명), 구역 0.24%(3명/1,233명),
구토 0.24%(3명/1,233명), 변비 0.16%(2명/1,233명), 복통 0.16%(2
명/1,233명)

마. 피부 및 부속기관 이상 : 피부질환 0.08%(1명/1,233명)

이 중 약물과의 인과관계를 배제할 수 없는 이상반응은 14명에서 18건
(1.14%)으로 나타났다. 현재 허가사항에 기재되어 있지 않은 예상하지 못
한 새로운 이상반응으로 현기증 2건(0.16%), 고칼슘혈증, 산중, 고칼륨혈
증 및 피부질환이 각 1건(0.08%)이 보고되었으며 이중 약물과의 인과관
계를 배제할 수 없는 것은 산중과 현기증으로 나타났다. 보고된 이상반
응 중 중대한 이상반응은 없었다.

4. 일반적 주의

1) 투석을 받고 있지 않는 만성 신장질환 성인 환자에 대한 이 약의 안
전성과 유효성은 확립되지 않았다.

2) 장관전공, 장폐색이 나타날 수 있으므로 심한 변비, 지속적인 복통, 구
토 등 이상이 확인된 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하여야
한다.

3) 세벨라머 정제 복용과 관련하여 연하곤란 및 식도 정제 정체가 보고되
었으며, 몇몇은 입원 및 치료를 필요로 하였다. 연하곤란의 병력이 있는
환자에서는 이 약의 사용에 고려해야 한다. 일반적으로 연하곤란,
연하장애, 증증의 소화기관 운동 장애(조절되지 않거나 증증의 위마비,
위내용물 정체, 증증 변비를 포함한 장운동이상 또는 불규칙한 장운동
등), 증증성 정질한 또는 주요한 소화기관 수술을 받은 환자에 대한 이
약의 안전성, 유효성은 확립되어 있지 않다. 따라서, 이러한 소화기관
질환이 있는 환자에 대해 이 약을 사용할 경우는 주의하여야 한다.

4) 이 약은 칼슘이나 알칼리 성분을 함유하고 있지 않다. 혈청 칼슘, 중
탄산 및 염소치를 관찰해야 한다. 저칼슘혈증의 경우 칼슘 보충제를 복
용해야 한다.

5) 만성 신장질환 환자는 섭취하는 음식과 질환의 증증도에 따라 지용성
비타민 A, D, E, K의 혈중 수치를 감소시킬 수 있다. 이 약이 음식 중에
함유된 지용성 비타민류와 결합할 가능성이 없는 것은 아니다. 또한 이
약 장기 투여 중 염산 결핍에 대한 가능성을 배제할 수 없다. 세벨라머
를 투여하기 전 별도로 비타민제를 복용하고 있지 않은 환자의 혈청 비
타민 A, D, E, K의 상태를 정기적으로 평가하여야 한다. 필요시 비타민
보충제를 투여할 것을 권장한다. 복막투석을 받고 있는 환자는 임상시
험에서 이 환자들에 대한 비타민 A, D, E, K의 수치를 측정하지 못했으
므로 지용성 비타민과 염산에 대한 추가적인 모니터링이 권장된다.

6) 만성 신장질환 환자는 저칼슘혈증이나 고칼슘혈증이 나타날 수 있다.
이 약은 칼슘을 함유하고 있지 않다. 그러므로 혈청 칼슘 농도를 정기
적으로 모니터링 해야 하며 필요시 칼슘 보충제를 투여한다.

7) 만성 신장질환 환자들은 대사성산증으로 진행되기 쉽다. 세벨라머탄
산염의 임상 연구에서 다른 인산염 결핍제를 세벨라머탄산염으로 전환 시,
칼슘결핍제보다 낮은 중탄산 수치를 약화가 보고되었다. 따라서
혈청 중탄산염 수치를 주의 깊게 관찰해야 한다.

8) 투석을 받는 환자는 투석의 황태에 따라 감염의 위험을 갖고 있다. 복
막염은 복막투석을 받는 환자에게 잘 알려진 합병증이며 세벨라머탄
산염의 임상시험 중 대조군보다 세벨라머 투여군에서 더 많은 수의 복막
염이 보고되었다. 복막투석을 받는 환자는 복막염과 관련된 증상과 징
후를 즉시 파악하고 처리하며 적절한 무균요법의 올바른 사용을 확인할
수 있도록 주의깊게 모니터링 해야 한다.

9) 세벨라머탄산염과 레보티록신은 동시 투여된 환자에서 갑상선기능저
하증이 매우 드물게 보고되었다. 따라서 이 약과 레보티록신을 함께 복
용하고 있는 환자들에 대해 갑상선 자극호르몬을 주의깊게 관찰해야 한
다.

10) 1년 동안의 임상시험에서, 세벨라머의 축적에 대한 증거는 없었다. 그
러나 장기기간(1년 이상)의 치료에 있어 세벨라머의 축적 또는 흡수의 가
능성에 대해서는 완전히 배제할 수 없다.

11) 이 약 단독으로는 부갑상선기능항진증의 조절에 사용되지 않는다. 2차
성 부갑상선기능항진증 환자에서 부갑상선호르몬 수치(PTHrP)를 낮추기
위한 칼슘보충제, 1,25-디하이드록시 비타민 D₃ 또는 그 유사체 등의 복합
적인 치료법 범주 내에서 사용되어야 한다.

12) 운전과 기계사용에 미치는 영향에 대한 연구는 수행되지 않았다.

5. 상호작용

이 약의 사람 대상 약물-약물 상호작용 연구는 외파린과 디곡신에 대해서
만 수행되었다. 이 약과 동일한 활성물질을 지닌 세벨라머탄산염의 사람
대상 약물-약물 상호작용 연구는 시프로플록사신, 디곡신, 외파린, 에날라
프롤, 메토프롤롤 및 철분에 대하여 수행되었다.

1) 투석환자에 대한 상호작용 연구는 수행된 바 없다.

2) 이 약은 흡수되지 않으므로 다른 약물의 생체이용률에 영향을 미칠 수
있다. 이 약과 병용투여시 혈중 농도가 변하는 경우용 약물의 경우, 안
전성 또는 유효성 측면에서 임상적으로 유의한 영향이 나타날 수 있으
므로 이 약을 투여하기 최소 3시간 전 또는 3시간 후에 투여하여야 하
가다. 의사는 병용투여약물의 혈중농도를 모니터링하도록 한다.

3) 건강한 지원자를 대상으로 한 상호작용 연구에서 이 약과 동일한 활
성물질을 지닌 세벨라머탄산염은 시프로플록사신 단회투여시의 생체이

용률을 약 50% 감소시켰다. 따라서 이 약을 시프로플록사신과 동시에
투여해서는 안 된다.

4) 이 약과 동일한 활성물질을 지닌 세벨라머탄산염은 디곡신, 외파린, 에
날라프롤, 메토프롤롤 및 철분의 생체이용률에 영향을 주지 않았다.

5) 건강한 지원자 18명을 대상으로 이 약 9.6g을 식사와 함께 1일 1회 투여
하였을 때 디곡신 단회용량의 약동학을 변화시키지 않았다.

6) 건강한 지원자 14명을 대상으로 이 약 9.6g을 식사와 함께 1일 1회 투여
하였을 때 외파린 단회용량의 약동학을 변화시키지 않았다.

7) 항부정맥제와 항정간제를 투여받고 있는 환자는 임상시험에서 제외
되었으며, 이러한 치료를 받고 있는 환자는 이 약을 처방할 때 주의가
필요하다.

8) 이식환자에서 세벨라머탄산염과 병용투여했을 때 이식 거부와 같은 임
상결과 없이 사이클로스포린, 미코페놀레이트모페틸, 타크로리무스의
혈중농도가 감소하였다. 약물상호작용을 배제할 수 없으므로 사이클로
스포린, 미코페놀레이트모페틸, 타크로리무스의 병용투여 및 투여중
지 후 그 혈중농도를 관찰해야 한다.

9) 이 약과 동일한 활성성분을 가진 세벨라머탄산염과 레보티록신을 병
용투여한 환자에서 매우 드물게 갑상선기능저하증이 보고되었다. 이 두
약물을 병용투여하고 있는 환자들에 대해 갑상선자극호르몬(TSH)을 주
의깊게 관찰해야 한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임부

① 이 약과 유사한 동일한 활성성분을 가진 세벨라머탄산염은 임신한
랫트에 있어서 지용성 비타민 D의 흡수 감소로 인해 기관형성기의
태아의 골형성을 감소시켰으며, 기관형성기의 임신한 토끼에 있어서
사람의 최고용량의 두 배의 용량에서 초기 흡수의 발생을 증가시켰
다.

② 임신한 여성을 대상으로 한 적절한 연구가 없으므로 임부 또는 임신
하고 있는 여성이 있는 부인에게는 치료상의 유의성의 태아에 대
한 위험성을 상충한다고 판단되는 경우에만 투여해야 한다.

③ 임신에 있어서 비타민 및 다른 영양소의 요구가 증가한다.

④ 임부에 있어서 비타민 및 다른 영양소에 대한 이 약의 효과는 연
구되지 않았다.

2) 수유부

세벨라머가 사람의 유즙으로 분비되는지 알려진 바 없다. 세벨라머의
비흡수성은 세벨라머가 유즙으로 배설될 가능성이 거의 없을 것으로 사
료된다. 수유의 지속/중단과 이 약 치료에 대한 지속/중단에 대한 판단
은 수유가 필요한 유아와 이 약 치료를 받는 여성에 대한 이익을 고려
한 후 결정되어야 한다.

7. 소아에 대한 투여

18세 미만의 소아에 대한 이 약의 안전성과 유효성은 확립되지 않았다.

8. 고령자에 대한 투여

고령자에게 투여할 때 특별한 고려를 해야 한다는 증거는 없으나 고령자
를 대상으로 충분한 수의 임상시험이 수행되지 않았으므로 고령자를 대
상으로 용량을 결정할 때는 일반적으로 낮은 용량범위에서 시작하며 주의해
야 한다.

9. 과량 투여시 처치

이 약의 과량 투여에 대한 보고는 없다. 이 약과 동일한 활성성분을 지닌 세벨라머
탄산염을 건강 지원자에게 9021mg 14g의 용량을 투여하였으나 이상반응은 없었다.
투석을 받고 있는 만성신장질환 환자에게 연 이 약의 최대 1일 용량은 14.4g이었다.

10. 적응상의 주의

1) 의사는 환자에게 이 약을 식사와 함께 복용하도록 알려주고 이 약을 식이 처
비에 첨가시켜야 한다.

2) 중단되는 치료의은 이 약과 같이 복용하지 않도록 지시해야 한다. 이 약과 다른 경
구약제를 같이 복용시 복용한 약물의 생체이용률이 감소된 경우 안전성 혹은 유
효성에 대한 임상적으로 유의한 영향이 있을 수 있다. 일반적으로 적용할 수 있는
모든 약물에 대한 용량지침 정보는 없으나, 이 약의 복용 최소 시간 전 또는 3시
간 후에 다른 약물을 복용해야 한다. 기능하디면, 이 약과 다른 경구약제 간에 유
의적인 상호작용이 있는지 확인하기 위하여 복용하는 약물의 혈중 농도를 모니
터링 하여야 한다.

3) 이 약은 그대로 삼켜야 하며, 분쇄하거나, 씹거나 또는 조각으로 부수지 않도록
하여야 한다.

4) 습기를 피해 원래의 용기에 보관한다.

11. 기타

1) 이 약과 동일한 활성성분을 가진 세벨라머탄산염은 동물실험에서 사람의 최고
경구 투여량(9g)의 2배의 용량에서 랫트의 방광 이행 세포 유두종의 발생이 보고
되었으며, 사람의 최대 경구 투여량의 3배의 용량에서 마우스의 종양 발생률의 증
가가 나타나지 않았다.

2) 대사를 활성화시킨 *in vitro* 포유류 세포유전학적 시험에서 세벨라머탄산염
은 염색체 구조 이상의 수의 통계학적으로 유의적인 증가를 보였다.

3) 세벨라머탄산염은 비타리마 복합물(만약시험에서 변이원소를 나타내지 않았다.

4) 세벨라머탄산염은 암컷 또는 수컷 랫트의 생식장해를 일으키지 않았다.

5) 랫트에 있어서, 1.5 및 4.5 g/kg/day(mg/kg/일)인 사람 추천 용량의 약 15
및 45 배의 용량에서 세벨라머탄산염은 지용성 비타민 D의 흡수 감소 때
문으로 추정되는 태아 골격의 감소된 또는 불규칙한 골화를 일으킨다. 토
끼에 있어서 세벨라머탄산염은 1g/kg/day(mg/kg/일)인 사람 추천 용량의
약 10배의 용량에서 초기 흡수 발생을 증가시키기 때문에 산전의 치사율
을 약간 증가시킨다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용방법】 직접용기에 별도포기

【포장단위】 30, 180정