

의약품용 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

오스카린 정

(칼리디노게나제)

KGMP
적격업체

전문 의약품

Auskalin Tab.

분류번호 : 219

■원료약품 및 그 분량 1정 중

• 유효성분 :

- 칼리디노게나제(동물유래: 돼지-췌장)(JP) 50 IU
- 첨가제(동물유래) : 우수유당(소-우유)
- 첨가제(타르색소) : 황색5호알루미늄레이크, 황색203호 알루미늄레이크
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 포비돈K30, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산, 스테아르산마그네슘, 오파드라이현색(OY-S-7223), 아크릴아즈오렌지(930630015), 폴리메틸렌글리콜6000

■성상 주황색 원형의 장용성 필름코팅정제

■효능·효과

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애: 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

■용법·용량

1일 30~150 IU를 3회 분할하여 경구투여 한다(먹는다,복용한다).
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

- 1) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
- 3) 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 4) 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.

4. 고령자(노인)에 대한 투여

일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의한다.

■저장방법 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■사용기간 제조일로부터 24개월

■포장단위 30정/병, 500정/병

■제조사 영풍제약(주) / 인천광역시 남동구 함박로 333

■제조의뢰자 (주)오스코리아제약 / 강원도 원주시 문막읍 문막공단길 252

※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품 이상사례 보고 및 부작용 피해구제 신청, 1644-6223)에 알려주시기 바랍니다.

본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 작성연월일 : 2017. 04. 18 개정연월일 : 2020. 09. 04(이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사의 홈페이지(www.ausk.co.kr)나 개발부(전화 : 02-477-7301, E-mail : admin@ausk.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.)

ASKT-2-200904