

규격	180x340
중이	
접지	
삼진기획	

에이셋서방정

HT-210531

A-Cet SR Tab.

【원료약품의 분량】 1정 중	
유효 성분 : 아세트아미노펜(KP)	660mg
트라마돌염염염(BP)	75mg
기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 오프드라이 II 노란색(85F420033), 저치하도 히드록시프로필셀룰로오스, 클로이드징아산하이드루스, 크로스보비돈, 포비돈, 히드로멜로오스	

【성 상】 연한 노란색의 장방형 서방정 필름코팅정

【효능·효과】 중등도 중증의 급, 만성 통증

【용법·용량】

용량은 환자의 통증 정도 및 치료 반응에 따라 조절한다. 초하용량으로 1정 두어를 권장하며, 그 이후 투여 간격은 최소 12시간 이상으로 하되, 1일 4정을 초과하지 않도록 한다.

이 약을 필요 이상 장기간 투여하지 않도록 하며, 질병의 특성 및 심한 정도로 인해 장기간 투여가 필요한 경우, 정기적인 모니터링을 실시하여 이 약의 지속되어 여부를 확인하도록 한다.

이 약의 투여 시 구역, 구토, 가려움증, 변비, 어지러움, 졸음 등이 나타날 수 있으므로 환자의 반응을 면밀히 관찰하고 적절히 조절한다.

노인

통상적인 성인 용량을 투여하도록 한다. 단, 75세 이상의 노인에게 트라마돌을 경구 투여시 트라마돌의 소실반감기가 17% 증가하였으므로 최소 12시간 이상 간격으로 이 약을 투여하도록 한다.

신장애환자

신장애환자에 대한 이 약의 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않으므로, 투여를 권장하지 않는다.

간장애환자

간장애환자에 대한 이 약의 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않으므로, 투여를 권장하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

- 경고
 - 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의하여야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
 - 아세트아미노펜을 복용한 환자에게 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포성 발진성 전신성 발진성 고열증후군(AGEP), 스티븐스존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사성(TEN)와 같은 중대한 피부반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다.
 - 트라마돌을 권장용량 범위 내에서 투여받은 환자에서 발작이 보고된 바 있으며, 권장용량 이상 투여 시 발작의 위험은 증가되는 것으로 나타났다.
 - 선택적 세로토닌 재흡수 억제제 (SSRI 항우울제 또는 식욕진제)
 - 삼환계 항우울제 (TCAs) 및 다른 삼환계 약물 (예, 시클로보잔프린, 프로메타진 등)
 - 다른 마약류
 - 트라마돌은 다음의 약물과 병용시 발작의 위험을 증가시킬 수 있다.:
 - MAO (Monoamine Oxidase) 억제제
 - 신경안염제
 - 발작 역치를 낮출 수 있는 약물
 - 간질, 발작 병력자 또는 발작에 대한 위험인자 (머리 상해, 대사장애, 알코올 또는 약물 금단 현상, 중추신경계 감염)가 있는 환자에서 경련 발생의 위험이 증가 될 수 있다.
 - 트라마돌 투약 환자에서 드물게 치명적인 아나필락시양 반응이 보고된 바 있다.
 - 금식 및 중증 기관지 천식 환자를 아편제제로 치료하면 생명을 위협하는 호흡저하의 위험이 증가된다. 이 약을 해당 환자군에 투여할 때 모니터링이 가능하거나 심폐소생 장치 구비된 곳에서 투여되어야만 한다.
 - 이 약을 호흡 억제 위험이 있는 환자에게 투여시 주의하도록 하며, 다른 비아편계 진통제 사용을 고려하도록 한다.
 - 트라마돌과 알코올 또는 벤조다이제핀계 약물을 포함한 중추신경억제제와의 병용투여는 깊은 진정, 호흡억제, 혼수 및 사망을 초래할 수 있다. 이러한 위험성 때문에, 이 약과 중추신경억제제의 병용 투여는 적절한 대체 치료법 없이 있는 환자의 경우에 한하여 처방하도록 한다. 이 약과 중추신경 억제제의 병용투여가 결정되면 최자하용량으로 최단기간 처방하도록 하고 호흡억제 및 진정의 징후와 중상에 대해 환자를 면밀히 추적 관찰하도록 한다.
 - 두개골내압이 증가된 환자나 머리상해 환자에서 이 약의 투여는 아편제제의 호흡 억제 효과로 아스피린과 저분량 2차적인 뇌척수액의 압력 증가로 인한 이러한 중상이 심각하게 나타날 수 있다.
 - 트라마돌은 오피오이드(opioid)의 정신적, 육체적 의존성을 유발할 수 있다.
 - 간독성 : 이 약에는 아세트아미노펜 및 트라마돌이 함유되어 있다. 아세트아미노펜은 때로 간독성 및 사망을 초래하는 급성 간부전과 관련이 있으며, 대부분의 간독성은 다른 아세트아미노펜 제제와 함께 복용하여 일일 4,000 밀리그램을 초과하였을 때와 관련이 있으므로 사용시 주의한다. 특히 간장애 환자는 반드시 의사와 상의한 후 복용하여야 한다.
 - CYP2D6 초고속 대사자인 환자는 다른 환자들에 비해 트라마돌을 M 활성대사체 (M1)로 보다 빠르게 전환하게 대사시킬 수 있다. 이 때에 다른 대사는 예상보다 더 높은 혈청 M1 농도를 초래할 수 있고 이는 호흡 억제 위험을 증가시킬 수 있다. CYP2D6 초고속 대사가자로 알려진 환자에 대해서는 대체 약제, 용량 감소 및/또는 트라마돌 과량 복용 징후 (예: 호흡 억제)에 대한 모니터링의 빈도 증가 등을 권고한다.
 - 트라마돌의 초고속 대사 및 소아에서 생명에 치명적인 호흡 억제에 대한 또 다른 위험인자 : 생명에 치명적인 호흡 억제 및 사망이 트라마돌을 투여한 소아에서 발생하였다. 일부 보고된 사례들은 소아시 편도절제술 및/또는 아데노이드절제술을 받은 후에 발생하였으며, CYP2D6 다형성으로 인한 트라마돌의 초고속 대사자인 것으로 입증되었다. 이 약은 12세 미만 소아 및 편도절제술 및/또는 아데노이드절제술을 받은 18세 미만 소아에게 투여하지 않는다. 이 약은 트라마돌의 호흡 억제 효과에 대한 민감성을 증가시키는 또 다른 위험인자를 갖고 있는 12세 ~ 18세 소아에게 투여를 피한다.
 - 이 약의 사용 시 매우 드물게 저너트륨혈증이 보고되었으며, 대체로 고령자 및/또는 저너트륨혈증을 초래할 수 있는 약물을 병용하고 있는 경우 중 위험요인이 있는 환자에서 보고되었다. 몇몇의 환자들에서 이 저너트륨혈증은 항이노호르몬비비이상증후군 (SIADH) 의 결과인 것으로 나타났다. 이 약의 중단과 적절한 치료 (예: 수분 제한)로 회복되었다. 취약 위험 요인이 있는 환자에 대해서는 이 약의 치료 동안 저너트륨혈증의 징후 및 중상에 대한 모니터링을 권고한다.

- 다음 환자에게는 투여하지 말 것
 - 이 약의 성분에 과민성이 있는 환자
 - 알코올, 수면제, 중추작용진통제, 아편제 또는 항정신성 약물 등 중추신경계 작용약물중독 환자
 - 심한 호흡억제상태 환자(가벼운 호흡억제가 나타날 수 있다.)
 - 두부손상, 뇌의 병변이 있는 경우로 의식혼탁의 위험이 있는 환자
 - MAO억제제를 투여받고 있는 환자 또는 최근 14일 이내에 투약한 경험이 있는 환자
 - 소화기계장애, 심한 알레르기 환자
 - 심한 간장애, 심한 신장애, 심한 심기능부전 환자
 - 수유부
 - 12세 미만의 소아
 - 편도절제술 및/또는 아데노이드절제술을 받은 18세 미만 소아에서 수술 후 권리
 - 아스피린 천식(비스테로이드성 소염진통제에 의한 천식발작 유발)또는 병력이 있는 환자
 - 모니터링 장비 또는 심폐소생 장비가 구비되지 않은 곳에서 급성 및 중증 기관지 천식환자
 - 악플로 조절되지 않는 간질 환자
- 다음 환자에게는 신중히 투여할 것
 - 모르핀 병용 또는 반복투여 환자(동물실험에서 가벼운 모르핀 길항작용이 인정되었으며 금단증상을 일으킬 수 있다.)
 - 아편제제, 마취제, 최면제, 폐노제차진, 신경안정제, 진정제 등과 같은 중추신경계 억제제 복용 환자
 - 당뇨당뇨한 환자(동물실험에서 대량투여하는 경우 오피움단극을 수축했다.)
 - 간장애 환자(동물 실험에서 혈청SGOT, GPT 활성치의 상승을 보이는 수가 있다.)
 - 신장장애 환자
 - 소금류 환자
 - 아편에 과민증 환자
 - 간질 환자 또는 발작 발생 가능성이 있는 환자
 - 속성대, 현인모를 이유로 인한 의식 변화상태 환자
- 이상반응
 - 이상반응
 - 과민증 : 속 등의 과민증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
 - 전신장애 : 무력증, 피로, 흥조, 때때로 흥동, 경직, 실신, 금단증상이 나타난다.
 - 순환기계 : 때때로 고혈압, 고혈압약화, 저혈압, 부종등, 심계항진, 빈맥이 나타난다.
 - 중추신경계 및 말초신경계 : 현기, 두통, 진전, 때때로 운동실조, 경련, 간장항진, 편두통, 편두통 약화, 불수면등의 수축, 지각이상, 혼미, 한기증이 나타난다.
 - 소화기계 : 복통, 변비, 설사, 소화불량, 방귀, 구내건조, 구역, 구토, 때때로 연하곤란, 혈변(melena), 허파유가 나타난다.
 - 정신과적 장애 : 식욕감퇴, 불안, 착란, 도취, 불면증, 신경과민, 졸음, 때때로 건망증, 이인증, 우울증, 악몽등 및 의존, 강박 분열증, 환각, 발기부전, 약용, 비정상적인 사고가 나타난다.
 - 혈액계 : 때때로 빈혈이 나타난다.
 - 호흡기계 : 때때로 호흡곤란이 나타난다.
 - 과민증 : 속 등의 과민증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
 - 전신장애 : 무력증, 피로, 흥조, 때때로 흥동, 경직, 실신, 금단증상이 나타난다.
 - 순환기계 : 때때로 고혈압, 고혈압약화, 저혈압, 부종등, 심계항진, 빈맥이 나타난다.
 - 중추신경계 및 말초신경계 : 현기, 두통, 진전, 때때로 운동실조, 경련, 간장항진, 편두통, 편두통 약화, 불수면등의 수축, 지각이상, 혼미, 한기증이 나타난다.
 - 소화기계 : 복통, 변비, 설사, 소화불량, 방귀, 구내건조, 구역, 구토, 때때로 연하곤란, 혈변(melena), 허파유가 나타난다.
 - 정신과적 장애 : 식욕감퇴, 불안, 착란, 도취, 불면증, 신경과민, 졸음, 때때로 건망증, 이인증, 우울증, 악몽등 및 의존, 강박 분열증, 환각, 발기부전, 약용, 비정상적인 사고가 나타난다.
 - 혈액계 : 때때로 빈혈이 나타난다.
 - 호흡기계 : 때때로 호흡곤란이 나타난다.

기타 진통제

에이셋서방정

전문약품

에이셋서방정

- 비노기계 : 때때로 땀배증, 배노장애, 핏노, 노저유가 나타난다.
 - 피부 : 소양증, 발진, 발한, 두드러기 증가
 - 기타 : 간기능 이상, 체중감소, 이명, 비정상적인 사야, 오한이 나타난다.
 - 트라마돌/아세트아미노펜의 임상시험에서는 보고된 바 없으나, 이 복합제 보다 더 많은 환자들에게 사용경험이 있는 트라마돌염염염 및 아세트아미노펜의 임상시험과 시판 후 조사에서 관련이 있는 것으로 보고된 기타 이상반응은 다음과 같다.
 - 트라마돌염염염
 - 혈관이상, 기압성 저혈압, 서맥, 허탈, 심근허혈, 폐부종, 호흡기증상 (호흡곤란, 기관지경련, 천명, 혈관신경성 부종), 알러지 반응(아나필락시스와 두드러기, 스티븐슨 존슨 증후군), 식욕변화, 운동장애, 호흡기 억제, 인지 기능 이상, 집중곤란, 우울증, 자살경향, 간염, 간 기능 부전과 위장간 출혈, 또한 간경, 활동, 인지 및 감각는 변화를 포함한 다양한 정신 부작용이 개인에 따라 다르게 나타날 수 있다. 실험실검사에서 크레아티닌과 간기능 검사를 포함한 실험실적 검사의 수치가 증가되었다는 보고가 있으며, 드물게 프로트롬빈 시간 상승을 포함하여 파파린 작용 변화가 밝혀졌다. 트라마돌을 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRIs)와 MAOs와 같은 세로토닌 제제와 병용시 세로토닌 증후군(정신상태 변화, 반사항진, 발열, 말열성 진전, 흥분, 발한, 발작, 혼수, 빈맥, 착란, 운동실조, 강경련, 설사 등)이 보고되었다. 인과관계는 확립되지 않았지만 천식의 약화가 보고된 바 있으며, 마약중단 증 나타나는 것과 유사하게 금단증상이 나타날 수 있다. 트라마돌을 포함한 제제의 시판후 경험에서 드물게 생장, 축적, 혼동, 언어장애가 보고되었고 매우 드물게 운동장애가 보고되었다. 트라마돌을 복용한 환자에게 매우 드물게 저혈당증이 보고되었다. 대부분은 당노병 또는 신부전을 포함하는 전구 위험요인이 있는 환자이거나 노인환자에서 보고되었다. 당노병 환자에게 트라마돌을 처방할 때는 주의를 기울이고, 투여를 시작하거나 증량할 경우는 혈당치를 더 자주 모니터링하는 것이 바람직할 수 있다. 트라마돌을 복용한 환자에서 매우 드물게 저너트륨혈증 및/또는 항이노호르몬비비이상증후군 (SIADH) 이 보고되었으며, 대체로 고령이거나 저너트륨혈증을 초래할 수 있는 약물을 병용하고 있는 등의 취약 위험요인이 있는 환자에서 보고되었다.
 - 아세트아미노펜
 - 알러르기 반응 (주로 피부 발진) 또는 아세트아미노펜에 대한 2차성 과민반응이 드물게 보고 되었으나, 일반적으로 약물 투여 중단 후 회복되었고, 필요한 경우 증상 치료가 실시되었다. 혈소판 감소증과 무라귀루증을 포함한 혈액장애가 보고된 바 있으나 반드시 아세트아미노펜과 관련된 것은 아니다. 아세트아미노펜을 포함한 유사물질과 같이 투여했을 때 저프로트롬빈혈증을 일으킬 수 있음을 나타내는 여러 보고가 있다. 다른 연구에서는 프로트롬빈 시간은 변하지 않았다.
- 트라마돌/아세트아미노펜 서방정의 이상반응
 - 만성 하부 요통 환자를 대상으로 실시한 무작위배정, 위약대조, 평행군 이중 노가림 임상시험(n=245) 에서 이상반응으로 인해 조기 투여를 중단한 환자는 위약군 6명(5.00%), 이 약 투여군 24명(9.20%)이었다. 이상반응은 총 169명의 환자에서 발생하였고, 이 약 투여군 125명중 104명(83.20%)과 위약 투여군 100명중 65명(64.17%)에서 발생하였다. 중대한 이상반응은 총 42건(관절염증, 심도저 비정상, 크레아티닌포스포키나제 증가, 우방염 각 1건)이 보고되었으나, 모두 시험약과 관련이 없는 것으로 판단되었다. 발생한 모든 이상반응 중 이 약과의 인과관계를 배제할 수 없는 이상반응 발현율은 73.6% (92명/125명, 236건)이었다.
 - 다른 트라마돌/아세트아미노펜 서방정의 활성대조(트라마돌/아세트아미노펜 일반정), 평행군 임상시험 (n=218)에서 이상반응은 총 104명에서 발생한었고, 이 중 이 약 투여군은 110명중 48명 (43.6%, 118건), 대조약 투여군은 108명 중 56명(51.85%, 107건)에서 발생하였다. 또한, 시험약과의 인과관계를 배제할 수 없는 이상약물반응 발현율을 분석한 결과, 이 약 투여군은 42.73%(47/110명, 112 건)이고, 대조군은 48.15%(52/108명, 96건)이었다.
 - 요통 환자를 대상으로 국내에서 실시한 임상시험 중 2% 이상의 빈도로 보고된 이상반응은 다음과 같다: 가려움증, 구역, 구토, 두드러기, 두통, 변비, 소화불량, 식은땀, 식욕감소, 어지러움, 졸음, 갈증, 구강건조증, 다한증, 발진, 배노장애, 복통, 불면증.
 - 임상시험 중 이 약 투여군에서 보고된 이상반응을 발현기관별로 나열하면 다음과 같다. (매우 흔하게 10% 이상, 흔하게 1% 이상 10% 미만, 때때로 0.1% 이상 1% 미만)
 - 감염 및 기생충 침입: 때때로 발발선증, 비염, 코인두염
 - 근골격 및 결합조직 장애: 흔하게 사지통증 때때로 관절증, 강경련, 근육약화, 근육통
 - 눈의 장애: 때때로 시야흐림, 결막염
 - 면역계 장애: 때때로 면역억감소
 - 신경계 장애: 매우 흔하게 어지러움, 졸음 흔하게 두통, 불면증 때때로 감각이상, 통풍상태, 미각이상, 불수면적 수축, 진전, 편두통
 - 신장 및 요로계 장애: 흔하게 배노장애, 혈뇨
 - 때때로 질노증, 무노증, 배노지체, 요실금, 핏노
 - 위장관 장애: 매우 흔하게 구역, 변비, 구토, 소화불량 흔하게 구강건조증, 복부통증, 복부불편감, 복부팽만, 상복부불편감 때때로 상복부통증, 소화성궤양, 설사, 트림
 - 일반 장애 및 투여부위 상태: 흔하게 갈증, 가슴불편감, 얼굴부종, 오한, 발열 때때로 말초부종, 무력증
 - 피부 및 피하조직 장애: 매우 흔하게 가려움증 흔하게 다한증, 두드러기, 발진, 식은땀
- 혈관 장애: 때때로 창백, 혈압변동
- 호흡계, 흉곽 및 증직장애: 흔하게 호흡곤란 때때로 기침, 콧물
- 기타: 흔하게 노저혈양양성 때때로 혈압상승, 두근거림, 혈청불규칙, 유방염, 상해

- 트라마돌/아세트아미노펜 일반정의 국내 시판 후 조사 결과
 - 국내에서 자습사를 위하여 6년 동안 37,967명의 환자를 대상으로 실시한 트라마돌/아세트아미노펜 일반정의 시판 후 조사결과 이상반응의 발현율들은 약물과의 인과관계와 상관없이 4.57%(1,397 건/37,967명, 2,501건)로 보고되었다. 이상반응은 구역, 변비, 구토 등의 소화기계 장애, 심신이상인 149건 (0.39%), 정신계 이상 149건(0.39%), 피부 및 부속기관이 105건(0.28%), 혈액계 31건(0.08%), 신장 및 비뇨기계 28건(0.07%), 순환기계 28건(0.07%), 호흡기계 21건(0.06%), 실험면계 1건 및 기타 43건 (0.11%)로 조사되었다.
 - 트라마돌/아세트아미노펜 일반정의 인과관계를 배제할 수 없는 약물이상반응 발현율은 4.14% (1,573건/37,967명, 2,244건)이었다. 주된 약물이상반응으로는 구역 1,498건(567명/37,967명), 한기증 0,969건(368명/37,967명)이며, 그 밖에 다음과 보고된 이상반응을 기관별로 분류하면 다음과 같다.
 - 전신이상: 무력증, 피로, 발열, 부종, 흥동, 경직, 실신,
 - 심혈관계: 울혈성 심부전
 - 신경계 : 한기증, 두통, 현훈, 혼미, 편두통, 진전, 지각이상, 간장항진, 편두통약화, 불수면의 수축, 경련
 - 호흡기계 : 호흡곤란, 천식, 운동성호흡곤란, 기침, 기관지염
 - 신장 및 비뇨기계 : 배노장애, 노저류, 빈뇨, 신장기능 수치이상, 핏노
 - 피부 및 부속기관 : 소양증, 발진, 발한증가, 두드러기
 - 소화기계 : 구역, 구토, 소화불량, 복통, 변비, 구강건조, 설사, 연하곤란, 방귀, 허부증, 타액증가, 직장임전행, 식도임전행, 위양전행, 마비성 장폐색증, 말초직질, 담낭염
 - 정신계 : 졸음, 불면증, 식욕감퇴, 불안, 우울증, 신경과민, 감정 불안정, 환각, 이인증
 - 혈액계: 빈혈, 헤모글로빈감소, 적혈구감소, 백혈구감소, 백혈구증가, 혈소판감소
 - 호환기계: 심계항진, 고혈압, 부정맥, 빈맥, 고혈압약화, 대동맥협착
 - 기타 : 하혈, 클레스테롤상승, 체중감소, 이명, 오한, 영양미통증, 대퇴통증, 알레르기성비염, 비출혈, 비정상사야, 당도당진행, 노의 미물감, 간염전행, 간기능 이상 중대한 약물이상반응은 간기능이상, 담낭염, 마비성장폐색증, 혼미등이 각 1례씩 보고되었으며, 예상치 못한 약물이상반응으로 담낭염, 말초직질, 마비성장폐색증, 신장기능수치이상(BUN/CR상승), 타액양증, 하혈이 각 1례씩 보고되었다.
- 특수한 환자인 신장애 환자를 대상으로 한 조사에서 나타난 약물이상반응 발현율은 6.26%(41명 /776명, 165건)이었으며, 주된 약물 이상반응은 구역 및 한기증이 각 42건(2.7%)씩이었다. 중대한 약물이상반응과 예상하지 못한 이상반응은 없었다. 특수한 환자인 신장애 환자를 대상으로 한 조사에서 나타난 약물이상반응 발현율은 6.63%(22명/332명, 36건)이었으며, 주된 약물이상반응은 구역 12건(3.6%), 한기증 6건(1.8%)이었다. 중대한 약물이상반응은 마비성 장폐색증, 담낭염, 간기능 이상 각 1건(0.30%)씩 있었고, 예상하지 못한 이상반응은 마비성 장폐색증과 담낭염 각 1건이었다.

- 국내 시판 후 조사기간 동안 자발적으로 보고된 중대한 이상반응은 구역 3건, 현훈, 호흡곤란 각 2건, 혼미, 편두통, 언어장애, 의식소실, 심근경색증의 재발, 저혈압, 구토, 소화불량, 착란, 다발성 장기부전, 아나필락시스, 의도적인 과량 복용이 각 1건씩 총 23건으로, 이는 불확실한 규모의 인구집단으로부터 보고되었으며, 그 빈도 및 이 약의 인과관계를 확실히 추정하기가 어렵다.
- 또한 국내 시판 후 조사기간 동안, 총 5,666명을 대상으로 사용성적 조사 이외 별도로 실시한 시판 후 임상시험 결과, 예상치 못한 약물이상반응은 트림 2건(0.04%), 가슴불편감 1건(0.02%)씩 총 3건이 보고 되었다.
- 트라마돌/아세트아미노펜 일반정을 투여하기 전 치료약제(진통제) 투여력이 있는 환자군은 투여력이 없는 경우에 비해 이상반응 발현율이 통계적으로 유의하게 높게 나타났다(5.92% vs 3.75%, p<0.001). 또한, 1일 분량 투여량이 4정 이상인 조사대상자에서 이상반응 발현율은 8.35%(289/3460)명으로 2정 이상 4정 미만 투여한 한 환자군 4.36%(1325/30419명)보다 이상반응 발현율이 통계적으로 유의하게 높게 나타났다(p<0.001).
- 트라마돌/아세트아미노펜 서방정의 국내 시판 후 조사 결과
 - 국내에서 자습사를 위하여 4년 동안 978명을 대상으로 실시한 중등도 중증의 만성 통증에 대한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 15.09%(147/978명, 총 172건)로 보고되었다. 이 중 중대한 이상사례의 발현율은 0.2%(2/978명, 2건)로 사지통증, 폐렴 각 0.1% (1/978명, 1건), 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 이상사례는 보고되지 않았다. 예상하지 못한 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 1.3%(13/978명, 총 14건)로 보고되었으며, 등통증 0.3%(3/978명, 3건), 근골격통증 0.2%(2/978명, 2건), 목통증, 양구리통증, 상기도감염, 폐렴, 기력감장애, 위장장애, 위과부족, 방광염각총미, 연골통증 각 0.1%(1/978명, 1건)으로 조사되었다. 이 중, 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 이상사례 발현율은 0.3%(3/978명, 총 3건)로 기력감장애, 호파부족, 연골통증 각 0.1%(1/978명, 1건)가 보고되었다.
 - 국내에서 자습사를 위하여 4년 동안 4,382명을 대상으로 실시한 중등도 중증의 급·만성 통증에 대한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 10.09%(442/4,382명, 총 587건)로 보고되었다. 이 중 중대한 이상사례의 발현율은 0.06%(2/4,382명, 3건)로 등통증, 두통, 일과성 허혈발작 각 0.02%(1/4,382명, 1건), 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 이상사례는 보고되지 않았다. 예상하지 못한 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 0.52%(53/4,382명, 총 23건)로 보고되었으며, 가슴쓰림 0.25%(11/4,382명, 11건), 상세불명의 위장장애 0.09%(4/4,382명, 4건), 금성위염, 감기, 상기도감염, 전신쇠약, 말미, 일과성 허혈발작, 등통증, 무기력 각 0.02%(1/4,382명, 1건)로 조사되었다. 이 중, 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 이상사례 발현율은 0.39%(17/4,382명, 총 17건)로 가슴쓰림 0.23%(10명/4,382명, 10건), 상세불명의 위장장애 0.09%(4/4,382명, 4건), 금성위염, 전신쇠약, 무기력 0.02%(1/4,382명, 1건)가 보고되었다.
 - 자습사 이상사례 분석결과 결과
 - 이 약에 대한 국내 자습사 이상사례 및 자발적 부작용 보고자료를 국내 시판 허가된 모든 의약품을 대상으로 보고된 이상사례 보고자료와 자습사 종료시점에서 통합평가한 결과, 다른 모든 의약품에서 보고된 이상사례에 비해 이 약에서 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 없었다.

5. 일반적 주의

- 권장용량을 초과하여 투여하지 않도록 하며, 다른 트라마돌 또는 아세트아미노펜 제제와 병용 투여하지 않도록 한다.
- 이 약은 트라마돌을 주성분으로 함유한다. 이 약의 진통 효과의 일부는 이 약의 주성분인 트라마돌을 M1아편계 수용체 결합으로 인해 작용한다. 아편제제를 병용 투여시 권장 용량에서보다, 내약성, 신체적 의존성 및 심리적 의존성이 나타날 수 있다. 이 약을 처방하기 전에, 환자의 아편제제에 대한 의존성 및 남용 위험을 평가하여 하며, 이러한 행동이 나타나는지 이 약을 투여 받는 모든 환자들을 모니터링 하여 한다. 물질 남용 (마약이나 알코올 남용 또는 중독 포함) 또는 정신 질환 (예 : 주요 우울증)의 병력이 있거나 가족력이 있는 환자에서는 위험이 증가한다. 이 약은 아편제제 의존성 환자에게 사용되어서는 안 된다. 이전에 다른 아편제제에 의존했던 일부 환자에서 트라마돌은 신체 의존성이 재발하는 것으로 나타났다. 약물남용 가능성이 있는 환자에서 위험이 있는 환자들은 신중히 관찰하며 더 긴간 투여하도록 한다. 트라마돌은 아편 의존성 환자들의 대체 약물로 적절하지 않으며, 아편작용 약물이나 모르핀의 금단증상을 억제하지 못한다. 이러한 징후들(발한, 발진, 두통, 부종, 설사, 땀, 편도조신)와 병용시 수용체작용의 경쟁적 차단효과로 인하여 진통효과 감소와 금단증상 발생 위험이 있으므로 병용사용은 권장되지 않는다.
- 이 약의 투여를 갑자기 중단할 경우 불안, 발한, 불면, 강직, 동통, 구역, 진전, 설사, 상기도 증후군, 입모, 불면, 신경과민, 운동과다증, 위장관 증상 등과 같은 금단증상이 나타날 수 있다. 공황발작, 심한 불안, 환각, 지각이상, 이명, 비정상적인 중추신경계 반응 또한 매우 드물게 보고되었다. 임상경험상 약작용을 감량하기며 중단할 경우 금단증상이 완화될 수 있다.
- 트라마돌 투여 환자에서 중대한 아나필락시양 반응을 포함하여 두드러기, 발진, 기관지 경련, 중독성 파피루시 및 스티븐슨 존슨 증후군 등의 알러지 반응이 보고된 바 있다. 코데인과 다른 아편제제에 아나필락시양 반응 병발이 있는 환자에서 이 위험이 증가될 수 있다.
- 발작 가능성이 있거나 발작 역치를 낮출 수 있는 기타 약물, 특히 선택적 세로토닌 재흡수 억제제, 삼환계 항우울제, 항정신병약, 중추작용 진통제 또는 국소마취제에 투여한 환자에게 트라마돌 투여시 경이민이 보고된 바 있다. 약물로 조절된 간질환자나 간질 가능성이 있는 환자는 꼭 필요한 상황에서만 이 약을 투여하여야 한다.
- 만성 알코올 중독자에게 과다한 아세트아미노펜 투여로 간독성이 증가될 수 있다. 간장애 환자에게 이 약의 투여를 권장하지 않는다.
- 2가지 또는 부진 환자들에 대한 이 약의 약동학 및 내약성에 대해 시험한 바 없다. 트라마돌과 아세트아미노펜은 주로 간에서 대사된다. 트라마돌염염염/아세트아미노펜 일반정은 중등도의 간장애 환자에게는 주로 간증을 연장하여 투여하는 것을 신중히 고려하고 중증의 간장애 환자에서는 투여를 중단하지 않는다.
- 신체적 세로토닌 재흡수 억제제를 복용하는 환자에게 이 약 투여 시 신중해야 한다. 트라마돌과 선택적 세로토닌 재흡수 억제제를 병용 시 발작 시 세로토닌증후군을 포함한 이상반응 위험이 증가한다.
- 생명에 치명적인 호흡 억제 및 사망이 트라마돌을 투여한 소아에서 발생하였다. 트라마돌 및 코데인은 활성 대사체의 노출을 증가시킬 수 있는 CYP2D6 다형성형을 기반으로 대사 기반성에 영향을 받는다. 트라마돌 또는 코데인에 대한 시판 후 보고에 따르면 12세 미만 소아는 트라마돌의 호흡 억제 효과에 영향을 받기 쉬운 것으로 보인다. 특히 편도절제술 및/또는 아데노이드절제술 후 통증에 대하여 오피오이드로 치료를 받은 폐쇄성 수면무호흡증이 있는 소아는 호흡 억제 효과에 민감할 수 있다. 생명에 치명적인 호흡 억제 및 사망에 대한 위험은 다음과 같다.
 - 이 약은 12세 미만 소아에게 투여하지 않는다.
 - 이 약은 편도절제술 및/또는 아데노이드절제술을 받은 18세 미만 소아에게 수술 후 관리 목적으로 투여하지 않는다.
- 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우를 제외하고는 트라마돌의 호흡 억제 효과에 대한 민감성을 증가시키는 또 다른 위험인자를 갖고 있는 12세 ~ 18세 청소년의 경우 이 약의 투여를 피한다. 위험인자는 수술 후 상태, 폐쇄성 수면무호흡증, 비만, 중대한 폐질환, 신경과질한 및 호흡 억제를 유발하는 다른 약물과의 병용투여와 같은 호흡저하와 관련 있는 조건들을 포함한다.
- 성인과 같이 소아에게 오피오이드를 처방할 때 의료전문가는 가장 짧은 기간 동안 가장 낮은 효과적인 용량을 투여해야 하며 오피오이드 과량 투여 증상 및 위험에 대하여 환자, 보호자 및 간병인에게 알려야 한다.
- 트라마돌은 잠재적으로 생명에 치명적인 수준의 M1이 노출된 CYP2D6 기질에 대한 초고속 대사자에서 코데인과 같이 다형성 대사에 따라 영향을 받는다. 코데인의 초고속 대사자인 수유부인 매우 내 모르핀이 높은 수준으로 노출된 수유 유아에서 최소 한 건의 사망이 보고되었다. 이 약을 투여한 초고속 대사자인 어머니로부터 수유 유아는 잠재적으로 높은 수준의 M1이 노출되어 생명에 치명적인 호흡 억제를 경험하였을 수 있다.

6. 약물상호작용

1) MAO억제제를 투여 받고 있는 환자 또는 최근 14일 이내에 투약한 경험이 있는 환자에서의 이 약의 병용 투여는 발작 및 세로토닌 증후군의 위험의 증가로 경계해야 한다. (2. 다음 환자에는 투여하지 말 것 참조). 동물시험에서 MAO 억제제와 트라마돌을 병용시 시험동물의 사망 수가 증가되었다.

- 트라마돌과 선택적 세로토닌 재흡수억제제를 병용 시 발작 및 세로토닌 증후군을 포함한 이상반응 위험이 증가한다. 선택적 세로토닌 재흡수 억제제를 복용하는 환자에게 이 약을 투여할 때는 이상반응의 징후를 모니터링 하며 주의 한다.
 - 카르바마제핀과 병용시 트라마돌의 혈장 농도 감소로 인하여 트라마돌 진통 효과 및 작용 시간이 유의하게 감소할 수 있다. 카르바마제핀이 트라마돌 대사를 증가시키고, 트라마돌의 발작 발생 위험을 증가시킬 수 있으므로 병용을 금한다.
 - 트라마돌은 CYP2D6에 의해 대체제 M1으로 대사된다. 퀴니딘은 CYP2D6의 선택적 억제제로써 트라마돌과 퀴니딘의 병용투여는 트라마돌의 농도를 증가시키고 M1의 농도를 감소시킨다. 이러한 현상의 임상적 중요성은 아직 모른다. 인해 간 마이크로솜 생체와 약물상호작용 시험에서 트라마돌은 퀴니딘 대사에 영향이 나타나지 않았으며, 플루옥세틴, 파록세틴, 이미트립틸린과 같은 CYP2D6 저해제와의 병용투여는 트라마돌의 대사를 일부 저해하였다.
 - 케토티나졸과 에리스로마이신과 같이 CYP3A4를 저해하는 것으로 알려진 기타 약물들은 트라마돌의 대사 (N 디메틸화)를 저해할 수 있다. 혈청 소 디메틸화 대사체의 대사 또한 저해할 수 있다. 이러한 상호작용의 임상적 의미에 대해서는 연구된 바 없다.
 - 아세트아미노펜의 흡수 속도는 메토프로프라마이드 또는 돔페리돈으로 증가될 수 있으며 클레스티라민으로 흡수가 감소될 수 있다.
 - 이 약과 벤조다이제핀계 약물, 다른 마약성 진통제, 전신마취제, 페노타이진계 약물, 신경안정제, 수면제, 삼환계 항우울제, 신경근육차단제, 또는 알코올을 포함한 다른 중추신경억제제를 병용투여하면 추가적인 중추신경억제작용이 유발되고, 호흡억제, 저혈압, 깊은 진정, 또는 혼수, 사망과 같은 중추신경억제작용이 증가될 수 있다. 따라서 이러한 약물과 병용투여하는 경우에는 2가지 약물 중 하나, 또는 둘 다 용량을 감량해야 한다.
 - 이 약과 중추신경억제제의 병용이 필요한 경우에는 최자하용량으로 최단기간동안 처방하여야 하고 호흡억제와 진정의 징후와 중상에 대하여 면밀하게 추적관찰하여야 한다.
 - 이 약과 외과민 유사약물을 병용할 경우에는 INR(International Normalized Ratio, 국제정상화 비율) 증가 보고이 있으므로, 외과적용에 적용할 경우 프로트롬빈 시간을 정기적으로 평가하도록 한다.
 - 소아 및 노인에 대한 투여
 - 트라마돌을 투여받은 소아에서 생명에 치명적인 호흡 억제 및 사망이 발생하였다. 일부 보고된 사례에서 편도절제술 및/또는 아데노이드절제술을 받은 후에 발생하였으며 이 중 한명은 트라마돌의 초고속 대사자인 것으로 입증되었다(마, 시트코플450 등중호소 206 (CYP2D6) 유전자의 다중 복제, 특히 소수 무호흡증이 있는 소아는 호흡 억제 효과에 민감할 수 있다. 생명에 치명적인 호흡 억제 및 사망에 대한 위험은 다음과 같다.
 - 이 약은 12세 미만 소아에게 투여하지 않는다.
 - 이 약은 편도절제술 및/또는 아데노이드절제술을 받은 18세 미만 소아에게 수술 후 관리 목적으로 투여하지 않는다.
 - 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우를 제외하고는 트라마돌의 호흡 억제 효과에 대한 민감성을 증가시키는 또 다른 위험인자를 갖고 있는 12세 ~ 18세 청소년의 경우 이 약의 투여를 피한다. 위험인자는 수술 후 상태, 폐쇄성 수면무호흡증, 비만, 중대한 폐질환, 신경과질한 및 호흡 억제를 유발하는 다른 약물과의 병용투여와 같은 호흡저하와 관련 있는 조건들을 포함한다.
 - 간, 신장, 심장 기능의 저하 및 동시에 수반되는 질환과 다양한 약물치료로 더 자주 일어날 수 있으므로 노인환자에서 이 약의 투여를 주의하여야 한다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 임부에 대한 적절한 시험시험은 실시된 바 없으며, 태아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않았다. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 투여한다.
 - 임신 중 이 약 또는 다른 아편계제를 정기적으로 사용한 경우, 신생아 금단 증후군이 발생할 수 있으며, 특히 임신 후기(28 40주에서 위험이 증가한다.
 - 이 약은 수유부에 투여하지 않는다. 트라마돌 100mg을 정맥으로 단일 투여한 이후 16시간 내에 모유로 축적된다는 트라마돌 100mg(수유부 복용량의 0.1%), M1 27mg이었다. 트라마돌 및 그 활성대사체(M1)는 모유에 존재한다. 이 약물이 수유 유아 또는 모유 생산에 미치는 영향에 대한 데이터는 없다. M1은 트라마돌 보다 더 강력하게 유 오피오이드 수용체에 결합한다. 발표된 연구에서 출산 후 24시간에 수유부의 트라마돌 투여와 초유에 있는 트라마돌 및 M1이 보고되었다. 트라마돌의 초고속 대사자인 여성은 예상보다 더 높은 혈청 M1 수치를 초래할 수 있으며 모유 속의 더 높은 이 M1 수치를 인해 수유 유아의 위험해질 수 있다. 정상적인 트라마돌을 대하는 여성에게 모유로 분비된 트라마돌의 양은 적고 복용량이 의존적이다. 이 약으로 치료하는 동안 수유 유아의 과다 진정 및 호흡 억제를 포함하는 중대한 이상반응 발생에 대하여 환자에게 알려야 한다. 모유를 통해 이 약이 수유 유아에게 노출된 경우 과다 진정 및 호흡 억제 발생에 대하여 관찰해야 한다. 수유부가 오피오이드 진통제 투여를 중단하거나 수유를 중단하는 경우 수유 유아에서 금단 증상이 발생할 수 있다.
- 운전, 기계조작에 대한 영향

트라마돌은 졸음이나 현기를 일으킬 수 있으며 이것은 알코올 또는 기타 중추신경계 억제제에 의해 증강될 수 있다. 만취상태에 영향을 주기