

휴니즈 아세트시스테인 캡슐 200mg

- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

아세트시스테인(USP) 200 mg
첨가제(타르색소) : 적색3호, 청색1호

【성상】

흰색의 내용물이 든 상부 하늘색, 하부 흰색의 경질캡슐제

【효능·효과】

1. 주요효능 효과
1) 다음 질환에서의 객담(가래)배출곤란 : 급만성기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지 천식, 세기관지염, 만성염증증
2) 인후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성중이(가운데귀염)

【용법·용량】

아세트시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여한다(먹는다, 복용한다).

1. 급성질환 (성인 : 1회 200mg 1일 3회 / 소아 : 6-14세 1회 200mg 1일 2회)
 2. 만성질환 (성인 : 1회 200mg 1일 2회 / 소아 : 6-14세 1회 100mg 1일 3회)
 3. 만성염증증 (소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회, 2-5세 1회 100mg 1일 4회)
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 이 약에 과민증 환자
2) 위십이지장궤양 환자
3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
산생아 (중증(심한 증상) 질환이 아닌 경우 산생아에게 투여하지 않는다.)
3. 부작용
1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염(입안염), 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있다.
2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명(귀울림), 기관지경련(특히 천식 환자) 등이 나타날 수 있다.
3) 드물게 빈맥(빠른맥/빈맥), 고혈압이 나타날 수 있다.
4) 국내 자발적 유해사례 보고자료(1999~2013 상반기)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 유해사례간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
• 호흡곤란
4. 상호작용
경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치아페니콜)과 병용(함께 복용(사용))투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다).
5. 임부에 대한 투여 : 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여한다.
6. 수유부에 대한 투여
이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약물이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.
7. 적용상의 주의 : 이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 한다.

【저장방법】

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

30, 500캡슐

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 작성일 이후 변경된 내용은 '온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)'을 참조하십시오.

작성연월일 : 2015. 07. 22

ACA1K1507

제조사 :

구주제약(주)

경기도 화성시 정남면 덕철제기길 5

제조외의사 :

(주)휴니즈

부산광역시 강서구 녹산산단 165로 22

소비자 상담실(반품 및 교환처) : 080-608-7000

huniz