

레사크라정100밀리그램 (레보플룩사신수화물)

전문의약품
분류번호:629

【약효 및 용법】 1. 용법

■ 성형성분 레보플룩사신수화물(100mg) 102.49mg
(레보플룩사신수화물 100mg)

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

■ 7가지 항생제(클로xacillin, ampicillin, amoxicillin, cefazolin, cefuroxime, ceftriaxone, cefepime)와 레보플룩사신수화물(100mg)을 함께 복용할 수 있다.

lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제로 인해 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것

1) 중증 신장에 환자

2) 중증 뇌동맥경화증 등의 중추신경계 질환이 있거나 의심되는 환자(경련의 위험이 있다.)

3) 경련성 질환의 병력이 있는 환자(경련의 위험이 있다.)

4) 췌부염, 클로스트리디움과 같은 폐쇄성 또는 프로피온산 비스테로이드성 약제 및 테오필린을 투여 중인 환자(경련의 위험이 있다.)

5) 고령자

6) 인슐린 또는 경구용 혈당강화제와 이 약을 동시에 투여받는 당뇨병 환자

7) 글루코코르티코이드-인산 탈수소효소(G-6-PD) 결핍 환자(드물게 용혈반응이 나타날 수 있다.)

8) 중증근무력증 환자 (중증이 더 심해질 수 있다.)

4. 이상반응

1) 속: 드물게 속이 나타나는 경우가 있으므로 충분히 관찰하고, 헐렁한, 하중, 구토, 복부팽만 등의 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

2) 과민반응: 처방적인 과민반응과 유사한 반응이 보고되었고 일부 반응은 심한 알레르기, 저혈압, 발진, 의식상실, 저혈당, 맥박부정, 기도 폐쇄, 호흡곤란, 두드러기, 가려움, 빠른 심장 박동, 연하곤란, 기타의 심각한 피부반응 등과 동반되어 나타날 수 있다. 또한 알레르기와 인과관계는 명확하지 않지만 레보플룩사신을 포함하는 퀴놀론계 항생제를 반복투여한 환자에게 드물게 과민성 혈관염 등의 증상을 수반하는 심한 고열 또는 처방적인 과민반응이 보고되었다. 이러한 증상이 나타나는 경우 투여를 중지한다. 또한 과도한 햇빛이나 인공적인 자외선은 피해야 또한 수, 흥분 등을 동반한 과민반응이 나타났던 투여를 중단한다.

3) 정신신경계: 때때로 불면, 어지러움, 두통, 드물게 떨림, 불안, 우울, 정신병적 반응, 초조, 혼돈, 경련, 매우 드물게 시각 및 청각장애, 마약 및 후각 장애, 환각 등이 나타날 수 있다. 말초신경 장애로서 드물게 감각이상, 감각운동 축색의 다발신경병증의 결과로 감각이상, 감각저하, 감각장애, 쇄골 등 통증이 나타날 수 있다. 또한, 적열, 저림, 무감각, 가벼운 축삭, 통각, 온도, 위치, 진동감각 등의 변화가 수반되는 신경 증상이 나타났다면 투여를 중지한다. 또 오목사신에서 드물게 저림이 나타나는 보고가 있다. (일반적주의 항 '참조)

4) 순환기계: 때때로 심계항진 같은 심장박동 장애가 나타날 수 있다. 심전도상에서 QT 간격 연장, 드물게는 부정맥과 관련있는 것으로 보고되었고 시판후 조사에서 Torsades de pointes가 드물게 보고되었으므로 저칼륨증, 유의한 서맥, 심근병증과 같은 Torsades de pointes에 대한 위험인자가 존재하는 환자는 투여를 금한다.

5) 신장: 때때로 BUN, 혈청크레아티닌의 상승, 매우 드물게 급성신부전증이 나타날 수 있다. 또한 약물의 인과관계는 명확하지는 않지만 레보플룩사신을 포함하는 퀴놀론계 항생제를 반복투여한 환자에게 드물게 사일러스 신장염 등의 증상을 수반하는 심한 고열 때때로 처방적인 과민반응이 보고되었다.

6) 간장: 흔히 간효소(AST/ALT) 상승, 때때로 급성 간괴사, 급성 간부전, 중증 간염, 간경화, 황달, ALP, γ -GTP, 총 빌리루빈의 상승 등이 나타날 수 있다.

7) 혈액계: 때때로 백혈구 감소, 적혈구 감소, 헤모글로빈 감소, 헤마토크릿치 감소, 호산구 증가, 범혈구감소증, 빈혈, 용혈성 빈혈(중증: 헤모글로빈), 혈소판감소증, 매우 드물게 무과립구증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

8) 소화기계: 때때로 구역, 구토, 복부팽만, 설사, 식욕부진, 복통, 복부팽만, 드물게 소화불량, 구내염, 혀, 목구멍, 변비 등이 나타날 수 있다. 또한 드물게 생명을 위협하는 처방적인 위장성대장염 등의 합병을 수반한 대장염이 나타나는 경우가 있으므로 복통, 빈번한 설사 등 대장염을 의심하는 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

9) 근육계: 근육통, 무력감, CPK 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 급격한 신기능 약화를 수반한 횡문근융해증이 일어날 수 있으므로 주의한다. 드물게 관절통, 관절염 등의 진찰할 때 매우 드물게 관절염이 일어날 수 있다. 근육 약화가 나타날 수 있는데, 특히 중증근무력증 환자는 증상이 더 심해질 수 있으므로 주의한다.

10) 피부: 피부점막안종후군(스티븐스-존슨후군), 중증 성홍피사증(에릭슨후군)가 나타날 수 있으므로

충분히 관찰하고 이상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

11) 호흡기계: 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부X선 이상, 호산구 증가 등을 동반하는 간질성폐렴, 알레르기성 폐렴이 나타날 수 있으므로 주의하고, 이런 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 부신피질 호르몬제 투여 등의 적절한 처치를 한다.

12) 경구용 혈당강화제 또는 인슐린을 복용중인 당뇨병 환자에서 혈당강화제와 혈당 또는 저혈당(가) 보고되었으므로, 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

13) 기타: 북아메리카에서 시행된 3상 임상시험에서 이 약과 관련성이 있는 유해반응은 피험자의 6.7%에서 발생되었다. 피험자중 4.1%는 유해사건으로 인하여 이 약의 투여를 중지하였다. 전반적인 발현율과 유해사건의 종류 및 분포는 750 mg을 1일 1회 투여한 경우, 250mg을 1일 1회 투여한 경우, 500 mg을 1일 1회 또는 1일 2회 투여한 경우에서 유사하게 나타났다. 본 임상시험에서 이 약을 투여받은 피험자 중 이 약과 관련성이 있는 것으로 판단된 약물 유해사건은 다음과 같다: 구역 1.5%, 설사 1.2%, 질염 0.5%, 불면증 0.4%, 복통 0.4%, 헛배부름 0.2%, 가려움 0.2%, 어지러움 0.3%, 발진 0.3%, 홍반성발진 0.3%, 생식기칸디다증 0.1%, 칸디다증 0.2%, 미각이상 0.2%, 구토 0.3%, 변비 0.1%, 진전경련 0.1%, 생식기 가려움증 0.1%, 두통 0.2%, 신경통 0.1%, 홍반성발진 0.1%, 두드러기 0.1%, 식욕감퇴 0.1%, 졸림 0.1%, 흥분 0.1%, 구갈 0.2%, 떨림 0.1%, 알레르기 반응 0.1%

5. 일반적 주의

1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.

2) 위험요인이 있는 환자에게는 경련 또는 다른 중추신경계 이상반응이 나타날 수 있음을 알려야 한다.

3) 이 약에 의한 과민반응은 매우 드물게 나타나는 반응이지만, 과민반응을 방지하기 위해 환자는 스스로 불필요하게 강한 햇빛이나 인공적인 자외선을 들뜬 태양광선 램프, 일광욕실 등에 노출시키지 않도록 해야 하며, 발진 등의 과민반응이 의심되는 증상이 발생될 시 투여를 중단해야 한다.

4) 운전 또는 기계작업에 미치는 영향

어지러움, 졸림, 시각장애와 같은 바람직하지 않은 효과들이 환자의 집중력 및 대처능력을 손상시킬 수 있으며, 이는 자동차 운전 중 또는 기계작업과 같은 일에 영향을 줄 수 있다.

5) 대부분의 심한 폐렴균성 폐렴의 경우는 이 약이 적절한 치료제가 되지 못할 수도 있다. 그리고 녹농균(P. aeruginosa)에 의한 병원체 감염은 다른 약물과의 병용 투여가 필요하다.

6) 이 약을 포함한 거의 대부분의 항균제에서 경증에서 생명을 위협하기도 하는 위장성대장염이 보고되었다. 그러므로 어떤 항균제든 투여 후에 발생하는 환자는 주의하여야 한다. 클로스트리디움 디피테리(Clostridium difficile)에서 생성되는 독소물질이 1차적인 원인으로 알려져 있으므로 위장성대장염이 의심될 때는 이 약의 투여를 즉시 중지하고, 환자에게는 자체없이 보조수단 소 투약으로 치료(예를 들면 경구용 반코마이신 등)를 실시하여야 한다. 이런 임상상태에서는 장 운동을 저해하는 제제는 금하여야 한다.

7. 말초신경병증

이 약을 포함한 퀴놀론계 항생제를 투여받은 환자에서 감각이상 또는 감각운동 축색의 다발신경병증의 결과로 감각이상, 감각저하, 감각장애 및 쇄골 등 통증이 보고되었다. 증상은 이 약의 치료 시작 후 빠르게 나타날 수 있고 비가역적일 수 있다. 적열, 저림, 무감각, 가벼운 축삭, 통각, 온도, 위치, 진동감각 등의 변화가 수반되는 신경병증의 증상을 경험한 환자는 비가역적인 상태로 진행되는 것을 예방하기 위해 이 약의 투여를 중단해야 한다.

8. 시각장애

이 약의 투여와 관련하여 시각 장애가 나타날 시에는 인과관계와 즉시 상담하여야 한다. 몇 개의 임상시험에서 퀴놀론계 항생제를 투여하였을 때 망막박리 발생 위험의 경미한 증가가 보고되었다. 그러나 인과관계는 명확하게 확립되지 않았다.

【저장 방법】 ■ 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

■ 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

【포장 단위】 30정/병, 100정/병, 500정/병

【제 조 자】 위더스 제약(주)

WITHUS WITHERS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
87-1 영남로 619호 서울특별시 강남구 테헤란로 619

6. 상호작용

1) 이 약을 포함한 퀴놀론계 항균제와 비스테로이드성염증제(예: 펜부텐, 클로르부프로펜과 같은 페닐산계 또는 프로피온산계)와 병용투여는 중추신경자극과 경련성 발작의 위험을 증가시킬 수 있으므로 신중히 투여한다.

2) 알부민 또는 마그네슘 함유 제제, 수크랄라이트, 철분 함유 제제, 칼슘 함유 제제, 이온 또는 철분이 저하되어 중합비탄젠트제와 병용에 의해 흡수가 저하되어 효과가 저하되는 경우가 있으므로 이 약 투여 전후 2시간 이내에는 병용하지 않는 것이 바람직하다.