

일반의약품

비스타치 플러스 정

(글루타티온(환원형))

해독, 약물중독

[원료약품 및 분량] 1정 중

글루타티온(환원형)(KP) 100.0mg

• 동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유)

• 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 라우릴황산나트륨, 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 탭실드흰색(22W265)

[성 색] 흰색의 원형 필름코팅정

[효능·효과] 약물중독, 자가중독

[용법·용량]

성인 : 글루타티온으로서 1회 50~100mg, 1일 1~3회 복용한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지말것.

1) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할것.

1) 과민증: 드물게 발진 등이 나타날 수 있다.

2) 소화기계: 드물게 식욕부진, 구역, 구토, 위통 등이 나타날 수 있다.

4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약중의 부형제로 혼재되어있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 [사용기간] 제조일로부터 36개월 [포장단위] 30정/병, 300정/병

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하세요.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.pharvis.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

※ 소비자상담실 : 02)579-6262

본 의약품은 우수 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

작성일자 : BSTT 2025.02.06 (1-250206)