

뮤스테인 캡슐 200mg

(아세틸시스테인)

일반의약품
전해가담제

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

조성·성상 : 1. 원료약품 및 그 분량: 1캡슐 중
아세틸시스테인(KP) 200mg
첨가제(동물유래): 유당수화물/소/유(乳), 젤라틴/소, 돼지, 킬라피아/가축
첨가제(타르색소): 적색3호, 청색1호
2. 성상: 흰색의 분말이 충전된 상, 하부 연청색의 경질캡슐체

효능·효과 : 1. 주요효 효과
1) 다음 질환에서의 객담배출곤란: 급·만성기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 폐기관지염, 만성염증
2) 인·후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성중이염

용법·용량 : 아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여한다.

1. 급성질환
 - 성인: 1회 200mg 1일 3회
 - 소아: 6-14세 1회 200mg 1일 2회
2. 만성질환
 - 성인: 1회 200mg 1일 2회
 - 소아: 6-14세 1회 100mg 1일 3회
3. 만성염증
 - 소아: 6세 이상 1회 200mg 1일 3회, 2-5세 1회 100mg 1일 4회
 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사 용 상 의 : 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
주의 사항
1) 약에 과민증 환자
2) 위·십이지장궤양 환자
3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적 결함이 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
신장아 (중증 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않는다.)
3. 부작용
1) 소화기계: 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있다.

- 2) 과민증: 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 아명, 기관지경련(특히 천식 환자) 등이 나타날 수 있다.
- 3) 드물게 빈맥, 고혈압이 나타날 수 있다.
- 4) 국내 자발적 유해사례 보고자료(1989-2013 상반기)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당 성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
· 호흡곤란
4. 상호작용
경구용 항생물질(아목시실린, 세프록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치아페니콜)과 병용투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다).
5. 임부에 대한 투여
임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여한다.
6. 수유부에 대한 투여
이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.
7. 적응상의 주의
이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 한다.

저 장 방 법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포 장 단 위 : 차사포장단위

제 조 자 : 우리들제약㈜ / 경기도 화성시 향남읍 계곡공단 2길 50

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

※ 본 제품은 “우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)”에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 이 첨부문서 작성일자(2015.04.29)이후로 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품정보는 경보제약 홈페이지(<http://www.kbpharma.co.kr>)나 온라인 의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

101- 042915
(최종 개정 연월일 2015년04월29일)

제조업체:



본사 · 공장: 충청남도 아산시 설목로 174
서울 사무소: 서울특별시 서대문구 용암로 8
소외지점: 021 365-2312