

전립선염, 전립선 비대증 관련약품

후리패스캡슐

(실로도신)

Furipass Cap.

【원료약품의 분량】1캡슐 중

실로도신(염류) 4.0mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물 (기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

【성 상】 흰색 내지 연한 황백색의 과립 또는 분말이 든 상하부 불투명 흰색의 경질캡슐제

【효능·효과】 전립선 비대증에 수반하는 배뇨장애

【용법·용량】

성인에게 1회 4mg 1캡슐을 1일 2회 아침 저녁 식후 또는 1회 4mg 2캡슐(8mg)을 1일 1회 식사와 함께 경구투여한다.
단, 신기능 장애 환자에서 실로도신의 혈장 중 농도가 상승하는 것이 보고되었고, 간기능 장애 환자도 혈장 중 농도가 상승할 가능성이 있기 때문에, 환자 상태를 관찰하면서 저용량 (1회 2mg 1캡슐, 1일 2회부터 투여를 개시하는 등 증상에 따라 적당히 감량한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에게 투여하지 말 것
 - (1) 이 약의 성분에 과민증의 병력이 있는 환자
 - (2) 중증의 신장장애 환자 [크레아티닌 청소율(CCr)(30mL/min)
 - (3) 중증의 간장애 환자(Child-Pugh score≥10)
 - (4) 강력한 CYP450 3A4 저해제에, 케토코나졸, 클라리스로마이신, 이트라코나졸, 리토나비어)를 복용하고 있는 환자
 - (5) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여 하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - (1) 기립성 저혈압이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
 - (2) 간기능 장애 환자(혈장 중 농도가 상승할 수 있다.)(「용법·용량,항 참조」)
 - (3) 신기능 장애 환자(혈장 중 농도가 상승하는 것이 보고되었다.)(「용법·용량,항 참조」)
 - (4) PDE5 저해제를 복용하고 있는 환자(「상호작용,항 참조」)
 - (5) 다른 알파-1 차단제를 복용하고 있는 환자(「상호작용,항 참조」)
- 이상반응
 - (1) 일본에서 실시한 배뇨장애 환자를 대상으로한 임상시험의 총 증례 873례 중, 부작용은 391례(44.8%)이었다. 주로 보고된 이상반응은 사정장애(역행성사정 등) 150례(17.2%), 구갈 50례(5.7%), 설사 35례(4.0%), 묽은 변 34례(3.9%), 기립성 어지러움 31례(3.6%), 코막힘 29례(3.3%), 현기증 23례(2.6%), 어지러움 22례(2.5%), 두통 19례(2.2%)등이었다. 또, 임상검사치의 이상 변동은 총 증례 853례 중 185례(21.7%)이었다. 주로 보고된 것은 TG 상승 62례(7.4%), CRP 상승 21례(3.9%), ALT(GPT) 상승 20례(2.3%), AST(GOT) 상승 19례(2.2%), γ-GTP 상승 19례(2.2%) 등이었다.
 - 1) 중대한 이상 반응
 - ① 심신·약식 상생(빈도불명) : 혈압 저하에 동반하는 알과성의 약식 상실 등이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 이 약의 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - ② 간기능 장애, 황달(모두 빈도불명) : AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승 등을 수반한 간기능 장애, 황달 등이 나타나는 경우가 있으므로, 충분히 관찰하고 이상이 인정 되는 경우에는 이 약 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 2) 그 외의 부작용

아래의 부작용이 나타난 경우가 있으므로, 이상이 확인된 경우에는 필요에 따라 감량 또는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.

	빈도불명	5% 이상	1~5%	0.1~1%
비뇨·생식기계		사정장애 (역행성 사정 등)	발기부전, 요실금	
소화기계	구내염	구갈	위불쾌감, 설사, 묽은 변, 변비	구토, 구역, 식욕 부진, 위통, 복통, 복부 팽만감, 상복부미화감, 하복부통, 위궤양, 위염, 위축성 위염, 가슴 쓰림이나 위쓰림, 십이지장 궤양, 방귀 증가, 배변 증가, 잔변감, 항문 불쾌감
정신 신경계			현기증, 기립성 어지러움, 어지러움, 두통, 권태감	어깨결림, 손발저림, 머리가 멍해지는 느낌, 졸음, 식욕 감퇴, 두증감, 기분 불량
호흡기계			비출혈, 코막힘	코물, 기침
심혈관계	부종			심방세동, 동계, 빈맥, 부정맥, 상실성 기외 수축, 기립성 저혈압, 혈압 저하, 혈압 상승
피부				발진, 습진, 두드러기, 소양감
눈	수술 중 황체 이완중후군(HCS), 시야흐림			눈의 충혈, 눈의 가려움, 결막 출혈
간장			AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, γ-GTP 상승, 총빌리루빈 상승, ALP 상승, LDH 상승	간기능 장애
신장				BUN 상승, 크레아티닌 상승
혈액			백혈구수 감소, 적혈구수 감소, 혈색소량 감소, 적혈구 용적률치 감소	백혈구수 증대, 혈소판수 감소
면역체계	알콜중독, 설부종, 인두부종			
그 외	여성형 유방	TG 상승	CRP 상승, 총콜레스테롤 상승, 노당 상승, 요침	얼굴 화끈거림, 이명, 쓴 맛, 흉통, 요통, 하지 말장간, 발한, 화끈거림, 혈청 칼륨치 상승, 총단백 저하, 전립선 특이 항원 증가, 요산 상승, 노당배설 상승

(2) 1회 8mg을 1일 1회로 경구 투여한 양성 전립선 비대증 환자 대상 3상 임상시험에서 총 466명의 환자가 이 약을 투여 받았다. 가장 흔한 이상반응은 역행성사정으로, 2% 이상 보고된 이상반응은 다음과 같다.

	이 약 투여군 n=466명 (%)	위약 투여군 n=457명 (%)
역행성 사정	131 (28.1)	4 (0.9)
현기증	15 (3.2)	5 (1.1)
설사	12 (2.6)	6 (1.3)
기립성 저혈압	12 (2.6)	7 (1.5)
두통	11 (2.4)	4 (0.9)
비인두염	11 (2.4)	10 (2.2)
코막힘	10 (2.1)	1 (0.2)

(3) 국내 임상시험에서 보고된 이상반응
국내에서 실시된 임상시험(n=103)에서 1% 이상 발생한 이상반응은 다음과 같다.

	5% 이상	1~5%
비노·생식기계	발기부전, 사정장애	요로감염, 배뇨장애, 오실금
소화기계		구갈, 구역, 구토, 소화불량, 식욕부진, 복부불쾌감, 하복부통, 설사, 배변 증가
정신 신경계		어지러움, 두통, 기립성 어지러움, 파나 진정, 성욕 감퇴, 오르가즘 감소, 다리저림
호흡기계		코막힘, 코골, 기침
심혈관계		부종, 심계항진
피부		가려움
눈		시아 장애
간장	AST(GOT) 상승, ALT (GPT) 상승, γ-GTP 상승, 총빌리루빈 상승, ALP 상승, LDH 상승	
혈액		혈소판수 감소
그 외	TG 상승	열, 오한, 하지발진, 흉부불편, 요통, 어깨통증, 혈중 요산 증가, 혈중 크레아티닌 증가

(4) 국내 시판 후 조사결과

- ① 국내에서 재심사를 위하여 667명인 5,583명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 유해사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 5.7%(322/5,583명, 총 362건)로 보고 되었다. 이 중 중대한 유해사례 발현율은 0.18%(10/5,583명, 13건)로 전립선암 0.09% (5/5,583명, 5건), 수술적중재 0.04% (2/5,583명, 2건), 전립선특이항원 증가, 고환염, 자해, 전신쇠약, 빈혈, 호흡곤란 각 0.02% (1/5,583명, 1건) 있고, 이 약과 인과관계를 배제할 수 있는 중대한 유해사례는 보고되지 않았다.
- 예상하지 못한 유해사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 0.43%(24/5,583명, 27건)로 보고되었으며, 주 유해사례는 전립선암 0.11% (6/5,583명, 6건), 빈뇨 0.07% (4/5,583명, 4건), 수술적중재 0.05% (3/5,583명, 3건), 신부전 0.04% (2/5,583명, 2건), 고환염, 병의 악화, 보행장애, 소변흐름감소, 역류성식도염, 요도통증, 음낭부종, 구강건조 악화, 자해, 전신쇠약, 치매악화, 호흡곤란 각 0.02% (1/5,583명, 1건)으로 조사되었다.
- 이 중 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 유해사례 발현율은 0.07% (4/5,583명, 4건)로 빈뇨 0.05% (3/5,583명, 3건), 구강건조 악화 0.02% (1/5,583명, 1건)이 보고되었다.
- ② 이 약에 대한 국내 재조사 유해사례 및 자발적 유해사례 보고자료를 국내 시판 허가된 모든 의약품을 대상으로 보고된 유해사례 보고자료와 재조사 종료시점에서 통합평가한 결과, 다른 모든 의약품에서 보고된 유해사례에 비해 이 약에서 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례 중 새로 확인된 것들은 다음과 같다. 다만, 이 결과가 해량상분과 다음의 유해사례간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
- 위장관계 장애: 구강건조
 - 비노기에 질환: 혈뇨
 - 감염: 대상포진

4. 일반적 주의

- (1) 사정장애(역행성 사정 등)가 나타날 수 있으므로, 이 약을 투여할 때의 사정장애에 관한 설명을 충분히 실시하고, 환자의 이해를 얻은 다음 사용해야 한다. (이상반응, 항 조직)
- (2) 기립성 저혈압이 나타나는 일이 있으므로, 체위 변화에 따른 혈압변화에 주의한다.
- (3) 한가중 등이 나타날 수 있으므로 높은 곳에서의 작업이나 자동차 운전 등 위험이 따르는 작업에 종사하는 경우에는 주의를 환기시켜야 한다.
- (4) 이 약을 과량투여 할 경우 혈압저하가 예상되므로 투여량에 주의해야 한다.
- (5) 이 약을 투여하기 전에 혈압강하제의 복용여부를 확인하여야 하며, 혈압강하제를 복용한 경우에는 혈압변화에 주의하고 혈압저하가 나타날 경우에는 강령 또는 투여 중단 등 적절한 처치를 해야 한다.
- (6) 이 약에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법에 유익하여 이 약 투여로 기대되는 효과를 얻지 못할 경우에는 수술요법 등 다른 적절한 처치를 고려해야 한다.
- (7) 전립선암과 전립선 비대증은 야기하는 증상이 비슷하고, 이 두 질환은 종종 공존하므로 이 약 투여 전에 전립선암이 있는지 평가하여야 한다.
- (8) a1 차단제를 복용하고 있거나 이전에 복용했던 일부 환자에서, 백내장 수술을 하는 동안 '수술 중 증대이완증후군(Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS)'이 관찰되었다.
- (9) 중증의 간기능 저하 현상에 대한 임상자료가 없으므로, 이러한 환자에서는 투여하지 않는다.

5. 상호작용

- (1) 심도신기는 주로 CyP3A4, UDP-글루쿠론산 전이효소(UGTs), 알코올 탈수소효소(ADH) 및 알데하이드 탈수소효소(ALDH)에 의해 대사된다. 견강한 지원자에게 강력한 CyP3A4 저해제인 케토코나졸(200mg)을 이 약 4mg과 병용투여 했을 때, 이 약의 AUC가 2배, Cmax가 37배 증가하였다. 또한, 케토코나졸(400mg)을 이 약 8mg과 병용투여 했을 때에는 AUC가 3.2배, Cmax가 3.8배 증가하였다. 특이적인 상호작용이 연구되지는 않았지만, 다른 강력한 CyP3A4 저해제(에티라코나졸, 클레리스로 마이신, 리도나비어)와 병용투여시 심도신도의 대사가 저해되어 이 약의 혈중 농도가 상승할 수 있으므로, 병용하지 않는다.
- (2) 혈압강하제를 병용중인 환자는 기립시의 혈압조절 능력이 저하되는 경우가 있으며, 이 약을 혈압강하제와 병용시 기립성 저혈압이 나타날 수 있으므로 강령하는 등 주의 한다.
- (3) 다른 알파-1 차단제와의 상호작용은 확인된 바 없으나, 상호작용이 예상되므로 병용하지 않는다.
- (4) 이 약은 알파 차단 작용을 가지므로, 이 약과 PDE5 저해제(구연산 실데나필, 명선 비데나필 등)를 병용투여시 혈압 강하 작용이 증가할 수 있다. 이 약을 PDE5 저해제와 병용 투여한 임상시험은 시행되지 않았으나 동일계열 유사약제의 경우 PDE5 저해제와 병용 투여시 중추성 저혈압이 나타난다는 보고가 있으므로 주의하여 투여한다.
- (5) 이 약(4mg 1회)과 디곡산(0.25mg, 1일 1회)을 병용 반복투여한 경우 디곡산의 약동학적 특성에 영향은 없었다.
- (6) 강력한 P-Glycoprotein 저해제(사이클로스포린)와 병용투여시 심도신도의 혈장농도가 상승할 수 있으므로 병용하지 않는다.

6. 고려장애의 투여

고령자에게서 기립성저혈압이 다소 증가하는 경향이 있었지만, 안전성 및 유효성에서 유의한 차이는 보이지 않았다. 하지만, 고령자에서는 생리 기능이 저하되어 있으므로 강령하는 또는 신기능이 저하된 경우에는 허용량(1회 2mg)부터 투여를 개시하는 등, 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 신중히 투여한다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- (1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

8. 기타

- (1) 혈압에 대한 발암시험에서, 심도신을 104주간 식이로 투여한 결과, 발암성은 인정되지 않았으나, 최고용량(150mg/kg/일 (AUC를 근거로 임상적용량의 약 50배)을 투여받은 수컷 랫드에서 유의성 있는 갑상선선세포종양의 유발빈도가 증가하였다. 임컷 랫드에 250mg/kg/일의 용량까지 104주간 식이로 투여한 결과 종양유발성은 인정되지 않았다.
- (2) 마우스에 대한 발암시험에서, 심도신을 200/100mg/kg/일의 용량까지 104주간 식이로 투여한 결과, 수컷에서 종양유발성은 인정되지 않았으나, 20mg/kg/일 이상의 투여군에서 정낭선 확장의 빈도 상승이 보고되었다. 임컷 마우스에 400mg/kg/일 용량까지 투여한 결과, 중간용량(150mg/kg/일, AUC를 근거로 임상적용량의 약 88배) 및 최고용량(400mg/kg/일, AUC를 근거로 임상적용량의 약 348배) 투여군에서 용량 의존적이고 유의성 있는 유선암 및 유선표피암 유발 빈도가 증가하였다.
- (3) 쥐에서 400mg/kg/일 및 착상까지의 초기배발생에 관한 시험에 있어, 200mg/kg/일 이상의 투여군에서 세정관에 정자 세포의 탈락이, 600mg/kg/일 투여군에서 세정관의 위축·변성, 정자 생존률 및 정자수의 감소가 보고되었다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법 및 사용기간】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실☎031-377-7909로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 이 첨부서 개정일자 이후 변경된 내용은 한국휴텍스제약(주) 홈페이지(www.hutechs.co.kr)에서 확인해주시고.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국휴텍스제약(주) 두산위생약품제약(주)소속
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99 **KGMP** 2377-0001

제조업체: 한국휴텍스제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

제 조 자 : 이나스트바이오제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 34-40

설명서 작성일 151007