

실로신캡슐

4밀리그램(실로도신)

원료약품 및 그 분량 1캡슐 중

실로도신(별규).....4.0mg
첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

성상

흰색 내지 연한 황백색의 과립 또는 분말이 든 상하부 불투명 흰색의 경질캡슐제

효능·효과

전립선 비대증에 수반하는 배뇨장애

용법·용량

성인에게 1회 4mg 1캡슐을 일 2회 아침 저녁 식후 또는 1회 4mg 2캡슐(8mg)을 일 1회 식사와 함께 경구투여합니다.

단, 신기능 장애 환자에서 실로도신의 혈장 중 농도가 상승하는 것이 보고되었고, 간기능 장애 환자도 혈장 중 농도가 상승할 가능성이 있기 때문에, 환자 상태를 관찰하면서 저용량(1회 2mg 1캡슐, 일 2회)부터 투여를 개시하는 등 증상에 따라 적당히 감량합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에게 투여하지 마십시오.

- (1) 이 약의 성분에 과민증의 병력이 있는 환자
- (2) 중증의 신장애 환자 [크레아티닌 청소율(CCr)(30mL/min)
- (3) 중증의 간장애 환자(Child-Pugh score≥10)
- (4) 강력한 CYP450 3A4 저해제(예. 케토코나졸, 클라리트로마이신, 이트라코나졸, 리토나비어)를 복용하고 있는 환자
- (5) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여 하면 안 됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- (1) 기립성 저혈압이 있는 환자 [중상이 악화될 수 있습니다.]
- (2) 간기능 장애 환자 [혈장 중 농도가 상승할 수 있습니다.] (「용법·용량, 항참조」)
- (3) 신기능 장애 환자 [혈장 중 농도가 상승하는 것이 보고되었습니다.] (「용법·용량, 항참조」)
- (4) PDE5 저해제를 복용하고 있는 환자 (「상호작용, 항참조」)
- (5) 다른 알파-치단제를 복용하고 있는 환자 (「상호작용, 항참조」)

3. 이상반응

- (1) 일본에서 실시된 배뇨장애 환자를 대상으로한 임상시험의 총 증례 873례 중, 부작용은 391례(44.8%)이었습니다. 주로 보고된 이상반응은 사정 장애(역행성사정 등) 150례(17.2%), 구갈 50례(5.7%), 설사 35례(4.0%), 묽은 변 34례(3.9%), 기립성 어지러움 31례(3.6%), 코막힘 29례(3.3%), 현기증 23례(2.6%), 어지러움 22례(2.5%), 두통 19례(2.2%) 등이었습니다. 또, 임상 검사치의 이상 변동은, 총 증례 853례 중 185례(21.7%)이었습니다. 주로 보고된 것은 TG 상승 62례(7.4%), CRP 상승 21례(3.9%), ALT(GPT) 상승 20례(2.3%), AST(GOT) 상승 19례(2.2%), γ-GTP 상승 19례(2.2%) 등이었습니다.

1) 중대한 이상 반응

- ① 설사·의식 상실(빈도불명) : 혈압 하하에 동반하는 일과성의 의식 상실 등이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 이 약의 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
- ② 간기능 장애, 황달(모두 빈도불명) : AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승 등을 수반한 간기능 장애, 황달 등이 나타나는 경우가 있으므로, 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 이 약 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.

2) 그 외의 부작용

아래의 부작용이 나타난 경우가 있으므로, 이상이 확인된 경우에는 필요에 따라 감량 또는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.

	빈도 불명	5% 이상	1~5%	0.1~1%
비뇨생식기계		사정장애(역행성사정 등)	발기부전, 요실금	
소화기계	구내염	구갈	위불쾌감, 설사, 묽은 변, 변비	구토, 구역, 식욕 부진, 위통, 복통, 복부 팽만감, 식욕부진/허감, 하복부통, 위궤양, 위염, 위축성 위염, 가슴 쓰림이나 위쓰림, 심미자장 장애, 방귀 증가, 배변 증가, 잔변감, 항문 불쾌감
정신신경계			현기증, 기립성 어지러움, 어지러움, 두통, 편두통	어깨결림, 손발저림, 머리가 방해지는 느낌, 졸음, 성욕 감퇴, 두통감, 기분 불쾌
호흡기계			비출혈, 코막힘	코물, 기침

심혈관계	부종			심방세동, 동맥, 빈맥, 부정맥, 상심성 기외 수축 기립성 저혈압, 혈압 저하, 혈압 상승
피부				발진, 습진, 두드러기, 소양감
눈	수술 중 홍채미완충 후군(FIS), 시야흐림			눈의 충혈, 눈의 가려움, 결막 충혈
간장			AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, γ-GTP 상승, 총빌리루빈 상승, AL-P 상승, LDH 상승	간기능 장애
신장				BUN 상승, 크레아티닌 상승
혈액			백혈구수 감소, 적혈구수 감소, 혈색소량 감소, 적혈구용적률감소	백혈구수 증대, 혈소판수 감소
면역체계	알콜중독, 설부종, 인두부종			
그 외	여성형 유방	TG 상승	CRP 상승, 총콜레스테롤 상승, 노당 상승, 요침	얼굴 화끈거림, 이명, 쓴 맛, 흉통, 요통, 하지 탈진감, 발한, 화끈거림, 혈청 칼륨치 상승, 총단백 저하, 전립선 특이 항원 증가, 요산 상승, 노당배설증

- (2) 1회 8mg을 일 1회로 경구 투여한 양성 전립선 비대증 환자 대상 3상 임상시험에서 총 466명의 환자가 이 약을 투여 받았습니다. 가장 흔한 이상반응은 역행성사정으로, 2% 이상 보고된 이상반응은 다음과 같습니다.

	이 약 투여군 n=466명 (%)	위약 투여군 n=457명 (%)
역행성사정	131 (28.1)	4 (0.9)
현기증	15 (3.2)	5 (1.1)
설사	12 (2.6)	6 (1.3)
기립성 저혈압	12 (2.6)	7 (1.5)
두통	11 (2.4)	4 (0.9)
비인두염	11 (2.4)	10 (2.2)
코막힘	10 (2.1)	1 (0.2)

- (3) 국내 임상시험에서 보고된 이상반응

국내에서 실시된 임상시험(n=103)에서 1% 이상 발생한 이상반응은 다음과 같습니다.

	5% 이상	1~5%
비뇨·생식기계	발기부전, 사정장애	요로감염, 배뇨장애, 요실금
소화기계		구갈, 구역, 구토, 소화불량, 식욕부진, 복부불쾌감, 하복부통, 설사, 배변 증가
정신신경계		어지러움, 두통, 기립성 어지러움, 과다 진정, 성욕 감퇴, 오프가슴 감소, 다리저림
호흡기계		코막힘, 콧물, 기침
심혈관계		부종, 심계항진
피부		가려움
눈		시야 장애
간장	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, γ-GTP 상승, 총빌리루빈 상승, AL-P 상승, LDH 상승	
혈액		혈소판수 감소
그 외	TG 상승	열, 오후, 하지탈진감, 흉부불편, 요통, 어깨통증, 혈중 요산증가, 혈중 크레아티닌 증가

- (4) 국내 시판 후 조사결과

① 국내에서 재상시를 위하여 6년동안 5,583명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 유해사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 5.77%(322/5,583명, 총 362건)로 보고되었습니다. 이 중 중대한 유해사례 발현율은 0.18%(10

/5,583명, 13건)로 전립선암 0.09% (5/5,583명, 5건), 수술적중재 0.04% (2/5,583명 2건), 전립선특이항원 증가, 고환형, 자해, 전신쇠약, 빈혈, 호흡곤란 각 0.02% (1/5,583명, 1건)이고, 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 유해사례는 보고되지 않았습니다. 예상하지 못한 유해사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 0.43%(24/5,583명, 27건)로 보고되었으며, 주 유해사례는 전립선암 0.11% (6/5,583명, 6건), 빈뇨 0.07% (4/5,583명, 4건), 수술적중재 0.05% (3/5,583명 3건), 신부전 0.04% (2/5,583명 2건), 고환형, 병의 악화, 보형장애, 소변흐름감소, 역류성식도염, 오통증, 음낭부종, 구강건조 약화, 자해, 전신쇠약, 치매약화, 호흡곤란 각 0.02% (1/5,583명 1건)으로 조사되었습니다. 이 중 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 유해사례 발현율은 0.07% (4/5,583명, 4건)로 빈뇨 0.05% (3/5,583명 3건), 구강건조 약화 0.02% (1/5,583명, 1건)이 보고되었습니다.

② 이 약에 대한 국내 제3사 유해사례 및 자발적 유해사례 보고자료를 국내 시판 허가된 모든 의약품들 대상으로 보고된 유해사례 보고자료와 제3사 종료시점에서 통합평가한 결과, 다른 모든 의약품에서 보고된 유해사례에 비해 이 약에서 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례 중 새로 확인된 것들은 다음과 같습니다. 다만, 이 결과가 해당성분과 다음의 유해사례간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.

- 위장관계 장애: 구강건조
- 비뇨기계 질환: 혈뇨
- 감염: 대상포진

4. 일반적 주의

- (1) 사정장애(역행성 사정 등)가 나타날 수 있으므로, 이 약을 투여할 때의 사정장애에 관한 설명을 충분히 실시하고, 환자의 이해를 얻은 다음 사용해야 합니다. (‘이상반응, 항 조치’)
- (2) 기립성 저혈압이 나타나는 일이 있으므로, 체위 변화에 따른 혈압변화에 주의합니다.
- (3) 현기증 등이 나타날 수 있으므로 높은 곳에서 작업이나 자동차 운전 등 위험이 따르는 작업에 종사하는 경우에는 주의를 환기시켜야 합니다.
- (4) 이 약을 과량투여 할 경우 혈압하강이 예상되므로 투여량에 주의해야 합니다.
- (5) 이 약을 투여하기 전에 혈압강하제의 복용여부를 확인하여야 하며, 혈압강하제를 복용한 경우에는 혈압안화에 주의하고 혈압하강이 나타날 경우에는 감량 또는 투여중단 등 적절한 처치를 해야 합니다.
- (6) 이 약에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법에 유의하여 이 약 투여로 기대되는 효과를 얻지 못할 경우에는 수술요법 등 다른 적절한 처치를 고려해야 합니다.
- (7) 전립선암과 전립선 비대증은 야기하는 증상이 비슷하고, 이 두 질환은 종종 공존하므로 이 약 투여 전에 전립선암이 있는지 평가하여야 합니다.
- (8) α1 차단약을 복용하고 있거나 이전에 복용했던 일부 환자에서, 백내장 수술을 하는 동안 ‘수술 중 홍채이완증후군(Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS)’이 관찰되었습니다.
- (9) 중증의 간기능 저하 환자에 대한 임상자료가 없으므로, 이러한 환자에게는 투여하지 않습니다.

5. 상호작용

- (1) 실로도신은 주로 CYP3A4, UDP-글루쿠론산 전이효소(UGTs), 알코올 탈수소효소(ADH) 및 알데하이드 탈수소효소(ALDH)에 의해 대사됩니다. 건강한 지원자에게 강력한 CYP3A4 저해제인 케토코나졸(200mg)을 이 약 4mg과 병용투여 했을 때, 이 약의 AUC가 2.9배, Cmax가 3.7배 증가하였습니다. 또한, 케토코나졸(400mg)을 이 약 8mg과 병용투여 했을 때에는 AUC가 3.2배, Cmax가 3.8배 증가하였습니다. 특이적인 상호작용이 연구되지는 않았지만, 다른 강력한 CYP3A4저해제(예,이트라코나졸, 클레리스로마이신, 리토나비어)와 병용투여시 실로도신의 대사가 저해되어 이 약의 혈중 농도가 상승할 수 있으므로 병용하지 않습니다.
- (2) 혈압강하제를 복용중인 환자는 기립시의 혈압조절 능력이 저하되는 경우가 있으며, 이 약을 혈압강하제와 병용시 기립성 저혈압이 나타날 수 있으므로 감량하는 등 주의합니다.
- (3) 다른 알파-차단제와의 상호작용은 확인된 바 없으나, 상호작용이 예상되므로 병용하지 않습니다.
- (4) 이 약은 알파 차단 작용을 가지므로, 이 약과 PDE5 저해제(구연산 실데나필, 염산 바데나필 등)를 병용투여시 혈압 강하 작용이 증가할 수 있습니다. 이 약을 PDE5 저해제와 병용 투여한 임상시험은 시행되지 않았으나 동일계열 유사약제의 경우 PDE5 저해제와 병용 투여시 중후성 저혈압이 나타난다는 보고가 있으므로 주의하여 투여합니다.
- (5) 이 약(4mg 1일 2회)과 디곡신(0.25mg, 1일 1회)을 병용 반복투여한 경우 디곡신의 약동학적 특성에 영향은 없었습니다.
- (6) 강력한 P-Glycoprotein 저해제(예, 사이클로스포린)와 병용투여시 실로도신의 혈장농도가 상승할 수 있으므로 병용하지 않습니다.

6. 고령자에의 투여

고령자에게서 기립성저혈압이 다소 증가하는 경향이 있었지만, 안전성 및 유효성에서 유의한 차이는 보이지 않았습니다. 하지만, 고령자에서는 생리 기능이 저하되어 있으므로 간기능 또는 신기능이 저하된 경우에는 허용량(1회 2mg)부터 투여를 개시하는 등, 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 신중히 투여합니다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- (1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

8. 기타

- (1) 췌트에 대한 발암시험에서, 실로도신을 104주간 식이로 투여한 결과, 발암성은 인정되지 않았으나, 최고용량 150mg/kg/일 (AUC를 근거로 임상적용량의 약 50배)를 투여받은 수컷 췌트에서 유의성 있는 감상선세포사포선종의 유발빈도가 증가하였습니다. 암컷 췌트에 250mg/kg/일의 용량까지 104주간 식이로 투여한 결과 종양유발성은 인정되지 않았습니다. 마우스에 대한 발암시험에서, 실로도신을 200/100mg/kg/일의 용량까지 104주간 식이로 투여한 결과, 수컷에서 종양유발성은 인정되지 않았으나,

20mg/kg/일 이상의 투여군에서 정낭선 확장의 빈도 상승이 보고되었습니다. 암컷 마우스에 400mg/kg/일 용량까지 투여한 결과, 중간용량(150mg/kg/일, AUC를 근거로 임상적용량의 약 88배) 및 최고용량(400mg/kg/일, AUC를 근거로 임상적용량의 약 344배) 투여군에서 용량 의존적이고 유의성 있는 유선암 및 유선표피암 유발 빈도가 증가하였습니다. (2) 췌트에서의 수태능 및 착상까지의 초기배발생에 관한 시험에 있어, 200mg/kg/일 이상의 투여군에서 세정관에 정자 세포의 탈락이, 600mg/kg/일 투여군에서 세정관의 위축·변성, 정자 생존률 및 정자수의 감소가 보고되었습니다.

저장방법

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

60캡슐

취급상의 주의사항

※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품대매자에게만 바꾸실 수 있습니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 11월 03일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr/>)의 ‘의약품검색’에서 확인할 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

첨부문서 최종 개정 연월일: 2015. 11. 03
1511-00

슈넬생명과학(주)

Schnell Biopharmaceuticals, Inc.
경기도 화성시 양감면 두머리길 16

제조회사: 슈넬생명과학(주) / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16
제조자: 이니스티브이오제약(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단2로 34-40