

하루 한번! 간(肝)질환 보조 치료제

리버솔

(연질캡슐)
(밀크시슬엑스)



[성분 · 함량] 1캡슐 중

- 유효성분 : 밀크시슬엑스(생규) 350mg
(실리마린으로서 196mg)
- 첨가제(타르색소) : 적색 40호, 청색 1호
- 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(기원 : 소, 돼지, 사용부위 : 가죽)
- 기타 첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 비결정성 소르비톨액, 산화티탄, 아자경화유, 에틸바닐린, 콩기름, 폴리소르베이트80, 황납

[성상]

황갈색의 유상 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐

[효능 · 효과]

다음 질환의 보조치료: 독성간질환, 만성간염, 간경변

[용법 · 용량]

1일 1회, 1회 1캡슐

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 임신, 수유부
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 드물게 위통 또는 설사
- 2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 지킬 것
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기 복용시에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검

을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법 및 사용기간]

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

[학술정보문의] 080-585-0004

[포장단위] 60캡슐, 120캡슐

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- ※ 개정일자 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mids.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

개정연월일 : 2018. 06. 11
02/201806

[제조사] COSMAX BIO

충청북도 제천시 바이오밸리 3로 30

[제조외사] Arlico
알리코제약(주)

충청북도 진천군 관현원면 용소2길 21

[판매사] 유한메디칼

서울시 영등포구 신길로 215