

Caretime 은 태극제약(주)의 외용제 브랜드입니다.

정 부 관 인
KGMP
우수약품 지정업체
일반의약품
분류번호:265



무좀 가려움증에 하루에 한번



무라졸 쿨 크림

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

테르비나핀염산염(USP)	10mg
글리시리진산이칼륨(KP)	5mg
리도카인(KP)	20mg
1-멘톨(KP)	10mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	1mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필(KP)	1mg

【성 상】 흰색 또는 옅은 미황색(연노랑)의 크림제

【효능 · 효과】 피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이)감염증 : 무좀, 완전(사타구니백선), 백선

【용법 · 용량】 1일 1회, 적당량을 환부(질환부위)에 도포한다(바른다).

【사용상의주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 이 약 성분에 의한 과민증(발진 및 부적, 가려움, 붓기 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 3) 유 · 소아

2. 다음 부위에는 사용하지 말 것.

- 1) 눈이나 눈 주위, 점막(구강(입안), 비강(코안), 질 등), 음낭, 외음부 등
- 2) 습진
- 3) 습윤(습기 참), 짓무름, 갈라짐이나 외상(상처)이 심한 환부(질환 부위)
- 4) 손톱, 두피

3. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

이 약은 모유로 분비되므로, 이 약을 투여중인 수유부는 수유를 중단한다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 약에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 4) "습진"인지 "무좀, 완전(사타구니 백선), 백선"인지 확실하지 않은 사람(음낭에 가려움 및 짓무름 등의 증상이 있는 경우는 습진 등의 다른 원인에 의한 경우가 많다)
- 5) 환부(질환 부위)가 안면(얼굴) 또는 광범위한 사람
- 6) 환부(질환 부위)가 화농(농)으로 되어 있는 사람
- 7) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 다음의 경우는 즉시 사용을 중지하고, 이 설명서와 함께 의사 또는 약사와 상담할 것.

- 1) 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우

관계부위	증상
피부	발진 및 발적(충혈 되어 붉어짐), 가려움, 붓기, 자극감, 열감, 인비늘(비늘), 낙설(비듬)이나 대와 같은 피부의 벗겨짐, 짓무름, 피부건조 및 피부가 당겨지는 느낌, 피부의 갈라짐

- 2) 2주일 정도 사용하여도 증상이 좋아지지 않는 경우나 본 약제의 사용에 의해 증상이 악화된 경우

6. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 및 용량을 엄수할 것
- 2) 환부(질환 부위)나 그 주위가 더러워진 채로 사용하지 말 것
- 3) 본 약제가 묻은 손으로 눈이나 점막을 만지지 말 것
- 4) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일, 눈에 들어간 경우에는 즉시 찬 물 또는 미지근한 물로 씻어내고, 즉시 안과의의 진료를 받을 것.
- 5) 이 약은 외용에만 사용할 것
- 6) 테르비나핀염산염 크림제는 모르로트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 밀봉하여 보관할 것
- 2) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 3) 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것(오용(잘못 사용)의 원인이 되거나 품질이 바뀌는 경우가 있다.)
- 4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 말 것. 그리고 사용기한 내이라도 개봉 후에는 최대한 빨리 사용할 것(품질유지를 위해).

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 20g

* 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
* 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
* 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
* 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
☎ 소비자상담전화 : 080-300-8282

첨부문서 개정 연월일 : 2016.10.12

제조 · 판매자
태극제약(주)
충청남도 부여군 초촌면 금백로 821

M110023-01