

티로프민[®] 정 Tiropmin[®] Tab.

(티로프라미드염산염)

원료약품 및 그 분량 1정 중

주성분: 티로프라미드염산염(별규) 100.0 mg

성상

흰색의 원형 필름코팅정

효능·효과

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 : 간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통 : 위장관 이상 운동증, 담석증, 담낭염, 수술 후 유착

용법·용량

- 성인 : 티로프라미드염산염으로서 1회 100mg 1일 2-3회 경구투여한다.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
 - 2) 거대 결장, 허탈 환자
 - 3) 이 약에 과민증 환자
 - 4) 중증의 간부전 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여한다.
3. 이상반응
 - 1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 가려움, 홍반 등의 알레르기증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
4. 상호작용
혈압강화약물을 투여받은 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강화 효과가 상승 될 수 있으므로 주의한다.
5. 임부에 대한 투여
동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지는 않았으나 임부의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여한다.
6. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것

저장방법 기밀용기, 실온(1-30℃) 보관**포장단위** 30정/300정

- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품을 복용하기 전에 사용설명서를 주의깊게 읽으시고, 사용설명서를 의약품과 함께 보관하여야 합니다.
- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 대한 의문사항 및 본 사용설명서의 최종작성일자(2015년 6월 30일)이후 변경된 내용은 한화제약홈페이지(www.hwpharm.com) 또는 개발부(Tel:02-959-3679)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 의약품정보는 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

611190-1-1

제조의뢰자

 **한화제약**
강원도 춘천시 남면 약암길 109

제조사

위더스제약(주)
경기도 안성시 미양면 제2공단2길 103