

덴티드-F 캡슐

DENTIDE-F Cap.

일반의약품
분류번호 231

【성분·함량】 1캡슐 중

리소짐염산염(KP).....	30.0mg(역가)
제피아스코르브산(별규).....	156.3mg
(아스코르브산으로서 150.0mg)	
토코페롤아세테이트 2배산(KP).....	10.0mg
(토코페롤아세테이트로서 5.0I.U.)	
카르바조크롬(KP).....	2.0mg
옥수수전분(KP).....	100.0mg
크로스카르멜로오스나트륨(NF).....	24.7mg
크로스포비돈(NF).....	3.0mg
라우릴황산나트륨(KP).....	1.0mg
스테아르산마그네슘(KP).....	2.0mg
첨가제(타르색소) : 적색3호, 청색 1호	
첨가제(동물유래성분) : 리소짐염산염(닭, 난백)	

【성상】 옅은 주황색 가루가 든 상부, 하부 담청색의 경질캡슐제

【효능·효과】 치은염(잇몸염)·치조(이빨)농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐)·부기·출혈·통증)의 완화

【용법·용량】 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되고 붉어짐), 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
 - 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
 - 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 부작용
 - 이 약을 투여함으로써 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염(입안염) 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.
 - 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반(붉은 반점), 가려움, 안충혈, 구내염(입안염)등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상양(불에 덴 듯한 모양)의 수종등의 중증(심한 증상)의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증(심한 증상)의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지켜하십시오.
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아)하여 보관합니다.
 - 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 120, 240캡슐

【제조사】 슈넬생명과학(주) 경기도 화성시 양감면 두머리길 16

【제조외파자】 (주)이든파마 충북 진천군 문백면 농다리로 1149

【판매자】 (주)대웅생명과학 서울시 강동구 강동대로 189

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화(02)3487-7005로 하시기 바랍니다.

※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품사관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색' 에서 확인할 수 있습니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.

개정연월일 : 2015년 08월 20일