

질감염증 국소 치료제

포리진[®] 질연질캡슐

POLYGYN vaginal soft capsule

[네오마이신황산염/폴리믹신B황산염/니스타틴]

[원료약품 및 그 분량] : 1캡슐 중

네오마이신황산염(KP)..... 50.2 mg

(네오마이신으로서 35mg, 35,000 I.U.)

폴리믹신B황산염(KP)..... 35,000 I.U.

니스타틴(USP)..... 100,000 I.U.

첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸 0.12mg, 파라옥시벤조산프로필 0.03mg

첨가제(타르색소): 황색203호

【성상】 : 미황색의 내용액을 함유한 유백색 타원형 연질캡슐형 질좌제

【효능·효과】 : 질칸디다증 및 비특이성 세균성질염에 대한 국소 치료

【용법·용량】 : 1일 1캡슐을 12일간 저녁에 사용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약 성분에 과민반응 환자

2) 곤돌, 질내 피임용격막을 사용하는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 살정제를 사용하는 환자

3. 이상반응

1) 접촉성 알레르기성 습진이 나타날 수 있으며 특히 장기간 사용시 자주 나타난다. 때때로 점막자극과 드물게 과민반응이 나타날 경우

에는 사용을 중지한다.

2) 대두유로 인한 과민반응이 일어날 수 있다.

4. 일반적 주의

1) 신장 및 청각 등에 대해 전신적 독성을 일으킬 수 있으므로 단기간 사용하는 것이 바람직하다.

2) 신부전 환자 또는 2차 전신 독성이 나타난 환자에는 투여하지 않는 것이 바람직하며 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단

되는 경우에만 사용한다.

3) 항생물질 또는 그 유사 제제를 사용시 과민반응이 생기는 경우에는 이 약 사용을 특히 주의한다.

4) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소기간만 투여 한다.

5. 상호작용

1) 이 약은 곤돌, 질내 피임용격막과 같은 라텍스 또는 고무제품을 약화시킬 수 있으므로 주의한다.

2) 이 약은 살정제의 피임력을 약화시킬 수 있으므로 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 동물 실험에서 이 약의 최기형성에 대한 증거는 확인되지 않았다. 임상적으로 특정한 기형 혹은 태아독성에 대한 데이터는 확인되지 않았지만, 임부 또는 임신할 가능성이 있는 여성에 대한 실험은 충분치 않으므로 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

2) 수유부에서 약물 이행에 대한 데이터가 없으므로 수유부는 이 약을 사용하지 않는다.

7. 적응상의 주의

1) 이 약은 질에만 사용하고 내복용으로는 사용하지 않는다.

2) 생리기간 중에도 치료를 중단하지 않는다.

【저장방법】 : 기밀용기, 25℃ 이하 보관

【포장단위】 : 12캡슐

【제 조 원】 : 삼진제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52(제조의뢰자)

콜마파마(주) - 충청북도 제천시 바이오밸리2로 93 (제조자)

※ 의사·약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 본제품은 흡습성이 우려되므로 PTP포장 상태로 조제하여 주십시오.

※ 방습을 위해 사용직전까지 포장상태를 유지하는 것이 좋습니다.

※ 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2017년 03월 22일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나

소비자상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인할 수 있습니다.

※ 제품의 유효기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.



판매원
삼진제약주식회사

본사 : 서울특별시 마포구 외우산로 121 (서교동)

공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52

☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031)353-1712/6