

휴니즈에페리손염산염정

Huniz Eperisone Hydrochloride

- * 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- * 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- * 의약품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

에페리손염산염(KP) 50mg

【성상】

흰색의 원형의 당막정제

【효능·효과】

- 근골격계질환에 수반하는 동통성 근육연축: 경관완중후군, 건관절주위염, 요통
- 신경계 질환에 의한 경직성 마비: 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌·척수종양 포함), 외상후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 측색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 아급성 척수시신경병변, 기타의 뇌척수질환

【용법·용량】

성인: 에페리손염산염으로서 1회 50mg 1일 3회 식후에 경구 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 약에 과민증 환자
 - 2) 중증의 근무력증 환자
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 악물과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있다)
- 부작용
 - 1) 속: 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 2) 간장: 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 3) 신장: 드물게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 4) 혈액: 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 5) 과민증: 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있다.
 - 6) 정신신경계: 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지떨림 등이 나타날 수 있다.
 - 7) 소화기계: 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드물게 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있다.
 - 8) 비뇨기계: 드물게 요폐, 요실금, 잔뇨감이 나타날 수 있다.
 - 9) 전신증상: 때때로 무력감, 비물거림, 전신전태감, 드물게 어지러움, 근긴장저하 등이 나타날 수 있다.
 - 10) 기타: 때로 안면홍조, 드물게 발한, 부종이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 1) 이 약 투여중에 무력감, 비물거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 감광 또는 투여를 중지한다.
 - 2) 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계 조작을 하지 않도록 주의한다.
- 상호작용
이 약의 유사약품인 톨페리손염산염과 메토카르바몰을 병용시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 - 2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단한다.
- 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).
- 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

【저장방법】

밀폐용기, 실온보관

【포장단위】

30, 500 정

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 작성일 이후 변경된 내용은 '온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)'을 참조하십시오.

작성연월일: 2015. 06. 22
EPAIK1506

제조사:

대우제약(주)

부산광역시 사하구 대대로 153

제조의뢰자:

(주)휴니즈

부산광역시 강서구 녹산산단 165로 22

소비자 상담실(반품 및 교환처): 080-608-7000

Huniz