

고지혈증 치료제

아토틴엠정 10mg/20mg

(아토르바스타틴칼슘삼수화물)

고지혈증 치료제 아토틴엠정 10mg/20mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분

아토르바스타틴칼슘삼수화물(USP) ……………	10.85mg
(아토르바스타틴(10))로서 10 밀리그램)	
• 아토틴엠정20mg	
아토르바스타틴칼슘삼수화물(USP) ……………	21.7mg
(아토르바스타틴(10))로서 20 밀리그램)	

- 기타첨가제

미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이헥셀(03B28796), 저지환도 하이드록시프로필셀룰로오스, 칭강탄산칼슘, 콜로이드성인산수화소, 크로스카멜로 오스나트름, 폴리소르베이트50, 히드록시프로필셀룰로오스

【성 성】 현색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음의 심장혈관 질환에 대한 위험성감소
 - 관상동맥 심장 질환에 대한 임상적 증거는 없으나, 관상동맥 심장 질환의 다중 위험요소(55세 이상, 흡연, 고혈압, 낮은 HDL-콜레스테롤치 또는 조기 관상동맥 심장 질환의 가족력 등)가 있는 성인 환자의
 - 심근경색증에 대한 위험성 감소
 - 뇌졸중에 대한 위험성 감소
 - 혈관재색소 및 만성 안정형 협심증에 대한 위험성 감소
 - 관상동맥 심장 질환에 대한 임상적 증거는 없으나, 관상동맥 심질환의 다중위험요소(암피병증, 알부민노, 흡연, 또는 고혈압 등)가 있는 제2형 당뇨병 환자의
 - 심근경색증에 대한 위험성 감소
 - 뇌졸중에 대한 위험성 감소
 - 관상동맥 심장 질환에 대한 임상적 증거가 있는 성인 환자의
 - 비지밀적 심근경색증에 대한 위험성 감소
 - 치명적 및 비지밀적 뇌졸중에 대한 위험성 감소
 - 혈관재색소에 대한 위험성 감소
 - 울혈성심장으로 인한 입원에 대한 위험성 감소
 - 심장증에 대한 위험성 감소
- 고지혈증
 - 원발성 고콜레스테롤혈증(이형전환 가족형 및 비가족형) 및 혼합형 이상지질혈증(Fredrickson Type IIa 및 IIb형) 환자의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질, 트리글리세라이드 수치를 감소시키고 HDL-콜레스테롤치를 증가시키는 식이요법의 보조제
 - 식이요법에 적절히 반응을 하지 않는 원발성 이상베타리포프로테인혈증(Fredrickson Type III)
 - 혈청 트리글리세라이드가 상승된 환자(Fredrickson Type IV)의 식이요법보조제
 - 동형전환 가족형 고콜레스테롤혈증 환자의 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤을 감소시키기 위해 다른 지질저하제(예, LDL-apheresis)와 병용하거나, 다른 지질저하제로의 치료가 불가능한 경우
- 식이요법에 도달 불구하고 여전히 아래의 기준에 해당하는 이형전환 가족형 고콜레스테롤혈증을 가진 10 ~ 17세의 소아환자(여성의 경우 초경 이후의 환자의 총콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백질 수치를 감소시키는 식이요법의 보조제 가, LDL-콜레스테롤이 여전히 190 mg/dL 이상 (≥ 190 mg/dL) 이거나, LDL-콜레스테롤이 여전히 160 mg/dL 이상(≥160 mg/dL) 이고, 조기 심장혈관 질환의 가족력이 있는 경우 또는 해당 소아환자에서 두 가지 이상의 다른 심장혈관 질환의 위험인자가 있는 경우

【용법·용량】

아토르바스타틴을 투여한 뒤 투여중인 환자는 표준 콜레스테롤 저하식을 하여야 하며, 하루 중 아무 때나 음식물과 상관없이 투약할 수 있다.

- 고지혈증
 - 권장 초회 용량은 1일 1회 아토르바스타틴으로서 10 mg이나, 더 많은 LDL-콜레스테롤치 감소가 요구되는 환자의 경우 1일 1회 20 mg 또는 40 mg(45 % 이상의 LDL-콜레스테롤치 감소가 요구되는 경우에도)으로서 시작할 수 있다. 이 약은 1일 1회 10 ~ 80 mg의 용량범위로 투여한다.
 - 이 약의 초회용량 및 유지용량은 치료목표 및 반응 등을 고려하여 환자의 특성예에 따라 개별화되어야 하며, 투여시작 및/혹은 용량적정 후, 2 ~ 4주간의 치료수치들을 분석하고, 이에 따라 용량을 조정해야 한다.
 - 치료의 목표는 LDL-콜레스테롤치를 저하시키는 것이므로, 치료의 시작 및 치료 반응 평가시 LDL-콜레스테롤치를 이용하는 것을 권장한다. 다만, LDL-콜레스테롤 수치를 이용할 수 없는 경우에는 치료반응을 모니터링하기 위해 총 콜레스테롤 수치를 사용할 수 있다.
 - 동형전환 가족형 고콜레스테롤혈증 환자
 - 이 약의 투여용량은 1일 1회 10 ~ 80 mg으로, 다른 지질저하 치료법(예, LDL apheresis)과 병행하거나, 이런 지질저하 치료법이 불가능한 경우에 이 약을 투여한다.
 - 이형전환 가족형 고콜레스테롤혈증 소아환자(10 ~ 17세)
 - 권장 초회용량은 이 약으로서 1일 10 mg이며, 권장 최대용량은 1일 20 mg이다(소아 환자군에서 이 약 20 mg보다 고용량을 투여한 임상자료는 없다.). 투여용량은 개개의 환자에서 권장되는 치료목표에 따라 적절히 증감한다. 용량은 4주 또는 그 이상의 간격을 두고 조절하여야 한다.
- 신장에 영향 :
 - 심장질환은 아토르바스타틴의 혈장농도나 LDL-콜레스테롤을 저하효과에 영향을 미치지 않으며 용량을 조절할 필요가 없다.
- 고령자 :
 - 70세 이상의 고령 환자군에 대한 유효성과 안전성은 보통 성인 환자군의 경우와 유사하다.

【사용상의 주의사항】

- 경고
 - 현저한 크레아틴키나아제(CK) 레벨 상승이 나타나거나 근육병증으로 진단되거나 의심되는 경우 아토르바스타틴 치료를 중단해야 한다. 또한 급성 및 심각한 가 여겨지는 근육병증 또는 횡문근융해증에 이차적으로 신부전으로 발전할 수 있는 위험요소(예, 중증 근육감염, 저칼슘, 저산소성, 외상, 중증 대사, 내분비, 간해질 장애 및 제외되지 않는 간질)를 갖는 환자는 아토르바스타틴 치료를 일시적으로 보류 또는 중단해야 한다(‘일반적 주의 근육병증/횡문근융해 참조’).
- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 - 활동성 간질환 환자 또는 혈청 아미노전달효소치의 상승이 정상상한치의 3배 이상 상승된 환자
 - 간질환 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 - 10세 미만의 소아
 - 글루테라케라비 및 피브렌타비르를 투여 중인 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 알코올 중독자 또는 간질환의 병력이 있는 환자(‘이상반응’항 참조)
 - 2) 다음과 같은 횡문근융해에 대한 소인이 있는 환자에 대해서는 투여를 시작하기 전에 CK 수치를 측정하여 신중히 투여해야 한다.
 - 신기능 손상 또는 신장애 병력이 있는 환자
 - 간상생가능저하자 환자
 - 중간성 근육이성의 개인병력 또는 가족력이 있는 환자
 - 스타틴 계열이나 피브레이트(fibrate)계열 사용시 근육 독성의 병력이 있는 환자
 - 3) 간질환의 병력 또는 상당량의 알코올을 섭취하는 경우
 - 4) 70세를 초과하는 고령자로 횡문근융해의 소인이 있는 환자
- 이상반응
 - 1) 아토르바스타틴은 일반적으로 내약성이 좋다. 이상반응은 대체로 경미하고 일시적이다. 이 약과 연관된 이상반응으로 인하여 임상시험 중 투여를 중단한 사례는 2 % 미만의 환자에서 발생하였다. 아토르바스타틴에 대한 위약 대조 임상시험에서 16,066명의 환자가 이 약 투여군 8,755명 대 위약 투여군 7,311명) 가 중앙값 53주의 기간 동안 약물을 투여 받았으며, 위약 투여군의 4.0 %와 아토르바스타틴 투여군의 5.2 %에서 이상반응으로 인해 투여를 중단하였다.
 - 2) 임상시험 및 시판후 조사에 기초하여 이 약의 이상반응은 다음과 같다. 이상 반응에 대한 발현빈도는 다음과 같다. : 매우 자주(≥ 1/10), 자주(≥ 1/100, <1/10), 때때로(≥ 1/1,000, <1/100), 드물게(≥ 1/10,000, <1/1,000), 매우 드물게(<1/10,000)
 - (1) 전신: 때때로 무력감, 권태감, 가슴통증, 말초부종, 피로, 발열
 - (2) 감염: 자주 코인두염
 - (3) 대사계: 자주 고혈당증, 때때로 저혈당증, 체중증가, 식욕부진
 - (4) 소화기계: 자주 변비, 복부팽만감, 소화불량, 구역, 설사, 때때로 복통, 구토, 트림, 헛배증

- 호흡기계: 자주 인두 · 후두 통증, 코피
- 정신계: 때때로 불면증, 악몽
- 신경계: 자주 두통, 때때로 어지러움, 지각이상, 감각저하, 미각이상, 기억상실, 드물게 말초신경병증
- 근골격계 및 결합조직: 자주 근육통, 관절통, 사지통, 근 · 골격계 통증, 근육경련, 관절종창, 등통증, 때때로 목통증, 근육파열, 파열에 의한 합병증, 드물게 근육병증, 근육염, 횡문근융해, 힘줄장애, 근육파열, 매우 드물게 루푸스양 증후군, 빈도불명-면역매개성 과다성 근육병증
- 혈액 및 림프계: 드물게 혈소판감소증
- 면역계: 자주 알레르기 반응, 매우 드물게 아나필락시스
- 간 · 담도계: 때때로 간염, 드물게 담즙정체, 매우 드물게 간부전
- 눈: 때때로 시야흐림, 드물게 시각장애
- 귀: 때때로 이명, 때때 드물게 청력소실
- 피부 및 피하조직: 때때로 두드러기, 피부발진, 가려움, 탈모, 혈관부종, 드물게 혈관신경성 부종, 다형홍반을 포함한 물집피부염, 피부접막만종증, 쿤스틴슨-존슨 증후군, 독성피피피사용해리델증후군
- 생식기계: 매우 드물게 여성형 유방
- 검사: 자주 간기능 검사이상, 혈중 CK 증가, 때때로 요상 백혈구 양성
- 아토르바스타틴 위약대조 임상시험 중 다음과 같은 추가 이상반응이 나타났다. 아래에 기술된 모든 이상반응이 아토르바스타틴과 인과관계가 있는 것은 아니다.
 - (1) 정신계: 악몽
 - (2) 눈: 시야 흐림
 - (3) 귀: 이명
 - (4) 소화기계: 구토, 복부 이상, 간염, 췌장염, 담즙울체, 담즙울체성혈당, 간기능 검사치이상(혈청 ALT 수치외 상승), 위장염, 장염, 입안건조, 직장출혈, 식도염, 트림, 설염, 구강궤양, 구내염, 당낭증, 구순염, 위 · 십이지장궤양, 연하곤란, 흑색변, 치은출혈, 이금구증(배설 뒤 날개 통증)
 - (5) 호흡기계: 기관지염, 비염, 폐렴, 호흡곤란, 천식, 코피
 - (6) 신경계: 감각이상(지각이상), 말초신경병증, 한기증, 광민감반응, 졸음, 건망증, 비정상성, 섬망상상, 강장불안증, 운동협소작증, 사경, 언어마비, 과운동증, 우울증, 긴장장애
 - (7) 근골격계 및 결합조직: 근육경련, 근육파열, 근염, 근질환, 관절염, 점액낭염, 건활막염, 근육력증, 목의 통증, 건구축, CK 상승, 혈중 미오글로빈상승
 - (8) 피부 및 피하조직: 가려움, 발진, 탈모증, 접촉성피부염, 피부과진, 발한, 여드름, 두드러기, 습진, 지루, 피부부종
 - (9) 비소생식기계: 발기불능, 요로감염, 비뇨, 방광염, 혈뇨, 배뇨곤란, 신장결석, 아간노, 부고환염, 유방선유낭, 질출혈, 알부민노, 유방비대, 자궁경부 분비물, 신장염, 요실금, 요저류, 급박성, 비정상 사정, 자궁출혈, 착색소
 - (10) 대사 및 영양장애: 저혈당증, 고혈당증, 식욕부진, 식욕증진
 - (11) 전신이상 및 투여부위 이상: 권태감, 맥관질환성 부종, 홍종, 협심증, 인면 부종, 열, 경부강직, 전신부종
 - (12) 특수감각: 악시, 이명, 안구건조, 굴절이상, 안출혈, 청각상실, 녹내장, 착색소, 미각상실, 미각도착
 - (13) 혈액 및 림프계: 혈소판감소증, 백혈구감소, 빈혈
 - (14) 내분비계: 테스토스테론 저하, 코르티스테라제 상승, TSH 상승, ACTH 상승, 알도스테론 저하, 여성형 유방
 - (15) 신장: 팔통상승, BUN상승
 - (16) 기타: 뇌경색, 심계항진, 빈맥
 - (7) 검사: 소변 중 백혈구 양성
- 소아환자 (10세 ~ 17세)(아토르바스타틴정제 10, 20 mg에 해당)
 - 이형전환 가족형 고지혈증을 가진 10 ~ 17세 소아환자를 대상으로 한 6개월 동안의 임상시험에서 나타난 이상반응 프로파일은 일반적으로 위약군에서 나타난 것과 유사하였다. 약물과의 인과관계와 상관없이 양쪽 그룹 모두에서 가장 흔하게 나타난 이상반응은 감염이었다.
- 혈청 CK 수치(정상범위의 3배 이상의 증가를 받은 경우는 임상연구에서 다른 HMG-CoA 환원효소 억제제의 경우 3.1 % 발현한데 비하여 아토르바스타틴은 2.5 % 발현하였다. 정상치 상한범위의 10배 이상의 수치를 보인 경우는 아토르바스타틴 투여 환자 중 0.4 %에서 나타났다. 이 환자 중 0.1 %는 근육통, 민감감성(tenderness) 또는 쇠약증 등을 보였다.
- 국내에서 시판후 6년동안 실시한 사용성적 조사결과와 다음과 같다.
 - (1) 일반사우성적조사: 11,535명을 대상으로 실시한 시판후 조사결과 이상반응의 발현빈도율은 인과관계와 상관없이 1.78 %(205례/11,535례)로 보고되었다. 이중 시판전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응으로 과중성지방혈증 7례, 인면종증 3례, 비탄핵질소증, 고요산혈증요 각각 3례, 치은부종 1례가 보고되었다.
 - (2) 장기사용성적조사: 12주 이상 이 약을 복용한 2,625명을 대상으로 실시한 시판후 장기조사결과 이상반응의 발현빈도율은 인과관계와 상관없이 3.70 %(97례/2,625례)로 보고되었다. 이중 시판전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응으로 고요산혈증 7례, 인면종증, 저체중증, 비탄핵질소증 증가가 각각 1례씩 보고되었다.

- 일반 스타틴계열 약물과 관련하여 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.
 - (1) 정신신경계: 수면장애(불면 및 악몽 포함), 기억상실, 우울
 - (2) 호흡기계: 특히 장기투여시 간질성 폐질환과 같은 폐외적 사례
 - (3) 대사생식기계: 성적 기능이상
 - (4) 내분비계: 당뇨병: 빈도는 위험인자 존재여부에 따라 다름. (공복혈당 5.6~6.9 mmol/L, BMI>30kg/m², 중성지방수치 상승, 고혈압)
 - (5) 스타틴 사용과 관련하여 시판 후 인지기장애가 드물게 보고되었다. (예, 기억력장애, 건망증, 기억상실증, 기억장애, 혼동) 이러한 인지기장애는 모든 스타틴 계열 약물에서 보고되었다. 이러한 보고들은 일반적으로 심각하지 않고 약을 사용중단 후 가역적이다. 증상발생 시점(일~수 년) 및 증상개선(중간값이 3주)은 편차가 있다.

- 국내 자발적 유해사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - AST증가

5. 일반적 주의

- 성별 : 여성의 경우 아토르바스타틴의 농도는(C_{max}는 약 20 % 높고 AUC는 약 10 % 더 낮음) 남성과 차이가 있다. 이러한 차이점은 임상적 중요성이 없으며 남성과 여성간에 자질에 대한 효과는 임상적으로 별 차이가 없었다.
- 신부전 : 신장질환은 아토르바스타틴의 혈장농도 혹은 LDL-콜레스테롤을 저하 효과 에 영향을 미치지 않았다.
- 간부전 : 아토르바스타틴의 혈장농도는 만성 알콜성간질환(Child-Pugh Class B) 환자의 경우 현저하게(C_{max}가 약 16배, AUC가 약1배) 증가하였다.
- 간염 : 이 약의 투여 후 전격성 간염 등의 간염이 나타날 수 있으므로 구역, 구토, 권태감 등의 증상이 발생하는 경우에는 투여를 중지하고 의사에게 알려야 한다.
- 가임여성 : 이 약을 투여 받는 가임여성은 이 약물을 투여받는 동안 적절한 피임법을 사용해야 한다.
- 간질성 폐질환 : 일부 스타틴계열 약물과 관련하여 특히 장기 투여시 간질성 폐질환과 같은 이례적인 사례가 보고된 바 있다. 발현빈도는 양성으로는 호흡곤란, 비정상성 기침 및 일반적인 건강의 악화(피로, 체중감소 및 발열)가 포함될 수 있다. 환자가 간질성 폐질환으로의 발전이 의심될 경우에는 스타틴 약물 치료를 중단하여야 한다.
- 근육병증/횡문근융해 : 미오글로빈뇨에 이차적으로 급성 신부전을 동반하는 횡문근융해가 이 약 및 이 계열의 다른 약물에서 드물게 보고되었다. 신기능 부전에 대한 병력은 횡문근융해 발현의 위험인자가 될 수 있다. 이런 환자들은 골격근 효과에 대한 연밀한 모니터링이 도움이 될 수 있다. 다른 스타틴과 마찬가지로 아토르바스타틴은 때때로 CK가 정상상한치의 10 배 이상 증가와 결합된 근육통증 또는 근육약화 증상의 특징인 근육에 다터날 수 있다. 시클로스포린 및 강력한 CYP3A4 저해제(예, 클리페트라미아신, 이트라코나졸 및 HIV프로테아제 억제제)와 같은 특정한 약물과 아토르바스타틴의 고용량 병용은 근육병증/횡문근융해의 위험을 증가시킨다. 스타틴 사용과 관련된 자기면역 근육병증인 면역매개성괴사성근육병증이 드물게 보고되었다. 면역매개성괴사성근육병증은 근육근 약화 및 혈중 CK 증가가 나타나거나 스타틴 투여 중지 이후에도 그 증상이 지속된다. 또한 근육병증으로 유약한 감염을 동반하지 않는 과다성 근육병증을 보이며 면역억제제 투여 시 증상이 개선된다.
- 근육통 확산, 근긴장, 근육허약 그리고/또는 현저한 CK 상승이 있는 환자는 근육병증을 고려해야 한다. 특히 무기력 혹은 열등한 불완전 설명되지 않는 근육통, 근긴장, 근육허약이 나타나는 환자는 즉시 보고하도록 환자에게 교육하여야 한다.
- 이 계열에서 약물치료 중, 특히 근육병증의 위험은 시클로스포린, 피브린산 유도제, 에티로트라마신, 클레페트라미아신, 알비스비르, 그라조프레비르, 텔라프레비르, 보세프레비르, HIV 프로테아제 억제제 병용요법 (사쿠나비르와 리토

나비르, 로피나비르와 리토나비르, 티프라나비르와 리토나비르, 다루나비르와 리토나비르, 포소프레나비르, 포삼프레나비르와 리토나비르 포함), 니코틴산, 증가예제 항진균제와 병용투여 시 증가된다. 피브릭산유도체, 혹은 지질변화용량의 니코틴산과 아토르바스타틴의 병용투여를 고려하는 의사는 치료상의 유익성이 위험성을 상회하는지를 주의깊게 고려하여야 하고, 근육통증, 근긴장 또는 근육약(특히, 투여초기 1일 및 두 가지 약물 중 한 약물의 용량증가를 위한 적정기간)과 관련된 증상 및 증후를 주의깊게 모니터링해야 하며 아토르바스타틴의 저용량의 시작용량 및 유지용량의 감소가 고려되어야 한다. 아토르바스타틴과 퓨시드신(경구제)은 병용투여하지 않는다. 주기적인 CK치 측정 이 고려되어야 하지만, 모니터링이 심각한 근육병증의 발생을 막는다는 확신은 없다.

횡문근융해를 포함한 근육병증의 사례가 이 약과 콜카신과의 병용투여에서 보고되었고, 이 약과 콜카신과 같이 처방 시 주의가 요구된다.

- 간기능 이상 : 다른 지질저하 치료제의 마찬가지로 스타틴은 간기능의 생화학적 이상과 관련된 경우가 있다. 임상시험에서 혈청 아미노전달효소치의 계속적인 증가(정상상한치(ULN)의 3배 이상 증가가 2번이상 나타나면)가 아토르바스타틴 투여 환자의 0.7 %에서 나타났다(10 mg투여군 0.2 %, 20 mg투여군 0.2 %, 40 mg투여군 0.6 %, 80 mg투여군 2.3 %).
- 이 약 투여 후 간기능 이상, 황달, 전격성 간염, 간염 등의 이상반응이 나타날 수 있으므로 정기적으로 검사를 실시하는 등 충분히 관찰하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

치료 시작 전 간기능 검사를 해야 하며, 그 이후 임상적으로 간손상의 증후를 보이는 환자에게 경우 간기능 검사를 반복하여 실시하여야 한다. 시판후조사에서 스타틴을 투여하는 환자에서 치명적 그리고 비-치명적 간부전도 드물게 보고되었다. 이 약으로 치료하는 동안 임상적 증상과 함께 중증 간손상 증상(그리고/또는 고빌리루빈혈증 또는 황달이 나타나면)의 경우, 즉시 치료를 중단한다. 대체 병인이 발견되지 않는다면 이 약을 다시 투여하지 않아야 한다.

아토르바스타틴은 알코올남용자(과다복용자) 또는 간질환의 병력이 있는 사람의 경우 신중하게 투여하여야 한다. 활동성 간질환 환자 또는 설명되지 않는 혈청트랜스 아미나제치의 상승이 지속되는 환자에는 아토르바스타틴을 투여하지 않는다.

- 내분비 기능 : 이 약을 포함한 HMC-CoA 환원효소 저해제에서 HbA1c 및 공복 혈당 당 레벨의 증가가 보고되었다. 그러나, 스타틴제제의 투여로 인한 혈관위험의 감소의 유익성이 고혈당의 위험성을 상회한다.
- 출혈성 뇌졸중 : 관상동맥 심질환의 병력은 없으나 최근 6개월내 뇌졸중이나 일과성 허혈발작을 경험했던 4,731명의 환자를 대상으로 아토르바스타틴 80 mg을 시작용량으로 투여한 임상시험에 대한 하나의 임상시험 후 분석(post – hoc analysis)에서, 위약군과 비교하여 아토르바스타틴 80 mg 투여군에서 출혈성 뇌졸중의 발현이 높다는 보고가 있었다(아토르바스타틴 투여군 55 명 대 위약군 33명). 이는 임상시험 시작 당시 이미 출혈성 뇌졸중이 있던 환자군에서 그 위험성이 높아진 것으로 보여진다(아토르바스타틴 투여군 7명 대 위약 투여군 2명). 그러나 아토르바스타틴 80 mg 투여 환자에서 전체 뇌졸중(265명 대 311명) 발생 빈도와 관상동맥 심질환의 발병(123명 대 204명)은 위약군 보다 더 적게 나타났다.
- CK치 측정 : CK는 격심한 운동 후 또는 CK치를 증가시키는 다른 요인이 존재하는 경우 측정해서는 안된다. CK치가 기저치에서 현저히 상승한 경우, 이 레벨은 5 ~ 7일 안에 결과를 확인하기 위해 재측정해야 한다.

- 이 약 치료 중 특히 권태감 또는 발열을 동반한 근육통증, 압통 또는 근육약화가 생기면 즉시 의사에게 알리도록 해야 한다.
- 이 약 투여 중 이러한 증상이 나타날 경우 CK 레벨을 측정해야 한다. 이 레벨 이 현저히 상승한 경우(정상상한치(ULN)의 5배 초과) 치료는 중단되어야 한다. 근육중상이 이중이고 매일 불완전 경우, CK 레벨이 정상상한치 5배 이하라도 즉시 중단을 고려해야 한다.

중상이 해소되고 CK 레벨이 정상으로 돌아온 경우, 연밀한 모니터링을 하면서 이 약의 재투여 또는 다른 대체 스타틴 도입을 고려해야 한다. 이 약은 임상적으로 CK 레벨의 현저한 상승이 나타날 경우 또는 횡문근융해가 진단되거나 의심을 경우 중단해야 한다.

- 피부접막만종증(스티븐슨-존슨 증후군), 독성피피피사용해(리델증후군), 다형홍반, 피부부종만종증(스티븐슨-존슨 증후군), 독성피피피사용해(리델증후군), 다형홍반 등의 중증 발진이 나타났다는 보고가 있다. 이러한 증상이 나타나지는 경우 투여를 중단한다.
- 당뇨병 : 향후 당뇨병이 발생할 위험성이 높은 몇몇 환자들에게서 적절한 당뇨병 치료를 요하는 과혈당증을 유발할 수 있다는 몇 가지 증거가 제시되었다. 그러나 스타틴 제제의 혈당상 위험성 감소과는 이러한 위험성을 상회하도록 스타틴 치료 중단이 소위까지 될 수 없다. 위험성이 있는 환자(공복혈당 5.6~6.9 mmol/L, BMI>30kg/m², 중성지방수치 상승, 고혈압)들은 진료의침에 따라 임상적 및 실험학적 수치 모니터링을 실시해야 한다.

6. 상호작용

- 간격한 CYP3A4 억제제 : 이 약은 CYP3A4에 의하여 대사된다. 강력한 CYP3A4 억제제와 이 약의 병용은 아토르바스타틴의 혈장 농도를 증가시킬 수 있다. 상호작용 범위와 효과의 증감은 CYP3A4에 변동성 효과에 의존한다.
 - (1) 에리트로미신, 클레트리트로미아신 : 건강인의 경우 아토르바스타틴과 CYP3A4 억제제로 알려진 에리트로마이신(1일 4회 500 mg) 또는 클레트리트로마이신(1일 2회, 1일 500mg)과 병용시 아토르바스타틴 혈장농도가 증가하였다. 그러므로 클레트리트로마이신을 투여하는 환자에서 이 약 20 mg 이상을 투여하는 경우 주의하여야 한다.
 - (2) 프로테아제 억제제와의 병용: 아토르바스타틴 AUC는 이 약 단독투여와 비교하여 간염C 프로테아제 억제제 텔라프레비르와 마찬가지로 몇몇 HIV 프로테아제 억제제와 이 약의 병용 투여로 현저하게 증가되었다. 그러므로 HIV 프로테아제 억제제 티르파노비르와 리토나비르 병용요법 또는 간염C 프로테아제 억제제 텔라프레비르를 투여하는 환자에서 이 약의 병용 은 피해야 한다.

HIV 프로테아제 억제제 로피나비르와 리토나비르 병용 요법으로 투여하는 환자에게 이 약을 처방할 때 주의하여야 하고 가장 낮은 용량을 사용해야 한다. HIV 프로테아제 억제제 사쿠나비르와 리토나비르 병용요법, 다루나비르와 리토나비르 병용요법, 포삼프레나비르, 또는 포삼프레나비르와 리토나비르를 병용요법으로 투여받는 환자에서는, 이 약 용량이 20 mg을 넘어서는 인되어 주의하여 사용해야 한다.

네플리나비르를 투여받는 HIV 환자에서, 이 약의 치료는 40 mg을 제한되고, 이 약의 필요 최소 용량이 적용될 수 있게 적절한 임상평가가 권장된다. 보세프레비르 800mg, 1일 3회와 이 약 40mg, 1일 1회를 7일간 병용투여 시 이 약의 AUC, C_{max}는 각각 2.30배, 2.66배 증가하였다. 보세프레비르를 투여받는 환자는 이 약 용량이 1일 40mg을 초과해서는 안된다.

- 이트라코나졸 : 아토르바스타틴 AUC는 이트라코나졸 200 mg과 이 약 40 mg 병용 투여로 현저하게 증가되었다. 그러므로 이트라코나졸을 투여받는 환자에서 이 약 20 mg 이상을 투여하는 경우 주의하여야 한다.

- 이 약은 P-글리코프로테인의 기질이며 P-글리코프로테인의 저해제(예, 시클로스포린)와 병용투여 시 이 약의 상호작용을 증가시킬 수 있다. 간질질환과 같은 이상반응의 위험성을 증가시킨다.
- 이 약을 CYP3A4 억제제(시클로스포린, 마크로라이드계 항생제 및 아졸계 항진균제)와 투여할 경우 이 약의 혈장농도가 증가할 수 있으므로 신중하게 투여하여야 한다.
- 리파라민 또는 다른 CYP3A4 유도제 : 이 약을 CYP3A4 유도제와 병용 투여 시에, 에페비렌즈, 리파라민) 아토르바스타틴의 혈중 농도를 감소시킬 수 있다. 리파라민의 이중 상호작용의 기전 때문에(CYP3A4 유도 및 hepatocyte uptake transporter OATP1B1 억제), 아토르바스타틴과 리파라민을 병용 투여하는 경우 동시에 투여하는 것이 권장되나, 리파라민 투여 후 아토르바스타틴을 늦게 투여하면 아토르바스타틴의 혈중 농도가 유의하게 감소한다.
- 이 약과 혈압강화제 또는 혈당강화제 또는 에스트로겐 대체요법을 병용한 임상연구에서 중증으로 유익한 만한 상호작용은 관찰되지 않았다. 아직 모든 특이한 제제와의 상호작용에 대해 연구된 것은 아니다.
- 아토르바스타틴 : 아토르바스타틴과 그 대사체는 OATP1B1수송체의 기질 이다. OATP1B1 저해제(예, 시클로스포린)는 아토르바스타틴의 생체이용률을 증가 시킬 수 있다. 아토르바스타틴 10 mg과 시클로스포린 5.2 mg/kg/day와 병용투여는 아토르바스타틴의 AUC를 8.7배 증가시켰다. 아토르바스타틴을 시클로스포린과 병용투여시 아토르바스타틴의 투여용량은 10 mg을 초과해서는 안된다.
- 유방암 내성 단백질(BCRP) 억제제 : BCRP 억제제(예, 엘바스비르, 그라조프레비르)와 병용 투여 시 아토르바스타틴의 혈장 농도가 증가하여 근육병증의 위험이 증가할 수 있으므로 아토르바스타틴의 용량 조절이 필요할 수 있다. 아토르바스타틴을 엘바스비르 및 그라조프레비르와 병용 투여하는 경우 아토르바스타틴의 혈장 농도가 1.9배까지 증가한다. 따라서 엘바스비르 또는 그라조프레비르 함유제제를 이 약과 함께 투여받는 환자의 경우, 아토르바스타틴의 용량은 1일 20 mg을 초과해서는 안된다(‘상호작용 주의항 참조’).
- 디곡신 : 아토르바스타틴 10 mg과 디곡신을 일일적 상용제형 항정상태의 혈장 디곡신의 농도는 영향을 받지 않는다. 그러나 80 mg 아토르바스타틴을 디곡신과 병용하면 병용 투여 후 항정상태의 혈장 디곡신 농도는 약 20 %정도 증가되었다. 디곡신 투여 환자의 경우 적절히 모니터링하여야 한다.
- 간구피드제 : 노르에티스테론 및 에티닐에스트라디올을 함유하는 경구피임제와 이 약의 병용투여시 노르에티스테론 및 에티닐에스트라디올의 AUC가 약 30, 20 %씩 각각 증가하였다. 따라서, 아토르바스타틴을 투여받는 여성이 경구피임제 선택 시 사함을 고려하여야 한다.

- 콜레스테롤 : 콜레스테롤과 병용투여시 아토르바스타틴의 혈장농도가 약 25 %정도 낮아졌다. 그러나 이 약물들은 단독으로 투여하는 경우보다 아토르바스타틴과 콜레스테롤을 병용투여하는 경우 LDL-콜레스테롤을 저하효과는 증가하였다.
- 제산제 : 이 약과 수산화마그네슘 그리고 수산화알루미늄을 함유하는 경구용 제산제(antacid) 현탁액과 병용투여시 아토르바스타틴 혈장농도가 약 35 % 정도 감소하였다. 그러나 LDL-콜레스테롤과의 감소에는 영향이 없었다.
- 와르파린 : 아토르바스타틴과 와르파린과의 상호작용에 관한 연구가 진행되었다. 그러나 임상적으로 유의적인 상호작용은 없었다.
- 인티피딘 : 이 약과 인티피딘의 상호작용은 인티피딘의 청소율을 거의 영향을 미치지 않으므로 같은 CYP-450 동종효소를 경유하여 대사되는 인티페라의 상호작용은 기대되지 않는다.
- 아미데핀 : 시메티딘과 이 약의 상호작용연구에서 상호작용은 확인되지 않았다.
- 아지트로마이신 : 아토르바스타틴(1일 1회 10 mg)과 아지트로마이신(1일 1회 500 mg)의 병용투여는 아토르바스타틴의 혈장농도에 영향을 주지 않았다.

- 알로피딘 : 건강한 지원자에 대한 약물-약물 상호작용시험에서 아토르바스타틴 80 mg과 알로피딘 10 mg 병용투여시 아토르바스타틴의 노출이 18 % 증가하였으나, 임상적으로 의미있는 결과는 없었다.
- 테르페나딘 : 아토르바스타틴과 테르페나딘의 병용투여시 테르페나딘의 약물 동태에 임상적으로 유의적인 영향이 없었다.
- 딜티아زم : 아토르바스타틴(40 mg)과 딜티아زم(240 mg)을 병용 투여시 아토르바스타틴의 혈중 농도가 더 높게 나타났다.
- 지용주스 : 지용주스는 하나이상의 CYP3A4를 억제하는 성분을 함유하고 있으며, 이는 지용주스 섭취량이 지나칠 경우(하루 1.2 L 이상) 아토르바스타틴의 혈중 농도를 증가시킬 수 있다.
- 퓨시드신(경구제) : 비록 아토르바스타틴과 퓨시드산과의 약물상호작용에 대한 시험은 실시되지 않았지만, 이 두 약물을 병용투여한 시판 후 경험에서 횡문근융해와 같은 중증의 근육이상이 보고되었다. 이런 환자는 연밀히 모니터링하여야 하고, 아토르바스타틴 투여를 일시적으로 중단한다.
- 니코틴산 : 니코틴산과 병용하는 경우 골격근 효과의 위험이 증가될 수 있으므로 이 약의 감량을 고려해야 한다.
- 클카신 : 비록 아토르바스타틴과 클카신의 약물상호작용에 대한 시험은 수행되지 않았지만, 횡문근융해를 포함한 근육병증의 사례가 이 약과 클카신과의 병용투여에서 보고되었고, 이 약과 클카신과 같이 처방 시 주의가 요구된다.
- 전립비로질 : HMG-CoA 환원효소 억제제는 전립비로질과 병용 시 증가된 근육병증/횡문근융해 위험으로 인해, 전립비로질과 이 약의 병용은 피해야 한다.
- 기타 : 임상시험에서 아토르바스타틴은 혈압강화제 및 에스트로겐 대체요법 약물들과 임상적으로 유의한 상호작용 없이 병용투여 되었다. 특정 약물과의 약물상호작용에 대한 연구는 시행되지 않았다.
- 다른 피브레이트계 약물 : 다른 피브레이트계 약물과 병용투여했을 때 근병증 위험이 있다고 알려져 있지 때문에 주의하여 투여해야 한다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 이 약의 임신 중 사용은 금기이다. 가임여성은 적절한 피임방법을 강구하여야 한다. 이 약은 임신할 가능성이 없는 경우 및 태아에 대한 잠재적 위험성을 알려준 후에만 가임 연령의 여성에게 투여한다.
- 이 약의 수유 중 사용은 금기이다. 이 약이 모유 중으로 분비되는지에 대해서 는 알려져 있지 않다. 수유중인 유아에 이상반응이 나타날 수 있으므로, 아토르바스타틴을 복용중인 여성은 수유를 해서는 안 된다.

8. 소아에 대한 투여

- 18세 미만의 소아에 대하여 52주 이상 투여기간 동안의 안전성 · 유효성은 연구되지 않았으며, 실험관계 결과에 대한 장기적인 영향은 알려지지 않았다.
- 소아환자에 관한 약동학 자료는 없다.

9. 고령자에 대한 투여

- 65세 이상의 건강한 노인의 경우 아토르바스타틴의 혈장농도는 젊은 성인군에 비해 더 높게 나타났다(C_{max} 40 %증가, AUC 30 %증가), LDL-콜레스테롤을 저하효과는 젊은 성인군과 유사하였다.
- 고령자는 심근병증에 취약하므로, 이 약은 고령자에게 주의하여 처방해야 한다.

10. 과량투여시의 처리

아토르바스타틴 과량복용에 적용할 수 있는 특별한 처치방법은 없다. 과량복용 시 환자는 반드시 증상적으로 치료하여야 하며 필요시 대증요법을 시행하여야 한다. 간기능 검사 및 혈청 CK치를 모니터링하여야 한다. 광범위하게 혈장단백 결합을 하기 때문에 혈액투석은 아토르바스타틴의 청소율을 유의하게 증가시키지 않는다.