

프리아틸정 600mg
(아세틸시스테인)

PAT 2015.08.13-00

일반의약품
조제용
분류번호:222

프리아틸정 600mg

(아세틸시스테인)

PRIATIL Tab.

【원료약품의 분량】 이 약 1정 중

아세틸시스테인(KP) 600.0mg

동물유래성분 : 유당수화물(소,우유)

【성 상】 흰색의 장방형 정제

【효능·효과】

다음 질환에서의 객담(가래)배출곤란 : 기관지염, 기관지천식, 만성섬유증, 후두염, 부비강염

【용법·용량】

- 1) 급성질환 : 12세 이상 소아 및 성인은 1일 1회 1정을 복용한다.
- 2) 만성섬유증 : 6세 이상 소아는 1일 1회 1정을 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 12세 미만의 소아(만성섬유증은 6세 미만의 소아)
- 3) 위·십이지장궤양 환자
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

기관지 반응이 민감한 심한 천식환자

3. 부작용

- 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염(입안염), 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있다.
- 2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명(귀울림), 기관지 경련(특히 천식환자) 등이 나타날 수 있다.
- 3) 드물게 빈맥(빠른맥), 고혈압이 나타날 수 있다.
- 4) 국내 자발적 유해사례 보고자료(1989~2013 상반기)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 호흡곤란

4. 일반적 주의

장기투여 시 2주 이상의 치료 후에도 짙은 객담(가래) 형성이 줄어들지 않는다면 의사와 상의할 것.

5. 상호작용

- 1) 경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치암페니콜, 테트라사이클린, 마크로라이드계, 세팔로스포린계, 아니노글리코사이드계, 암포테리신 B)과 병용(함께 복용(사용))투여 시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다.)
- 2) 진해제(기침약)와 병용(함께 복용(사용)) 투여 시 기침반사가 억제 되며, 객담(가래)을 배출하는 생리적인 자가 기도 청소를 저해하여 기관지경련이나 기도감염을 일으킬 위험이 있다.
- 3) Glycerol trinitrate와 병용(함께 복용(사용)) 투여 시 혈관확장작용과 항혈소판응집작용이 증가될 수 있다.

6. 임부에 대한 투여

임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여한다.

7. 수유부에 대한 투여

이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

8. 적용상의 주의

- 1) 건조한 어두운 곳에 보관하고 소아의 손이 닿지 않도록 한다.
- 2) 금속과 동시 보관할 수 없으며, 산화제와 동시 보관 시 불활성화 된다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 자사포장단위

- ◆ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질·변태 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
- ◆ 이 설명서의 개정일자 2015년 08월 13일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지(www.wooridulpharm.com) 또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다.
- ◆ 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보를 참조하십시오.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
PAT 2015.08.13~00



우리들제약(주)

www.wooridulpharm.com

본사·공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50
(소비자상담실) 080-080-4211