


근육경련 및 말초혈행장애 개선제

토코토닉

연질
캡슐



[성상]

화백색의 유상물질이 들어있는 적갈색의 장방형 연질캡슐제

[원료약품 및 분량] 이 약 1캡슐(1506밀리그램) 중

산화마그네슘(KP)	250 mg(마그네슘으로서 150 mg)
토코페롤아세테이트(KP)	500 mg(비타민E로서 500 I.U)
γ-오리자놀(KP)	10 mg
피리독신염산염(KP)	50 mg
티아민질산염(KP)	50 mg

첨가제(타르색소)적색 40호, 황색 5호, 청색 1호

첨가제(동물유래성분)젤라틴(소, 가축), 숙신산젤라틴(소, 가축)

첨가제(식물유래성분)대두유(콩기름)

[효능·효과]

1. 다음경우의 비타민 E, B₆, 의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기
- 병중·병후병을 앓는 동안이나 회복 후의 체력저하시
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 비타민 E (토코페롤아세테이트)
말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족 저림·수족냉증(손발이 차가움)
- 비타민 B₆ (티아민질산염)
다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요허리)통, 어깨결림 등, 각기, 눈의 피로
- 비타민 B₆ (피리독신염산염)
다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

2. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인: 1회 1캡슐, 일 2회 복용하십시오.

[사용상 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (3) 심한 증상의 신부전 환자
- (4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- (5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- (1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- (2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- (3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- (4) 신장(콩팥)장애 환자
- (5) 저단백혈증 환자
- (6) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부)팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘) 등의 위험이 증가될 수 있습니다.
- (4) 피리독신을 일 500 mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- (5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전(부종(붓기)) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- (6) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- (7) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 일반적 주의

- (1) 자창과부호로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지 질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 자질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 자질의 양을 고려하여 그 자질제의 투여량을 감소해야 합니다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- (2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

8. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[포장단위] 자사포장단위 [저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조의뢰자]  일왕약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilwang.co.kr

[제조사] 한국프라이마제약(주) / 전복 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

- 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 첨부문서 최종 개정연월일(2015.06.02)이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 부작용보고 : 한국약물관리안전관리원(1644-6223)

설명서개정연월일 : 2015.06.02

P1510-01