

일반의약품

약효분류 : 319 기타의 비타민제

110518

하루 1정 고품량 기능성 비타민 메가바이정

메가바이정은 육체피로, 체력저하, 눈의피로, 구내염, 신경통, 근육통, 관절통, 아연의 보급 등에 효과가 있습니다.

- 하루 1정 간편하게 복용하는 고품량 기능성 비타민
- 신체 에너지 대사 활성에 필요한 비타민B군 10종 함유
- 항산화 성분(비타민C, 비타민E), 뼈 형성과 유지에 필수적인 비타민D, 면역에 도움되는 아연 함유
- 말초혈행 순화기능의 γ -오리자놀, 간 기능 개선 관련 성분인 UDCA 함유

※ 사용 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

유효성분 :

벤포타이민(활성비타민B1)(KP)	50.00mg(티아민염산염으로서 36.15mg)
리보플라빈(비타민B2)(KP)	100.00mg
니코틴아미드(비타민B3)(KP)	100.00mg
판토텐산칼슘(비타민B5)(KP)	100.00mg
피리독신염산염(비타민B6)(KP)	100.00mg
비오틴(비타민B7)(USP)	100.00 μ g
폴산(비타민B9, 엽산)(KP)	100.00 μ g
시아노코발라민1000배산(비타민B12)(KP)	100.00mg(시아노코발라민으로서 100.0 μ g)
아노시톨(비타민B)(KP)	100.00mg
콜린타르타르산염(비타민B)(USP)	100.00mg
제피아스코르브신(비타민C)(별규)	103.1mg(아스코르브산으로서 100mg)
콜레칼시페롤과립(비타민D로서 500IU)(별규)	5.00mg
20코페롤아세테이트2배산(비타민E로서10.0IU)(KP)	20.00mg
산화아연(아연으로서 15.0mg)(KP)	18.68mg
γ -오리자놀(KP)	10.00mg
우르소데옥시콜산(KP)	5.00mg

첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이탈(색소200F650003), 전분글리콜산나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 적갈색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

○ 다음경우의 비타민B1, B2, B6, C, D, E의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하, 발육기, 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기 · 눈의 피로 · 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방
- 아연의 보급

【용법·용량】 12세 이상 및 성인 : 1일 1회 1정을 식후 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 신장결석 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 고옥살산노중 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

- 심장·순환기계기능 장애 환자
- 신장장애 환자
- 저단백혈증 환자
- 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 땀, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종.
 - 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 폴산이 부족한 환자에게 비타민B12를 1일 10 μ g이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.
 - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
6. 저장상의 주의사항
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60정/병, 120정(60정/병x2)

- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>) →의약품유해사례보고에 알리도록 하십시오.
- ※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조
- ※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

부광약품주식회사

제조회자 : 부광약품(주)경기도 안산시 단원구 능안로 47
 제조자 : (유)한풍제약 전북 원주군 봉동읍 원주산단6로 301
 1층(창고), 3층, 5층, 봉동로 705

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품문의 및 궁금한 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

☛소비자 상담실: TEL 080 - 933 - 2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2018년 11월 05일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.