

082117

아티벡스[®]겔

(디클로페낙디에틸암모늄)

※ 사용 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

유효성분: 디클로페낙디에틸암모늄(BP) 11.6mg(디클로페낙나트륨으로서 10mg)
 첨가제: 경질유동파리핀, 라벤더향15P05908, 마이크로글세토스테아릴에테르, 세탄올, 이소프로판올, 정제수, 카보머, 트롤이민, 폴리에틸렌글리콜200, 프로필렌글리콜

【성상】

흰색 연질의 균질한 겔

【효능·효과】

다음 질환 및 증상의 진통·소염:

1. 건(힘줄), 인대, 근육 및 관절의 외상(상처)성 염증(뻘, 티박상 등)
2. 연조직 류마티스의 국소형(건초염(힘줄윤활막염), 어깨손증후군, 점액낭염, 관절주위염 등)
3. 류마티스 질환의 국소형(말초관절 및 척추의 골관절증 등)

【용법·용량】

12세 이상의 성인 및 청소년: 통증 부위의 면적에 따라 2-4g을 1일 3-4회 환부(질환 부위)에 바르고 가볍게 문지른다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이약을 사용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 아스피린 또는 기타의 비스테로이드성 소염(항염)진통제에 천식발작, 두드러기 또는 급성비염(코염)과 같은 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 3) 12세 이하의 소아
- 4) 임부 및 수유부

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

- 1) 병변(병에 의한 몸의 변화)이 있는 피부(출혈성 피부질환, 습진, 감염된 병변, 화상, 상처), 눈 및 점막부위에는 사용하지 않는다.
- 2) 밀봉봉대법으로 사용하지 않는다.
- 3) 피부에 손상이 있을 경우 사용하면 일시적인 자극 및 저린감을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의한다.
3. 다음과 같은 사람은 이약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 기관지 천식 환자(중증 천식발작을 일으킬 수 있다)
- 2) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자는 신중히 투여한다.
4. 다음과 같은 경우는 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지 할 것.

- 1) 면역계: 과민반응, 혈관신경성 부종(부기)이 매우 드물게 나타날 수 있다.
- 2) 호흡기계: 천식이 매우 드물게 나타날 수 있다.
- 3) 피부 및 피하조직: 때때로, 발진, 습진, 홍반(붉은 반점) 및 피부염(진축성피부염 포함)이 나타날 수 있으며, 드물게 수포성 피부염이 나타날 수 있고, 매우 드물게 광과민반응, 농포(고름물집)성 발진이 나타날 수 있다.
- 4) 이 약을 넓은 부위에 장기간 사용할 경우 전신이상반응이 나타날 수 있다.
- 5) 갑자기 과용량을 사용하여 저혈압, 신부전, 경련, 위장관불쾌감 및 호흡기능억제등의 전신 이상반응이 나타날 수 있다.
5. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
- 1) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)임에 유의한다.
- 2) 피부의 감염증을 불현성(증상이 나타나지 않음)화할 우려가 있으므로 감염을 수반하는 염증에 대해 이 약을 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균(곰팡이)제를 병용하고 충분히 관찰하여 신중히 투여한다.
- 3) 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 이 약을 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려한다. 또 환자 상태를 충분히 관찰하고 이상반응 발현에 유의한다.
- 4) 이 약 투여 2주 후에는 이 약에 대한 재검토가 이루어져야 한다.
- 5) 사용후에는 손을 깨끗이 씻는다(손가락 관절에 사용하는 경우 제외)

【포장단위】 50그램/튜브

【저장방법】 30℃이하 보관, 밀폐용기

※ 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품유해사례 보고)에 알리도록 하십시오.

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

제조·판매



부광약품주식회사

경기도 안산시 단원구 능안로 47

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 특허료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

◆ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2017년 08월 21일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.