

일반의약품
071618

약효분류 : 316 혼합비타민제(비타민AD 혼합제제를 제외)

M^{MAX}g

근육경련 및 혈액순환 개선제
연질캡슐
Magnesium

※사용 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중
유효성분 : 산화마그네슘(KP) 250mg(마그네슘으로서 150mg)
토코페롤아세테이트(KP) 500mg(비타민E로서 500IU)
γ-오리자놀(KP) 5mg
피리독신염산염(KP) 50mg
티아민질산염(KP) 50mg

첨가제(동물유래성분) : 숙신산젤라틴(기원동물 : 소, 사용부위 : 가죽), 젤라틴(기원동물 : 소, 사용부위 : 가죽)
첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색5호
기타 첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 백납, 산화티탄, 에틸바닐린, 정제수, 공기

【성상】 희백색의 유상물질이 들어있는 적갈색의 장방형 연질캡슐제

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 E, B1, B6의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능효과는 다음과 같다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기
 - 눈의 피로

2. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】 만 12세 이상 청소년 및 성인: 1회 1캡슐, 1일 2회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (3) 심한 증상의 신부전 환자
- (4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- (5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- (1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- (2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- (3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- (4) 신장(콩팥)장애 환자
- (5) 저단백혈증 환자
- (6) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리(예)보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- (4) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- (5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- (7) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 일반적 주의

- (1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈청지질치를 점검할 것을 권장한다.
이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다.
환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

8. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장 방법】

·기밀용기, 실온(1 ~ 30°C)보관

【포장단위】 10캡슐, 20캡슐, 60캡슐, 120캡슐

※첨부문서에 기재되지 않는 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리위원회(<http://drugsafe.or.kr>)
→ 의약품유해사례보고)에 알리도록 하십시오.

※온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조

※만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

부광약품주식회사

제조의뢰자: 부광약품(주) 경기도 안산시 단원구 능안로 47

제조자: 한국프라임제약(주) 전북 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

♣ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※이 첨부문서 작성일자 (2018년 07월 16일) 이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.