

맛출형 스마트 비타민

일반의약품
분류번호 319

뉴로셀렉[®]정

■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1정 중

유효성분 : 레티놀팔미테이트과립(별구)	6mg(비타민A로서 3,000IU)
니코틴산아미드(KP)	30mg
판토텐산칼슘(KP)	30mg
피리독신염산염(KP)	30mg
폴산(KP)	0.5mg
시아노코발라민1000배산(KP)	50mg(시아노코발라민으로서 50μg)
제피아스코르브산(별구)	133.3mg(아스코르브산으로서 130mg)
콜레칼시페롤과립(별구)	10mg(비타민D ₃ 로서 1,000IU)
토코페롤아세테이트2배산(KP)	100mg(비타민E로서 50IU)
산화마그네슘(KP)	24.9mg(마그네슘으로서 15mg)
산화아연(KP)	31.2mg(아연으로서 25mg)
리보플라빈(KP)	30mg
벤포타이민(KP)	30mg

첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소의 가죽, 돼지의 피부), 스테아르산마그네슘(소의 기름)

기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 크로스카르멜로오스나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, 경질수구산, 탈크, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 오파드라이AMB핑크(80W640002), 아크릴아이드MP화이트(93018508), 착색산화철, 오파그로스클리어(97W19196)

■ 성상 : 분홍색의 장방형 필름코팅정제

■ 효능 · 효과

1. 다음 경우의 비타민A, D, E, B₁, B₂, B₆, C의 보급

- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력자하
- 발육기
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

- 비타민A(레티놀팔미테이트과립)
 - 눈의 건조감의 완화
 - 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)
- 비타민D(콜레칼시페롤과립)
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방
- 비타민B₁(벤포타이민)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
 - 각기
- 눈의 피로
- 비타민B₂(리보플라빈)
 - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

2. 아연의 보급

■ 용법 · 용량 : 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

- 1) 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민A결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 영아
- 4) 신장(콩팥)결석 환자
- 5) 심한 증상의 신장(콩팥)부전 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
 - ② 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 4) 심장 · 순환기계 기능장애 환자
- 5) 신장(콩팥)장애 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 8) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- 9) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관위장차(장)장애, 소화장애, 상복부(배부)통증, 자혈안, 피부종(피부기)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 예스트로겐을 포함한 경구(먹는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 9) 장기간 고용량의 비타민A(비타민A로틴으로부터 전환된 것을 제외함) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈영양성 중) 위험을 높일 수 있다.
- 10) 할알도스테론계, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 11) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 12) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 한다.
- 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 4) 요를 황색으로 변화하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 (사용기간 : 제조일로부터 36개월)

■ 포장단위 : 60정/병, 120정(60정/병X2)

■ 첨부문서 최종 개정일 : 2017년 2월 7일

※ 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

21-6-30-E

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 ※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
 ※ 기타 문의사항은 의 · 약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.
 ※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



고려제약주식회사
경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10