

글리알포 정

(콜린알포세레이트)

전문의약품

【원료약품 및 그 분량】 1정(735.0mg) 중

유효성분 : 콜린알포세레이트(KP) 400 mg

기타첨가제 : 메타규산알루미늄산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이노란색(200F620010), 이산화규소, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 폴리에틸렌글리콜4000

【성상】

담황색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

- 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군: 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력 감소

【용법·용량】

콜린알포세레이트로서 1회 400 mg을 1일 2~3회 경구투여한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

2. 이상반응

- 1) 2차적인 도파민 작용에 기인한다고 추정되는 구역이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 투여한다.
- 2) 소화기계 : 위염, 위질한
- 3) 정신신경계 : 졸음, 불면, 적개심, 신경질, 경련, 운동과다

3. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

90정(10정/PTP×9)

【반품 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품이 발견될 경우 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 유효기한 또는 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 본 설명서 작성년월일 이후의 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://hedrug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(www.yypharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품관련 문의사항은 (주)유영제약 소비자상담실(수신자 부담전화 080-808-6114)로 문의바랍니다.

※ 부작용 피해구제 신청은 한국약품안전관리원(1644-6223) 또는 피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)으로 문의바랍니다.

본 제품은 인습성이 있으므로 PTP포장상태로 보관 및 조제하시고, 복용할 때 개봉하십시오.

설명서 작성년월일 : 2023. 02. 13
PR0552302

유영제약
YOOYOUNG PHARMACEUTICAL

제조의회사 : (주)유영제약
충청북도 진천군 광혜원면 홍소2길 33
제 조 자 : 한국프라임제약(주)
전라북도 완주군 봉동읍 완주신단9로 100