

아세텔린 캡슐

아세틸시스테인

2015.08.28

정 부 공 인
K G M P
우수 의약품 적격 업체

일 반 의 약 품
분류 번호 : 222
조제용

아 세 텔 린 캡슐 (아세틸시스테인)

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중
아세틸시스테인(KP) 200mg

[성 상] 흰색의 분말이 충전된 상, 하부 흰색의 경질캡슐

[효능·효과]

- 1. 주효능 효과
1) 다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급·만성기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 낭성섬유증
- 2) 인·후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성중이염

[용법·용량]

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여한다.

- 1. 급성질환
· 성인 : 1회 200mg 1일 3회
· 소아 : 6~14세 1회 200mg 1일 2회
- 2. 만성질환
· 성인 : 1회 200mg 1일 2회
· 소아 : 6~14세 1회 100mg 1일 3회
- 3. 낭성섬유증
· 소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회, 2~5세 1회 100mg 1일 4회
· 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

- 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약에 과민증 환자
2) 위·십이지장궤양 환자
- 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
신생아 (중증 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않는다.)
- 3. 부작용
1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있다.
2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식 환자) 등이 나타날 수 있다.
3) 드물게 빈맥, 고혈압이 나타날 수 있다.
- 4. 상호작용

경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치암페니콜)과 병용투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다).

5. 임부에 대한 투여

임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여한다.

6. 수유부에 대한 투여

이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

7. 적응상의 주의

이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 한다.

[저장방법 및 사용(유효)기한] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

[포장단위] 자사포장단위

제조의뢰자 : 케이엠에스제약(주)

제조사 : (주)한국코러스제약-충북 제천시 강저로 30

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 의약품을 사용하기 전에 사용자에게서는 설명서를 주의 깊게 읽으시고 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

* 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://kmspharm.com>)에서 확인 할 수 있습니다.

작성연월일 : 2015. 08. 28



케이엠에스제약(주)

KOREA MEDICINE STANDARD

본 사 : 경기도 수원시 영통구 신원로 232

공장/연구소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 236

대표번호 : (031)215-5456 Fax:(031)215-5925