

전립선비대증 치료제

테라엘정 2밀리그램(테라조신염산염수화물)

TPT2600D1

※ 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고 약과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량]

- 1정 중
- 유효성분 : 테라조신염산염수화물(EF) 2,374mg(테라조신(으)로서 2,0mg)
 - 첨가제(타르색소): 황색5호
 - 첨가제(동물유래): 유당수화물(소/우유)
 - 기타 첨가제 : 규산알루미늄산화규소, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 저치환도하이드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘,

[성상]
연한 주황색 내지 황색의 원형 정제

[효능 · 효과]
양성전립선비대에 의한 배뇨장애, 고혈압(경증~중등도)

- [용법 · 용량]
이 약은 다른 약물이 부적절하거나 비효과적일 경우 단독 또는 차이있게 이노제 및 다른 혈압강화제와 병용요법으로 투여할 수 있다. 음식물은 이 약의 생체내이용률에 거의 또는 전혀 영향을 미치지 않으므로 식사와 관계없이 투여할 수 있다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.
1. 양성전립선비대에 의한 배뇨장애
- 성인
 - 1) 초회량
염산테라조신으로서 초회량으로 취침전 1mg을 경구투여하며, 이 용량을 초과해서는 안된다. 초회투여로 인한 급성 저혈압 발현 가능성을 최소화하기 위하여 초회 투여의 복약상태를 신중히 관찰한다.
 - 2) 유지량
이 약으로써 증상이 개선될 때까지 천천히 증량한다. 유지량으로 1일 1회 5~10mg을 경구투여한다.
 - 3) 차이있게 이노제 및 다른 혈압강화제와 병용투여 : 차이있게 이노제 또는 다른 혈압강화제와 병용투여하는 경우에는 이 약의 용량을 감량하여 필요한 경우 증량한다. 이러한 병용투여 요법시 저혈압이 나타날 수 있으므로 신중히 관찰한다.
2. 고혈압
- 용량은 환자의 혈압반응에 따라 조절한다.
- 성인
 - 1) 초회량
염산테라조신으로서 초회량으로 취침전 1mg을 경구투여하며, 이 용량을 초과해서는 안된다. 초회투여로 인한 급성 저혈압 발현 가능성을 최소화하기 위하여 초회 투여의 복약상태를 신중히 관찰한다.
 - 2) 유지량
① 단독투여 : 유지량으로 1일 1회 2~10mg을 투여하여 아침 또는 저녁에 복용하되 계속해서 같은 시간에 투여하는 것이 바람직하다. 바람직한 혈압반응을 얻기 위해 1주간격으로 용량을 2배로 증량할 수 있다. 20mg 이상의 용량을 투여해도 더 큰 효과를 나타내지는 않으며 40mg 이상의 용량 투여에 관한 연구는 실시된 바 없다.
 - ② 차이있게 이노제 및 다른 혈압강화제와 병용투여 : 차이있게 이노제 또는 다른 혈압강화제와 병용투여하는 경우에는 이 약의 용량을 감량하여 필요한 경우 증량한다. 이러한 병용투여 요법시 저혈압이 나타날 수 있으므로 신중히 관찰한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
- 1) 이 약 또는 α-차린제에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 12세 이하의 소아
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
- 1) 중증의 간 · 신기능장애 환자
 - 2) 다음 질환으로 진단받거나 이러한 질환의 병력이 있는 환자 : 기립성 저혈압, 기절발작, 의식상실, 심근관색, 뇌혈관장애, 초회량 투여후 30~90분에 실신이 나타난 예가 있으며, 때때로 급하게 증량할 경우에 나타난 예가 있다. 실신하면 환자를 앙와위로 한 후 필요하면 보조요법을 실시한다. 이러한 이상반응은 자기제어약이어서 대개의 경우 초회투여후 또는 그 이후 증량 도중에 재발하지 않는다.
 - 3) 이 약은 황색호(셋셋ellow FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 이상반응

일반적으로 이 약 투여와 관련된 이상반응은 경증 내지 중등도이다.

- 1) 다른 α-차린제와 마찬가지로 이 약은 실신을 일으킬 수 있다(임상발현율 : 약 1%). 때때로 실신은 심박수 120~160회/분의 빈맥의 발작이 전체가 되는 경우도 있으나 대개의 경우 과도한 기립성 저혈압에 의한 것으로 생각된다. 초회량 투여후 30~90분에 실신이 나타난 예가 있으며, 때때로 급하게 증량할 경우에 나타난 예가 있다. 실신하면 환자를 앙와위로 한 후 필요하면 보조요법을 실시한다. 이러한 이상반응은 자기제어약이어서 대개의 경우 초회투여후 또는 그 이후 증량 도중에 재발하지 않는다.
- 2) 이 약을 40mg까지 과량투여받은 환자에서 일반적으로 어지러움, 메스카질림, 말초성 부종이 나타났다. 대부분 이 이상반응은 지속적인 요법으로 소실되거나 감량하지 않아도 내약되었다.
- 3) 정신신경계 : 우울, 신경과민 때때로 어지러움, 두통, 관대감, 무력감, 발한, 불면, 냉감, 어계결림, 드물게 졸음, 구갈, 비만감 등이 나타날 수 있다.
- 4) 순환기계 : 빈맥, 혈관확장, 때때로 기립성 조절장애, 심계항진, 부종, 부정맥(기외수축, 심방세동 등), 흉통, 드물게 협심증, 빈맥 등이 나타날 수 있다.
- 5) 간장 : 때때로 AST · ALT · ALP · 총빌리루빈상승이 나타날 수 있다.
- 6) 소화기계 : 소화불량, 복부팽만감, 배탈, 때때로 복통, 설사, 변비, 구갈, 구토, 드물게 식욕부진 등이 나타날 수 있다.
- 7) 호흡기계 : 코피, 인플루엔자 증상(flu symptom), 인두염, 비염, 호흡곤란, 감기증상, 비출혈, 기침증가, 부비강염 등이 나타날 수 있다.
- 8) 비뇨기계 : 때때로 빈뇨, 드물게 요실금(예경기 이후의 여성), BUN, CPK상승 등이 나타날 수 있다.
- 9)감각기계 : 감각이상, 균형장애, 시각장애, 약시, 결막염, 이명 등이 나타날 수 있다.
- 10) 피부 : 수분저류, 드물게 부종 등이 나타날 수 있다
- 11) 과민증 : 때때로 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 12) 기타 : 체중증가, 감작, 관절증상, 관절쇠약, 근육통, 상목감퇴, 발한, 발기부전, 음경지속발기, 혈소판감소, 때때로 흉통, 코막힘, 코막힘, 숨막힘감, 눈의 위화감, 가려움 등이 나타날 수 있다. 또한 때때로 항핵항체(ANA)양성이 나타날 수 있다.
- 13) 시판후 경험 : 드물게 이 약의 투여 후 아나필락시스를 포함한 일러지 반응이 관찰되었다. 시판후 조사 동안 자살발기증, 저혈소판증, 심방세동이 보고되었다. 또한 백내장 수술시 α-차린제 투여와 관련하여 '수술 중 동

체이완 증후군'으로 알려져 있는 작은 동공 증후군의 병형이 보고되었다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약의 초회투여 또는 투약누락 후 요법재개와 관련하여 어지러움, 가벼운 두통감, 기립성 조절장애, 심계항진, 두통, 졸음이 나타날 수 있으므로 환자에게 이러한 이상반응 및 그것이 발생할 수 있는 상황에 관해 주의시킨다.
- 2) 투여초기 또는 용량을 증강하는 경우에 혈압강화작용에 의한 어지러움, 기립성 조절장애 등이 나타날 수 있으므로 고소작업이나 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계작업을 하지 않도록 주의한다.
- 3) 누운 자세나 앉은 자세로 부터 빨리 일어설 때 어지러움, 가벼운 두통감, 기절이 나타날 수 있으므로 환자에게 그 기능성에 관해 주의시키고 이러한 증상이 나타나면 누운 다음 재발을 막기 위해 일어시기 전에 수분간 앉아 있도록 지시한다.
- 4) 이 약은 전립선비대에 의한 배뇨장애의 대증요법으로 이 약의 투여에 의해 효과가 나타나지 않는 경우에는 수술 등 다른 적절한 처치를 한다.
- 5) 양성 전립선 비대증과 전립선암은 유사한 증상을 나타내고 함께 발병하기 쉬우므로 이 약으로 양성 전립선 비대증을 치료하기 전에 전립선암의 발생 여부를 확인해야 한다.
- 6) α-차린제를 복용하고 있거나 이전에 복용했던 일부 환자에서 백내장 수술을 하는 동안 '수술 중 황체이완증후군'(intraoperative Floppy Iris Syndrome, IRS)이 관찰되었다. 따라서 안과의는 수술시 황체 후(iris hook), 홍채 확장 고리(iris dilator ring) 또는 점탄성물질(viscoelastic substance) 등 주로 사용하는 수술방법에 있어서 가능한 수술 방법의 변화를 준비해야 한다.

5. 상호작용

- 1) 다음 약물과 뚜렷한 상호작용 없이 투여되고 있다.
- ① 진통소염제(아세트아미노펜, 아스피린, 인도메타신, 이부프로펜, 페니부타존, 덱스트로프로폭센, 톨레탄)
- ② 강심배당체(디곡신)
- ③ 혈압강화제(클로로프로파마이드, 인슐린, 톨라지미드, 톨부타미드)
- ④ 부정맥용제(프로카인아미드)
- ⑤ 항불안약, 진정제(클로라제페이트, 클로디아제페시드, 디아제팜, 플루라제팜)
- ⑥ 통풍약(알로푸리놀, 프로베네시드)
- ⑦ 항생물질(암피실린, 에리스로마이신, 페니실린, 테트라사이클린, 트리메토프림, 설파메톡사졸)
- ⑧ 호르몬, 스테로이드제제(에스트로겐제제)
- ⑨ 항히스타민제(클로르페니라민)
- ⑩ 심혈관약물(아테놀올, 히드로클로로티아지드, 메틸글로코티아지드, 프로프라놀롤)
- ⑪ 항콜린성교신경효능약(페닐레프린, 페닐프로판올아민, 히드록로라이드, 슈도에페드린)
- ⑫ 위장관약(제산제)
- 2) 혈압강화제와 병용투여하는 경우에는 혈압강화작용이 증가될 수 있다.
- 3) 배라파밀과 병용투여하는 경우에는 상호작용이 증가될 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 동물실험에서 기형발생이 나타나지 않았으나 사람에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치 · 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 동물실험(랫트)에서 모유중으로의 이행이 보고되어 있으므로 수유중에는 투여를 피하고 부득이한 경우에는 수유를 중단한다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되지 않았다(사용경험이 없다.).

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서의 과도한 혈압강화는 바람직하지 않으므로(뇌경색 등이 나타날 수 있다.) 저용량(1회 0.25mg 1일 2회)에서 투여를 시작하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.

9. 임상검사치에의 영향

이 약을 장기간 투여하여도 다음의 실험실검사 검사치에는 임상적으로 유익성 있는 변화가 없었다. : 포도당, 요산, 크레아티닌, 요소, 간기능검사, 전해질, 혈액학적 검사치

10. 과량투여시의 처치

이 약의 투여로 급성 저혈압이 나타날 경우에는 심혈관계 보조요법이 가장 중요하다. 환자를 앙와위로 누워 혈압이 회복되고 심박수가 정상화될 수 있다. 만일 이러한 처치가 부적절할 경우에는 우선 체액증량제로 속을 치료한 후 필요하면 혈관수축제를 투여할 수 있다. 신기능을 검사하고 필요에 따라 일반적인 보조요법을 실시한다. 이 약은 단백결합력이 높으므로 투석은 효과가 없다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것

12. 기타

- 1) 수컷 랫트에게 고용량으로 장기 투여시 종양이 생성되었으나 마우스를 대상으로 한 유사한 시험에서는 이러한 증상이 없었다. 사람에 대한 이러한 증상과의 관련성은 알려진 바 없다.
- 2) 유사화합물(염산프로자신)에서 신장 부위의 동맥혈착, 다리부위의 동맥류 등의 혈관장애가 있는 고혈압 환자에서 급성 혈성 대발성 관절염이 나타났다는 보고가 있다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[사용기한] 외부 포장 참조

[포장단위] 30정/병, 300정/병

▶ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.	
▶ 의약품용 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.	
▶ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다.	
▶ 최신의 정보로 변경된 내용은 지엘파마(주) 홈페이지(https://www.glpharma.co.kr)나 개발학술팀(☎ 080-850-3922)에서 확인할 수 있습니다.	
▶ 본 의약품은 엄격한 품질관리(KGMP)를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.	
첨부 문서 작성일자 : 2026년 06월 30일	

의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국약약품안전원에 할 수 있습니다.

신청방법

☎ 1644-6223, 14-3330 | karp.drugsafe.or.kr

신청대상

의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족

신청방법

사망일시보상금, 장례비, 장애일시보상금, 진료비

[제조자]
한국유니온제약㈜ 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막공단길 247 A동 1층, 2층, C동, D동(시흥동) 2층, 3층, E동(안제보관소)

[제조/외지자]
지엘파마㈜ 경기도 안양시 만안구 시민대로 35