

활성비타민 · 항산화제 함유
고함량 기능성 신경 비타민

파워비타비백^정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

벤포티아민(KP).....	50.00 mg
티아민질산염(KP).....	2.00 mg
리보플라빈(KP).....	100.00 mg
니코틴산아미드(KP).....	100.00 mg
판토텐산칼슘(KP).....	108.70 mg
피리독신염산염(KP).....	100.00 mg
비오틴(USP).....	0.10 mg
폴산(KP).....	0.10 mg
시아노코발라민1000배산(시아노코발라민으로서 100.0μg)(KP).....	100.00 mg
아스코르브산(KP).....	100.00 mg
유비데카레논(KP).....	10.00 mg
이노시톨(KP).....	100.00 mg
콜린타르타르산염(USP).....	100.00 mg
γ-오리자놀(KP).....	10.00 mg
산화아연(아연으로서 25mg)(KP).....	31.20 mg
산화마그네슘(마그네슘으로서 12mg)(KP).....	20.00 mg

[성상] 갈색의 타원형 필름코팅정

[효능 · 효과]

1. 다음경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C 의 보급

- 육체피로 - 임신 · 수유기 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기 · 눈의 피로

2. 아연의 보급

[용법 · 용량] 12세 이상 어린이 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 젖먹이 3) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자 6) 신장(콩팥) 장애 환자 7) 저단백 혈증 환자 8) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자 9) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우-구역, 구토, 설사, 묽은 변, 붉은 반점, 부전 수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관(창자)장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 저혈압, 폐부종(부기) 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다. 3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다. 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다. 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다. 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장 증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용[함께복용(사용)]투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 8) 우발적으로 과량복용 한 경우 9) 1개월 정도 복용 하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여하십시오. 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다. 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다. 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 자사포장단위

[소비자상담실] 080-021-3131

※ 자세한 사항은 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

첨부문서 작성일 : 2015년 10월 30일

[제조원] 한풍제약

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301

[판매원]



케미칼 에스케이케미칼(주)
Life Science Biz. 경기도 오산시 남부대로 430-11