

일반 의약품

기타의 비타민제(39)

"생약성분"이 가미된

"고함량 기능성비타민"

비타허브[®]
VITAHERB10종 비타민B군, 비타민C, 비타민E(100IU), 아연, 마그네슘
+ 3종 생약성분(당귀, 작약, 천궁)

혈액순환
에너지
근육강화
관절건강
눈건강

【원료약품 및 그 분량】 1정(1,100mg)중

시아노코발라민 1000배산 (시아노코발라민으로서 50μg) (KP)	50.00mg
리보플라빈 (KP)	50.00mg
폴산 (KP)	0.25mg
제피아스코르브산 (아스코르브산으로서 50mg) (별규)	54.643mg
산화마그네슘 (마그네슘으로서 30.15mg) (KP)	50.00mg
산화아연 (아연으로서 15.0mg) (KP)	18.70mg
피리독시닐아민 (KP)	50.00mg
니코틴아미드 (KP)	50.00mg
판토텐산칼슘 (KP)	50.00mg
벤포티아민 (KP)	50.00mg
비오틴 (USP)	0.25mg
폴리타르타르산염 (USP)	50.00mg
이노시톨 (KP)	50.00mg
우르소데옥시콜산 (KP)	5.00mg
γ-오리지놀 (KP)	2.50mg
토코페롤이세테이트 2배산 (비타민E로서 100IU) (KP)	200.00mg
셀레늄함유건조효모 (셀레늄으로서 25μg) (KP)	25.00mg
당귀 (KP)	10.00mg
작약 (KP)	10.00mg
천궁 (KP)	10.00mg

【성상】 적갈색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음경우의 비타민 (E, B1, B2, B6, C)의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
- 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기
- 눈의 피로
- 말초혈행장애 및 경련기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

2. 아연의 보급

【용법·용량】 12세 이상 어린이 및 성인 1일 1회, 1정 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (3) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 안산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)

- (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- (4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- (5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- (6) 신장(콩팥)장애 환자
- (7) 저단백혈증 환자
- (8) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- (9) 임부(임신부)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 위부(상복부)불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 붉은 변, 붉은반점, 부전수축(심장 박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡기 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- (5) 피리독신을 일일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초 신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- (6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 일일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- (7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체 의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- (8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (9) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용(함께 복용) 투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- (10) 우발적으로 과량 복용 한 경우
- (11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- (3) 복용시 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- (4) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- (5) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.
- (6) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 60정/병, 60정/병X2

※ 자세한 사항은 첨부문서 및 식품의약품안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변패·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회고시 소비자분쟁기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

첨부문서작성일 2017. 5월

제 조 한풍제약

전북 완주군 봉동읍 완주산업로301 및 봉동로 705

고객상담실 02.521.2618
 www.hanpoong.co.kr