

쿨키드 크림

벌레물림, 가려움, 염피, 습진

20g 유·소아(전 연령) 사용 가능

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

글리시리진산이칼륨(KP)	5mg
디펜하이드라민(KP)	10mg
덱스판테놀(USP)	10mg
토코페롤아세테이트(KP)	10mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	1mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필(KP)	1mg

【성 상】 흰색의 크림제

【용법 · 용량】 1일 수회(여러 차례) 환부(질환 부위)에 적당량을 도포한다(바른다).

【효능 · 효과】 습진, 피부염, 염피, 옷 등에 의한 피부염, 가려움, 벌레물림, 두드러기, 동창(언 상처)

【사용상의 주의사항】

1. 이 약은 다음의 신체 부위에는 사용하지 말 것.

- 1) 눈 또는 눈주위, 점막 등
- 2) 습진, 상처부위, 민감한 피부

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 사람
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 3) 습윤(습기 참)이나 짓무름, 염증이 심한 사람
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 5) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자는 신중히 투여할 것.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고, 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 사용으로 인해 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기) 등의 증상이 나타나는 경우
- 2) 5 ~ 6일간 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 지킬 것.
- 2) 소아에 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 사용할 것.
- 3) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복 또는 흡입하지 말 것.
- 4) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 눈에 들어간 경우에는 물로 씻을 것. 증상이 심한 경우에는 안과 의사의 치료를 받을 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 4) 사용기간이 지난 제품은 사용하지 말 것.
- 5) 시계, 안경 등의 플라스틱류, 도장이 되어 있는 마루, 가구 등에 접촉 시 변질될 수 있으므로 닿지 않게 주의할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 10g, 15g, 20g, 30g

* 본 의약품은 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.

* 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

* 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

* 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

☎ 소비자상담전화 : 080-300-8282

첨부문서개정연월일 : 2016. 12. 20

제조 · 판매자
태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
충청남도 부여군 초촌면 금백로 821

M110139-02