

102618

광범위 통증치료제

익스펜 캡슐

아세트아미노펜, 카페인무수물

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

유효성분: 아세트아미노펜(KP) 300.0mg
 카페인무수물(KP) 25.0mg

첨가제(동물유래성분): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 젖)

기타 첨가제: 스테아르산마그네슘, 캡슐

【성상】 흰색의 분말이 든 상, 하부 흰색의 경질캡슐

【효능·효과】

- 1) 두통, 치통, 발치후 통증(통증), 인후통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 건통(아계결림), 타박상, 골절통, 염좌통(뻘뻘증), 월경통(생리통), 외상통의 진통
- 2) 오펜(출고 펄라는 증상), 발열시의 해열

【용법·용량】

1일 3회까지 공복(반식) 시를 피하여 복용한다.

복용간격은 4시간 이상으로 한다.

만 15세 이상 및 성인: 1회 1캡슐

만 11세 이상·만 15세 미만: 1회 2/3캡슐

만 7세 초과·만 11세 미만: 1회 1/2캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기와 복용시 천식을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이) 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

다른 해열진통제, 감기약, 진정제

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것

1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것) 2) 만 3개월 이상 만 1세 미만의 영아(젖먹이)는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 바람직하다. 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 기러움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 5) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 6) 고령자(노인) 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유 부의 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨, 통풍, 관절염, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람) 8) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장장애가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 / 발진· 발적, 가려움, 구역· 구토, 식욕부진, 변비, 어지러움, 부정(부기) 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우 / ① 속아(나팔락시): 복용후 바로 두드러기, 부종, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다. ② 피부점막만종후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증후군(리엘증후군): 고열을 동반하고, 발진· 발적, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다. ③ 천식 ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨) 등이 나타날 수 있다.

3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

1) 정해진 용법· 용량을 잘 지킬 것 2) 장기간 계속 복용하지 말 것 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것 4) 복용시에는 음식하지 말 것 5) 마비(마비) 약물, 삼한제 함유물제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

8. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30캡슐/병

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품이상사례보고)에 일리도록 하십시오.

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mids.go.kr>) 의약품 정보 참조

※ 단합, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환해드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

제조: 판에

부광메디카주식회사

경기도 안산시 단원구 원시로 63

가동(지하층, 2층, 3층, 4층) 다동, 미동, 비동, 사동

국민건강을 위해 꾸준한 노력에 은 지회 부광메디카는 소비자의 편의를 위해 부광메디카가 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

☎ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233

※ 첨부 문서 작성 연월일 : 2018년 10월 26일