

081718

성장기 어린이 영양제 키즈애드 츄어블정

※ 사용 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

유효성분 : 레티놀팔미테이트과립(별규)	2.00mg
(비타민A로서 1000IU)	
콜레칼시페롤과립(별규)	1.15mg
(비타민D로서 115IU)	
티아민질산염(KP)	0.65mg
리보플라빈포스페이트나트륨(KP)	0.75mg
(리보플라빈으로서 0.59mg)	
피리독신염산염(KP)	0.90mg
시아노코발라민1000배산(KP)	2.00mg
(시아노코발라민으로서 20μg)	
제피아스코르브산(별규)	20.62mg
(아스코르브산으로서20mg)	
토코페롤아세테이트 2배산(KP)	10.00mg
(비타민E로서5.0IU)	
폴산(KP)	0.08mg
니코틴아미드(KP)	3.00mg
판토텐산칼슘(KP)	5.40mg
글루콘산칼슘수화물(KP)	20.00mg
(칼슘으로서 1.79mg)	
글리세로인산마그네슘(BP)	10.00mg
(마그네슘으로서 1.1mg)	

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 젖)
기타 첨가제 : 말기향분말, 스테아르산마그네슘, 스테아르산칼슘, 시트르산 수화물, 아스파탐, 포도당, 히드록시프로필셀룰로오스, D-만니톨

【성상】 흰색~미황색의 원형 정제

【효능·효과】

○ 다음경우의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 발육기
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 눈의 건조감의 완화
 - 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상)
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방

【용법·용량】

만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1회 2정, 1일 3회

만 3개월 이상 ~ 만 8세 미만 : 1회 1정, 1일 3회

식 후 입안에서 녹이거나 씹어서 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경 고

- 1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것. (비타민 A 결핍증 환자는 제외).
- 2) 이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규 제할 필요가 있는 유전성 질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것.
※ 1일 허용량제한 - 아스파탐 함량을 WHO 권장량(40mg/kg/1일)이하로 조정(가능한 최소량 사용)할 것.
60kg 성인 : 1일 최대복용량 24g

2. 다음과 같은 사람은 이약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 4) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)
- 5) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

② 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

- 6) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 7) 신장장애 환자
- 8) 저단백혈증 환자
- 9) 강심배당제를 투여 중인 환자
- 10) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 11) 신장결석 병력이 있는 환자
- 12) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지 할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 묽은 변, 저혈압, 얼굴달 아오름, 심박동불규칙, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 10) 장기간 고용량의 비타민 A(에타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈임성증) 위험을 높일 수 있다.
- 11) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 12) 우발적으로 과량복용 한 경우.
- 13) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우.

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
 - 3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.
 - 4) 각종 요검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 5) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.
 - 6) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- ### 7. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 180정/병, 360정(180정/병x2)

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr> → 의약품유해사례보고)에 알려주십시오.

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

부광약품주식회사

제조의뢰자 : 부광약품(주) 경기도 안산시 단원구 능안로 47

제조자 : (유)한통제약 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단36로 301 1층(창고), 3층, 5층, 봉동로 705

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통하료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

☎ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2018년 8월 17일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.