

위점막보호제

위스틸 정

에넵95%에탄올연조엑스(20→1)

[성분·함량] 1정 중

유효성분: 에넵95%에탄올 연조엑스(20→1)(별규).....60.0mg
(유폴릴린으로서 0.48~1.44mg, 자체오시딘으로서 0.15~0.45mg),
첨가제(타르색소) : 황색203호(KPTaCS)
첨가제(타르색소) : 청색1호(KPTaCS)
첨가제(동물유래) : 유당수화물(소-유유)

[성상]

녹색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 질환의 위점막 병변(미린(짓무름), 출혈, 발적, 부종)개선: 급성위염, 만성위염
2. 비스테로이드소염진통제(NSAID) 투여로 인한 위염의 예방

[용법·용량]

에넵95%에탄올연조엑스로서 1회 60mg을 1일 3회 경구투여한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

유당을 함유하고 있으므로 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency), 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등 유전적인 문제가 있는 환자에게 이 약을 투여해서는 안된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 혈전 환자(뇌혈전, 심근경색, 정맥혈전증 등)
- 2) 소비성 응고 장애 환자
- 3) 간장, 신장, 심장, 폐, 혈액 등에 중대한 장애를 가지고 있는 환자
- 4) 약물알레르기성(발진, 발열, 가려움 등)이 있거나 병력이 있는 환자

3. 이상반응

- 1) 국내에서 급·만성 위염에 대한 제3상 임상시험에 참여한 386명을 대상으로 보고된 발현부위별 이상반응은 다음과 같다.
 - (1) 소화기계: 때때로 구역(0.78%), 식욕부진(0.52%), 설사(0.52%), 구토(0.26%), 속쓰림(0.26%), 상복부통(0.26%)이 나타났다.
 - (2) 정신신경계: 때때로 어지럼(0.26%), 두통(0.26%)이 발생하였다.
 - (3) 피부: 때때로 발진(0.26%), 가려움(0.26%)이 나타났다.
 - (4) 간 및 담도계: 때때로 ALT 상승(0.26%)이 나타났다.
- 2) 국내에서 비스테로이드소염진통제(NSAID) 투여로 인한 위염 예방에 대한 제3상 임상시험에 참여한 266명을 대상으로 보고된 발현부위별 이상반응은 다음과 같다. 참고로 동 임상시험은 비스테로이드소염진통제와 이 약을 동시에 투여하며 진행되었으므로 다음의 이상반응이 비스테로이드소염진통제에 의한 것인지 이 약에 의한 것인지 확실하지 않으며, 또한, 이상반응이란 임상시험용약물과 반드시 인과관계가 있는 것은 아니다.
 - (1) 심혈관계: 때때로 심계항진이 나타났다.
 - (2) 소화기계: 매우 자주 복부팽만, 상복부통, 속쓰림, 구역, 설사가 나타났다. 때때로 하복부통, 변비, 소화불량, 트림, 위장운동과다, 위식도 역류, 구토, 허기가 나타났다.
 - (3) 간 및 담도계: 자주 ALT 증가가 나타났으며, 때때로 혈중 빌리루빈 증가가 나타났다.
 - (4) 대사 및 영양계: 때때로 식욕 증진이 나타났다.
 - (5) 신경계: 때때로 두통이 나타났다.
 - (6) 정신계: 때때로 불면이 나타났다.
 - (7) 비노생식기계: 때때로 배뇨곤란이 나타났다.
 - (8) 호흡기계: 때때로 비인두염이 나타났다.
 - (9) 기타: 때때로 혈중 LDH 증가가 나타났다.

전문 의약품

분류번호: 232

- 3) 국내 급·만성위염 환자 3,416례를 대상으로 실시한 시판 후 사용성적조사결과 이상반응은 0.18%(6례/3,416례)가 보고되었고, 약물과의 인과관계가 있는 이상반응은 0.15%(5례/3,416례)(식욕부진, 구역, 소화불량, 복통 등이 각각 0.03%(1례))로 보고되었다. 또한, 이 약과의 인과관계를 판단할 수 없는 것으로 보고된 예상하지 못한 이상반응은 안전 부종 0.03%(1례)가 보고되었다.
- 4) 국내 비스테로이드소염진통제 투여로 인한 위염의 예방 목적으로 이 약을 투여 받은 관절염 환자 429례를 대상으로 실시한 시판 후 사용성적조사결과 이상반응은 2.10%(9례/429례)로 보고되었고, 약물과의 인과관계가 있는 이상반응은 0.93%(4례/429례)(상복부 통증 0.70%(3례), 구역 0.23%(1례))로 보고되었다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약은 소화성 궤양(빈흔 제외)과 역류성식도염을 가진 환자와 비스테로이드소염진통제 투여에 의한 위염 및 위궤양 환자, 위절제술을 받은 병력이 있는 환자, 십이지장궤양을 합병한 환자에 사용되는 것에 대해 연구되어 있지 않다.
- 2) 이 약은 임상시험에서 급·만성 위염에 최대 2주까지 투여한 경향이 있으며, 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

5. 상호작용

이 약의 약물상호작용에 대한 연구는 수행되지 않았다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 이 약은 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 이 약이 모유로 이행되는 지에 대해서는 알려진 바가 없으므로 수유부의 경우 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

7. 임상검사치의 영향

- 1) 이 약을 1일 투여용량 180mg으로 2주간 투여하였을 때 AST 값이 유의하게 감소하는 경향을 나타내었으나 대부분 정상 범위내에 있었고, 때때로 ALT 값이 비정상적으로 상승하는 경우와 드물게 LDH 값이 비정상적으로 상승하는 경우가 보고되었다.
- 2) 이 약을 1일 투여용량 360mg으로 2주간 투여하였을 때 적혈구, 헤모글로빈, 헤모글로빈, 총 단백질, ALP, AST 값이 유의하게 감소하였고, 림프구는 유의하게 증가하는 경향을 나타내었으나 대부분 정상 범위 내에 있었다.
- 3) 국내에서 비스테로이드소염진통제에 의한 위염 예방에 대한 제3상 임상시험에서 이 약을 1일 투여용량 180mg으로 4주간 투여하였을 때 헤모글로빈, 헤모글로빈, 헤모글로빈 값이 유의하게 감소하는 경향을 나타내었고, ALT, 알부민, LDH 값은 유의하게 증가하였으나, 정상범위로 회복되었다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 다른용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하도록 한다.

[저장방법 및 사용기간]

기밀용기, 실온(1~30℃)보관
사용기간: 제조일로부터 36개월

[포장단위] 30정, 300정

[제조/외지] 대우제약(주) 부산광역시 사하구 다대로 153(신평동)

[제조지] (주)마더스제약 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 18

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된(KGMP)적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 8월 17일)이후 변경된 내용은 <http://www.daewoopharm.com> 또는 051-204-3831(대우제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 사용 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 첨부문서는 의약품과 함께 보관 하십시오.
- ※ 정해진 용법·용량을 준수하고 올바른 사용법을 모르거나 의사사항이 있으면 의사·약사와 상의하십시오.
- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

최종개정년월일 2015.07.24

작성년월일 2015.08.17



대우제약(주)

부산광역시 사하구 다대로 153 (신평동)
<http://www.daewoopharm.com>

대우제약 소비자상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831