

호려제약 복합 진경제 스파메드® 정

■ 원료약품의 분량 : 이 약 1정 중

디스클로민염산염(USP).....	5 mg
파파베린염산염(USP).....	15 mg

■ 성상 : 흰색의 원형 정제

■ 효능 · 효과 : 위통, 복통, 신통, 위산과다, 속쓰림

■ 용법 · 용량 :

성인 1회 2정 1일 2~3회, 8~14세 1회 1정 1일 2~3회 식후 또는 식간에 복용한다.
다만, 1일 2회 이상 복용시에는 4시간 이상의 간격을 두고 복용한다.

■ 사용상의 주의사항 :

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 만 7세 이하의 어린이
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
스코폴리아 엑스 함유 제제 및 다른 위장진통 · 진경제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
 - 심장장애 환자, 녹내장(눈의 통증, 눈의 찔림 등) 또는 배뇨장애 환자, 허약자 또는 고령자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우
 - 이 약을 복용함으로써 구갈, 변비의 증상이 나타날 수 있다. 또 두통, 안면홍조, 눈부심, 배뇨장애 등이 나타날 경우
 - 여러차례 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것.
 - 이 약을 복용함으로써 시야몽롱, 눈부심 등이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 (사용기간 : 제조일로부터 36개월)

■ 포장단위 : 20정

■ 첨부문서 최종개정일 : 2015년 7월 24일

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

15-7-31

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
※ 기타 문의사항은 의 · 약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실
080-529-6100로 문의하십시오.
※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은
<http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



고려제약주식회사
경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10