

순환장애 개선제

카리디노 정 50단위 (칼리디노게나제)

본 약의 효능·효과, 사용상의 주의사항, 부작용, 제2차원기, 보관, 포장단위, 제조일자, 유통기한, 판매처, 기타사항은 본 약의 설명서 또는 본 약의 포장에 기재되어 있습니다.

원료약품 및 그 분량 : 1정 중

칼리디노게나제 (JP) 50IU

첨가제(동물유래성분) : 무수유당 (건강한 소의 우유)

성상 : 흰색의 원형 장용성 필름코팅정

효능 · 효과

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애 : 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

용법 · 용량

1일 30-150IU를 3회 분할하여 경구 투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 .

- 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
- 2) 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency), 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등 유전적인 문제가 있는 환자에게 이 약을 투여해서는 안 된다.

2. 부작용

- 1) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
- 3) 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 4) 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.

3. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 300정, 30정

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
 ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
 ※ 의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여야 합니다.
 ※ 이 첨부문서 최초 작성일자(2015년 07월 27일) 이후 변경된 내용은 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
 ※ 제품 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자 피해보상규정" 의거 소비자 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

제 조 자 : (주)일화 / 강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

제조외판 :  **위더스제약 (주)** 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 103
 판 매 원 :  **WITTH PHARMACEUTICAL CO., LTD.** Tel. 02-3486-7474