

대한의약품 **한국리콜**

순환계용약

칼리돈정50단위

(칼리디노게나제)

0710107

Kallidon Tab. 50IU

KGMP 전문의약품

※ 의약품 사용하기 전에 본 문서를 자세히 읽어보시고 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 칼리디노게나제(JP) 50아이.유
- 첨가제(동물유래성분) : 우수유당(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시 프로필셀룰로오스, 콜로이드성아산화규소, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프 프로멜로오스프탈레이트

【성상】

흰색의 원형 장용성 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애 : 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관병(버거병)
2. 경년기장애, 망막락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

【용법·용량】

1일 30~150 I.U.를 3회 분할하여 경구 투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 부작용

- 1) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있습니다.
- 3) 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있습니다.

3. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의합니다.

【포장단위】

30정/병, 300정/병

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용(유효)기간】

제조일로부터 24개월

【제조(외)처】

(주)휴비스트제약 / 대전광역시 대덕구 신일서로 104번길 46

【제조자】

(주)휴비스트제약 / 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

- ▶ 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로, 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
- ▶ 본 제품은 엄격한 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ▶ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ▶ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하십시오.
- ※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실(070-4481-6051)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

설명서 작성일자 : 2022. 09. 23

설명서 개정일자 : 2025. 12. 03

내일을 향한 희망 에너지

HUVIST

Huvist Pharm. Co., Ltd. (주)휴비스트제약
 대전광역시 대덕구 신일서로 104번길 46
 고객상담실 : 070-4481-6051 / www.huvist.co.kr