

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 보관하십시오.

일반의약품
분류번호 325
KGMF 적격업체



캡슐 약용효모 성분의 안전한 경구용 탈모 치료제

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

약용효모(별규)	100 mg
케라틴(별규)	20 mg
(기원동물: 돼지, 사용부위: 발톱)	
(총 아미노산으로서 히스티딘 1.22mg, 류신 4.91mg, 리신 4.1mg)	
티아민질산염(KP)	60 mg
판토텐산칼슘(KP)	60 mg
L-시스틴(KP)	20 mg
p-아미노벤조산(USP)	20 mg
첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호, 청색1호, 적색40호	

[생상] 연회색 가루의 내용물이 든 상부 녹색, 하부 미황색의 경질캡슐제

[효능·효과]

1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진
2. 탈모의 보조치료

[용법·용량]

성인 : 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용합니다.

12세 이상 소아 : 1회 1캡슐을 1일 1 ~ 2회 식후에 복용합니다. 12세 미만은 복용하지 않습니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 사람
 - 2) 12세 미만 소아
2. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 위통, 구토 등 위장관 불편감과 발한(땀이남), 빈맥(빠른맥), 가려움, 두드러기, 두통, 어지럼, 홍조
 - 2) 두부이외의 신체부위에서 발모현상이 나타는 경우
 - 3) 정해진 용법·용량대로 3 ~ 4개월 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우
 - 4) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 설폰아미드 제제와 동시 복용 시 주의하십시오.
 - 2) 흉터로 인한 탈모나 안드로젠 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 마십시오.
 - 3) 이 약은 당뇨병환자에 복용할 수도 있습니다.
 - 4) 평균 치료 기간은 3 ~ 6개월입니다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 마십시오.
 - 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장방법] 차광기밀용기, 25℃이하 보관

[포장단위] 120캡슐, 240캡슐

[제조의회사] 에이프론헌제약(주) / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16

[제조자] (주)마더스제약 / 경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18

[판매처] ㈜대웅생명과학 / 서울시 송파구 삼전로 42

* 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

* 이 첨부문서 작성일자(2017년 05월 19일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품검색에서 확인할 수 있습니다.

* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

첨부문서 최종 개정연월일 : 2017.05.19 / 1705-00