

피부고민과 육체피로를 한번에



복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고 반드시 제독과 함께 보관하십시오.

● 레오나르도 다빈치

1점(1.016.022mc) 중

후코이단(미)염산염(가) (T-D-HQ, 황색비타민[가])	50 mg
이노시톨(미)염산염(가)코르티코스테로이드 600mg(불가)	6186 mg
리보플라빈(비타민B2)아세트(가)(황색비타민[가])	6 mg
비타민B12(비타민B12)아세트(가)(비타민[가])	5 mg
시노비, 코르티코스테로이드(가)코르티코스테로이드 600mg(불가)	6 mg
비타민B12(비타민B12)아세트(가)(비타민[가])	250 mg
비타민B12(비타민B12)아세트(가)(비타민[가])	22 mg
니코틴아미드(비타민B3)아세트(가)(비타민[가])	50 mg
만탄토신(비타민B6)아세트(가)(비타민[가])	20 mg
토코페롤(비타민E)아세트(가)비타민E(가) 20.0(U)(가)	40 mg
비타민C(비타민C) 4.4mg(가)	13.5 mg
비타민C(비타민C) 1mg(가)	3.7 mg
비타민C(비타민C) 1mg(가)	28mg(가)
생리대(비타민C) 1mg(가)	48.15 mg

노란색의 장방형 필름코팅지



重刊，卷四

○ 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, E의 보급

- **원재료** : 임산, 수유기 - 노년기
 - 폐경, 병후정원을 잃는 동안이나 회복 후의 재회치로서
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능, 효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절염(요추염, 어깨결림 등), 구내염(입가파열), 구순염
 (입술염), 구내열(입안열), 설염(혀염), 설진, 피부염
 - 각기 : 눈의 피로
 - 햇빛, 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
 - 인공홍혈, 비출혈(코피) 예방
 ○ **이 약의 부작용**

출발 만 12세 이상 및 성인: 1회 2점을 1일 1회 복용 또는 1회 1점씩 1일 2회 복용

사물상의 주의사항

1. 경고 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 피량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관할 것

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- [illegible]

4. 다음과 같은 사람(경우)은 미 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 지령을 받고 있는 환자
- 2) 고혈압성 뇌졸중 환자(hypertensive : 요즘에 과량의 수염이 빠졌다는 상태)
- 3) 임박 및 망상하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 마약에 유아
- 4) 소화성궤양, 만성폐렴성상대염, 고혈압특징 부분에 나타나지않음 등의 위험질환 환자
- 5) 심장, 순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 감성장애를 앓는 중인 환자
- 9) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자

10) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분이 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- [illegible]

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 율법·율령을 잘 지킬 것
- 2) 각종 요건사시에 해당되는 검출을 방해할 수 있다.
- 3) 요율 항색으로 변하게 하여 임상검사시에 영향을 줄 수 있다.
- 4) 녹차, 홍차 등 차를 함유하는 차는 복용중 복용전후에는 피할 것

7. 저잠삼의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적고 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

저장방법: 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

© 2001 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 250: 103–110

포장단위 자사포장단위(외부포장에 표기)

.....

제소

- ※ 기타 주의
1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
 2. 사용기간에 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하십시오.
 3. PPT포장을 개봉하여 복용시 가습 정제에 포장물이 같이 떨어지는 경우가 있으나 복용 시 정제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하시기 바랍니다.

* 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자 상담실 문의하시기 바랍니다.
 소비자 상담전화 : 090-232-8800 www.julpharmopharm.co.kr

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공
거래위원회고시 「소비자분쟁 해결기준」에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을
수 있습니다.

* **의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품사전** <http://drug.mfds.go.kr>