

야간 근육 경련

크렘팩스 정

콜레칼시페롤 글루콘산칼슘수화물 니코틴산

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

콜레칼시페롤(EP).....	0.02mg(비타민D로서 800 IU)
글루콘산칼슘수화물(UP).....	200mg(칼슘으로서 17.84mg)
니코틴산(USP).....	20mg

동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유)

【성 상】 흰색의 정방형 정제



【효능·효과】 야간 근육 경련

【용법·용량】 성인 및 노인 : 1일 1 내지 2정을 충분한 수분과 함께 복용. 잠자기 전에 복용하는 것이 바람직하다. 한번 경련이 발생하면 최대 4주까지 복용 가능하다. - 만 18세 미만에는 권장되지 않는다.

※ 사용상의 주의사항



1. 다음과 같은 사람은 이약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.



2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제



3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있는 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아: 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 3) 심장-순환기계기능 장애 환자(고혈압환자 포함)
- 4) 신장장애 환자(신장 기능의 손상이 있는 환자는 복용시 투여 기간을 최소로 한다)
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 강심배당체를 투여중인 환자
- 7) 신장결석 병력이 있는 환자
- 8) 간손상 환자
- 9) 소화기 궤양이 있는 환자(위 포함)
- 10) 당뇨병 환자
- 11) 통풍 환자



4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있는 경우: 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 가려움증, 현기증, 두통, 간손상(드물게 발생할 수 있다)
- 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 3) 장기간투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 할 것
- 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 6) 1주 복용하여도 증상의 개선이 없는 경우



5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.



6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 60정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상해 드립니다.

※ 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오

※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다. 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 콜로버서비스(080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.

【소비자상담실】 ☎ 080-024-0030 (수신자부담 콜로버서비스)

【제조자】 광동제약(주) 경기도 평택시 산단로 114

작성일자 : 2015.11.18