

# 지씨타치온 주 1200mg

## 글루타티온(환원형)

**GCTATHIONE inj. 1200mg (Glutathione (Reduced))**

【원료약품 및 그 분량】 1 바이알(1333.25mg) 중

주 성 분: 글루타티온(환원형)(KP) ..... 1200 mg  
안 정 제: 탄산수소나트륨(KP) ..... 적량

【성상】 흰색~유백색의 다공성의 동결건조된 내용물이 충전된 무색투명한 바이알 주사제

【효능·효과】 시스플라틴 또는 유사계열 화학요법에 의한 신경성질환의 예방

【용법·용량】

중증의 경우 1일 600~1200mg을 근육주사 또는 점적 정맥주사한다.  
수일에 걸쳐 치료하는 경우 또는 경미한 경우에는 1일 300~600mg을 근육주사 또는 점적 정맥주사한다.

【사용상의 주의사항】

### 1. 이상반응

- 1) 아나필락시양 증상: 드물게 아나필락시양 증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 안면창백, 혈압저하, 맥박이상 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 과민증: 드물게 발진 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
- 3) 소화기계: 드물게 식욕부진, 구역, 구토, 위통이 나타날 수 있다.

### 2. 적응상의 주의

- 1) 조제시: 바이알 제제는 용해 후 즉시 사용한다.
- 2) 근육주사하는 경우에는 신경 및 혈관을 피하여 신중히 투여한다. 또, 반복투여의 필요성이 있는 경우에는 좌우를 바꾸어 주사하는 등 동일부위를 피하고, 유·소아에는 특히 주의한다.

### 3. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고, 꼭 닫아 보관한다.

【저장방법】 밀봉용기, 실온보관 (1~30℃)

【포장단위】 1바이알 x 10, 25, 50 바이알

※ 유효기간 또는 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 약국, 병·의원, 도매상에 한하여 각 영업소에서 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자(2016년 10월 17일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 ([www.greencrosswb.com](http://www.greencrosswb.com)) 나 소비자상담실 (031-629-8690)로 문의하시기 바랍니다.

제 조 자:  주 비씨월드제약

경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23

제조외 및 판매자:

 **녹십자웰빙**

충청북도 음성군 금왕읍 무곡로65번길 26  
TEL: 031)629-8600 소비자상담실 ☎031-629-8690