

혈액순환개선제

바넥신 정**80밀리그램**

(은행엽건조엑스)



혈액순환개선제

바넥신 정 80밀리그램

(은행엽건조엑스)

일반의약품 (조제용) 분류번호 : 219

【성분·함량】 1정 중

- 유효성분 : 은행엽건조엑스(생규) 80 mg
- 첨가제 : 유당수화물(동물유래성분, 건강한 소의 우유), 탭설드녹색(99G1033)(타르색소 : 청색1호, 황색203호), 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 전분글리콜산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 크로스카르멜로오스나트륨

【성상】

녹색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】**1. 주 효능효과**

- 1) 말초동맥순환 장애(간헐성 파행증)의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료

【용법·용량】**성인**

- 1) 말초동맥순환 장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽건조엑스로서 1회 40밀리그램 1일 3회 또는 1회 80밀리그램 1일 2회 경구투여한다(먹는다, 복용한다).
 - 2) 기질성 뇌기능 장애 : 은행엽건조엑스로서 1회 40 ~ 80밀리그램 1일 3회 또는 1회 120밀리그램 1일 2회 경구투여한다(먹는다, 복용한다).
- * 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】**1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것**

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)
- 3) 임부(동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)
- 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예 : 펜프로쿰몬, 와파린), 항혈소판제(예 : 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제))를 복용하고 있는 환자
- 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상담 시 가능한 첨부문서를 소지할 것

- 1) 수술이 예정된 자
- 2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우
- 3) 이상반응
 - ① 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.

- ② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989 ~ 2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

- 어지러움
- 가려움증

- ③ 기타 : 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

4. 기타 이 약의 복용(사용) 시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1 ~ 30 ℃)보관**【포장단위】** 30정, 500정**KGMP 적격업소 제품****【제조외뢰자】 (주)한국피엠지제약 / 경기도 시흥시 경제로 59****【제조자】** 코스맥스파마(주) / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23

- ※ 이 첨부문서 작성일자(2026.01.13) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 병·의원, 약국 및 도매상에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다.
- ※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하시기 바랍니다.
- ※ 유효기한 또는 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 부작용 발생 시 한국 의약품안전관리원(1644-6223)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.