

제품의 효과적인 사용을 위해, 첨부문서를 주의감게 읽어 주시고, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

OROTIN-F

오로친[®]에프

(항히스타민제)

일반의약품

두드러기 • 습진 • 가려움증 • 꽃
Hives, Urtication improve.

원료약품 및 그 분량

1정 중	
클리시리진산이칼롬(KP)	33.33mg
제피아스코르브산(발규)	17.36mg
피리독신염산염(KP)	8.33mg
판토텐산칼슘(KP)	5mg
리보플라빈부타레이트(KP)	2mg
클로페니라민말레산염(KP)	1.33mg
동물유래성분(유당수화물 : 소, 우유)	
정가재(타르색소) 적색40호, 적색3호, 청색1호, 황색4호	

성상

검은색의 원형 필름코팅정

효능·효과

두드러기, 습진, 꽃, 가려움증

용법·용량

성인 및 15세 이상 : 1회 2정씩 1일 3회 복용, 8~14세 : 1회 1정씩, 1일 3회 복용
복용간격은 4시간 이상으로 한다.

사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 이 약을 투여하지 말 것
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)불내효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
 - 다른 항알레르기약
 - 항히스타민제를 함유하고 있는 내복약(감기약, 진해거담약, 비염용내복약, 열미방지약 등)
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것
 - 복용 후 자동차 또는 기계류의 운전조작을 피할 것
 - 장기간 연속적으로 복용하지 말 것
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
 - 의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람
 - 고령자
 - 약에 의하여 알레르기 증상을 일으켰던 적이 있는 사람
 - 다음 증상이 있는 사람
부종(붓는 것), 배뇨곤란(소변보기 어려움)
 - 다음 질환이 있는 사람
심장병, 고혈압, 신장병, 노내장
 - 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

 - 복용 후 다음 증상이 나타난 경우
피부 : 발진, 발적, 가려움증
소화기 : 구역, 구토, 식욕부진
기타 : 배뇨곤란(소변보기 어려움)
 - 드물게 아래와 같은 심각한 증상이 일어날 수 있다. 이 경우에는 즉시 의사의 진료를 받을 것
위(뱃)탈도스테론증 : 소변량이 감소함, 얼굴이나 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워짐, 손이 굳어짐, 혈압이 높아짐, 두통이 나타남
 - 5 ~ 6 일간 복용해도 증상이 개선되지 않는 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 알이 마르는 증상이 나타날 수 있으며 증상이 계속되거나 더 심해지는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것
 - 본제는 낙산리보플라빈을 함유하기 때문에 본제의 복용에 의해 일시적으로 소변이 노랗게 변할 수 있다.
 - 장해된 용법용량을 엄수할 것
 - 소아에 복용시키는 경우에는 보호자의 지도감독하에 복용시킬 것

7. 저장상의 주의사항

- 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 장소에 보관할 것
- 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 다른 용기에 교체하지 말 것
(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 위험이 있음)
- 사용 기한이 지난 제품은 복용하지 말 것

*클리시리진산(염류 포함) 함유 의약품 (경구제에 한함) 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.
 - 혈압이 높은 환자 또는 고령자
 - 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
 - 부종이 있는 환자
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
 - 본제의 복용에 의해 노란이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무거워지거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.
 - 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 클리시리진산으로서 40mg 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.
 - 근병증, 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.
- 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 간조함유제제, 클리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프카아노제제루세미드, 아세트리산 또는 차이치드제 아노제트리클로르메타지드와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타날 수 있으므로 신중히 투여할 것.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

자사포장단위

※ 본 의약품은 KGMP 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국 및 의약품 판매자를 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의 및 이 첨부문서의 작성일자(2015년 10월 08일)이후 변경된 내용의 확인은 식품의약품안전처 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 홈페이지(www.yuyu.co.kr)나 크로바서비스(수신자 요금부담) 080-070-0701으로 하시기 바랍니다.

제조의뢰자

SINCE 1941
yuyu

서울사무소 : 서울시 중구 동호로 197 유유빌딩
본사 • 공장 : 충북 제천시 바이오밸리 1로 94
www.yuyu.co.kr

제조자

(주)마더스제약

경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18