



정우황련해독탕정(단미엑스혼합제)

일반의약품 / 분류번호 : 119

【제품명】 정우황련해독탕정(단미엑스혼합제)

【성분 · 함량】 1회 용량(2정, 1,460mg) 중

차자건조엑스(4.2~5.1→1)(별규)(차자로서 1.56g)	337.6mg
황금건조엑스(3.2~4.0→1)(별규)(황금으로서 1.56g)	437.6mg
황련건조엑스(8.1~9.9→1)(별규)(황련으로서 1.56g)	175.0mg
황백건조엑스(6.7~8.2→1)(별규)(황백으로서 1.56g)	211.0mg

【성상】 담갈색의 장방형 정제

【효능 · 효과】 한방건강보충용

【용법 · 용량】 한방건강보충용

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 신생아
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 수유부

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 3) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 4) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확보되어 있지 않다(사용경험이 적다).)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- (1) 간질성폐렴 : 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 폐음(상(염발음, 捻髮音) 등이 나타난 경우에는 이 약의 복용을 중지하고, 신속하게 흉(가슴)부X선 등의 검사를 실시하여 동시에 부신피질호르몬제 투여 등의 적절한 처치를 받을 것.

- (2) 간기능장애 : 드물게 AST, ALT, ALP, γ -GTP의 상승 등을 수반하는 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우

- (3) 과민반응 : 발진, 두드러기 등

- (4) 소화기계 : 식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 복통(배아픔), 설사 등

- 2) 1개월(코피, 숙취에 복용하는 경우에는 5~6회) 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 2) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 3) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

【고객상담실】 02-574-2541

본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

2016년 06월 15일 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.



정우신약주식회사

충남 아산시 신창면 서부남로790번길 60