일반의약품
분류번호:325

모아탄 캡슐

【원료약품의 분량】 이 약 1 캡슐(394mg) 중

약용효모(별규)……100mg (히스티딘 1.0mg, 류신 3.0mg, 리신 3.1mg)
케라틴(별규)……20mg (히스티딘 0.22mg, 류신 1.88mg, 리신 1.0mg)
티아민질산염(KP)……60mg
판토텐산칼슘(KP)……60mg
L-시스틴(KP)……20mg
p-아미노벤조산(USP)……20mg
첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호, 청색1호, 적색40호

【성상】 연회색 가루의 내용물이 든 상부 녹색, 하부 미황색의 불투명한 경질캡슐제

【효능·효과】

1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진
2. 확산성 탈모의 완화

【용법·용량】

성인 : 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 복용
소아 : 1일 1~2회, 1회 1캡슐 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 부작용
 드물게 위통, 구토 등 위장관 불쾌감과 발한(땀이 남), 빈맥(빠른맥), 소양증(가려움증), 두드러기 등이 보고되었으며, 두부이외의 신체부위에서 발모현상이 나타날 수 있다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 이 약은 황색5호를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 일반적 주의
 1) 설폰아미드제제와 동시 복용 시 주의하여야 한다.
 2) 흉터로 인한 탈모나 안드로겐 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 않는다.
 3) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우 의사와 상의한다.
4. 임부, 수유부에 대한 투여
 임부, 수유부에 투여할 경우는 의사와 상의한다.
5. 적용상의 주의
 1) 평균 치료 기간은 3-6개월이고 보통 약 3-4개월 후부터 효과를 나타내며 필요한 경우 투여를 계속하거나 반복 투여할 수 있다.
 2) 본 제제는 당뇨병환자에 투여할 수도 있다.
6. 저장상의 주의사항
 1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 않는다.
 2) 어린아이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.

【저장방법】 차광기밀용기, 25℃ 이하 보관

【사용기한】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

【제조자】 우리들제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50 (소비자상담실) 080-080-4211

【판매자】 홍근당 제일피지 경보제약
본사·공장 : 충청남도 아산시 실옥로 174
서울사무소 : 서울특별시 서대문구 충정로 8

♣ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다
♣ 이 설명서의 개정일자 2015년 11월 01일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지 (www.wooridulpharm.com) 또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다
♣ 온라인의약도서관(http://drug.mfds.go.kr)의약품 정보를 참조하십시요.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
MAT 2015.11.01-00